



RS Li, Shih-chên
180 Kokuyaku honzo komoku
C5L4519
1929
v.5

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

頭註

國譯本草綱目

第五冊

春陽堂藏版



DS
180
C5L4519
1929
v. 5

原著

明 李 時 珍

監修・校註

理學博士 白井光太郎

顧問

木村博昭

考定

理學博士 牧野富太郎

考定

理學博士 脇水鐵五郎

考定

岡田信利

考定

矢野宗幹

考定

木村康一

譯文

鈴木眞海

頭註國譯本草綱目 第五冊

目次

本草綱目草部第十五卷

草部第十五卷目錄.....一十二

隰草類 上

菊.....一

野菊.....一

菴藷.....一三

對虛

著.....一六

艾.....一九

夏竦

千年艾.....三四

茵陳蒿.....三五

青蒿.....四一

黃花蒿.....四八

白蒿.....四九

角蒿.....五四

蘼蒿.....五五

馬先蒿.....五七

陰地厥.....五九

牡蒿.....六〇

九牛草.....六一

羌蔚.....六二

盤菜.....七四

薇術.....七六

無心草

夏枯草.....七九

劉寄奴草.....八三

曲節草.....八七

麗春草.....八八

旋覆花.....九〇

青葙.....九四

桃朱術 鴈來紅 天靈草 思愛子

雞冠.....九九

紅藍花.....一〇三

番紅花.....一〇六

燕脂.....一〇八

大薊 小薊.....一一〇

續斷.....一五

苦芡.....一〇

漏蘆.....一二

飛廉.....一九

葶麻.....二三

苘麻.....二六

大青.....四〇

小青.....四三

胡盧巴.....四四

蠶寶.....四八

必似勒

惡實.....五四

菜耳.....六三

天名精.....七三

貓菴.....一八二

類鼻 羊屎柴

箬.....一九〇

蘆.....一九三

甘蔗.....一九九

襄荷.....二〇六

麻黃.....二一一

雲花草

木賊.....二三四

間荆

石龍芻.....二三八

龍常草.....二三〇

燈心草.....二三二

本草綱目草部第十六卷

草部第十六卷目錄	一一二
----------	-----

隕草類 下

地黃	三三五
----	-----

胡面蕒

牛膝	二五八
----	-----

紫苑	二六六
----	-----

女苑	二七〇
----	-----

麥門冬	二七二
-----	-----

萱草	二八〇
----	-----

槌胡根	二八三
-----	-----

淡竹葉	二八四
-----	-----

鴨跖草	二八五
-----	-----

葵	二八七
---	-----

蜀葵	二九六
----	-----

堇葵·····	三〇二
黃蜀葵·····	三〇四
龍葵·····	三〇八
龍珠·····	三二三
酸漿·····	三一四
蜀羊泉·····	三二〇
鹿蹄草·····	三二三
敗醬·····	三二三
迎春花·····	三二六
欸冬花·····	三三七
鼠麴草·····	三三二
決明·····	三三五
茺芒 合朋草	
地膚·····	三四一

瞿麥	三四六
王不留行	三五二
剪春羅	三五六
金盞草	三五八
葶麻	三五九
車前	三六八
狗舌草	三六五
馬鞭草	三七六
蛇含	三八〇
女青	三八四
鼠尾草	三八七
狼把草	三八九
狗尾草	三九一
縛腸	三九三

連翹	二九七
陸英	四〇三
蒲葇	四〇五
水英	四〇八
藍	四一〇
藍澱	四一八
青黛	四二〇
雀翹	
甘藍	四二四
蓼	四二五
水蓼	四三〇
馬蓼	四三一
葦草	四三二
毛蓼	四三六

海根.....	四三六
火炭母草.....	四三七
三白草.....	四三八
蠶繭草.....	四四〇
蛇齒草.....	四四〇
虎杖.....	四四一
蕒.....	四四七
篇蓄.....	四四九
蘆草.....	四五一
蒺藜.....	四五三
穀精草.....	四六〇
海金沙.....	四六三
地楊梅.....	四六五
水楊梅.....	四六六

地蜈蚣草.....四六六

半邊蓮.....四六八

紫花地丁.....四六九

鬼針草.....四七一

獨用將軍.....四七一

留軍待

見腫消.....四七二

攀倒甌.....四七三

水甘草.....四七四

本草綱目草部第十七卷 上

草部第十七卷目錄.....一一二

毒草類

大黃.....四七七

商陸.....四九六

狸毒.....五〇三

防葵.....五〇八

狸牙.....五一二

蘭茹.....五一五

大戟.....五一九

澤漆.....五二七

甘遂.....五三一

續隨子.....五三八

葇若.....五四一

雲實.....五五一

蓖麻.....五五〇

博落迴

常山 蜀漆.....五六六

杜蒙山 十紅山

蔓蘆.....五七八

山慈石根 參果根 馬腸根

木藜蘆.....五八五

附子.....五八六

本草綱目草部

第十五卷

本草綱目草部目錄第十五卷

草の四 隰草類上五十三種

菊 本經

野菊 拾遺

菴藷 本經 對處を附す。

薯 本經

艾 別錄 夏竦を附す。

千年艾 綱目

茵陳蒿 本經

青蒿 本經

黃花蒿 綱目

白蒿 本經

角蒿 唐本

蘼蒿 拾遺

馬先蒿 本經

陰地厥 圖經

牡蒿 別錄

九牛草 圖經

堯蔚 本經 卽ち益母草。

鰓菜 拾遺

薇薺 本經 無心草を附す。

夏枯草 本經

劉寄奴草 唐本

曲節草 圖經 卽ち六月霜。

麗春草 圖經

旋覆花 本經

青葙子 本經 陶朱術、鴈來紅、天靈草、思靈子を附す。

雞冠花 嘉祐

紅藍花 開寶

番紅花 綱目

燕脂 綱目

大薊小薊 別錄

續斷 本經

苦芙 別錄

漏蘆 本經

飛廉 本經

苧麻 別錄

苧麻 唐本 卽ち白麻。

大青 別錄

小青 圖經

胡盧巴 嘉祐

蠶寶 本經 卽ち馬蘭子。必似勒を附す

惡寶 別錄 卽ち牛蒡。

葉耳 本經 卽ち蒼耳。

天名精 本經 卽ち地菰、地蟲。

豬鬣 唐本

箬 綱目

蘆 別錄

甘蔗 別錄

襄荷 別錄

麻黃 本經 雲花子を附す。

木賊 嘉祐 間荆を附す。

石龍鬚 本經 卽ち龍須草。

龍常草 別錄 卽ち櫻心草。

燈心草 間寶

右附方 舊一百四十四 新二百八十六

草の四 隰草類上五十三種

菊 (本經上品)

和名 きく
學名 Chrysanthemum sinense, Sabine.
科名 きく科(菊科)

〔釋名〕 節華(本經) 女節(別錄) 女華(別錄) 女董(別錄) 日精(別錄) 更

生(別錄) 傳延年(別錄) 治臍(爾雅) 金蕊(綱目) 陰成(別錄) 周盈(別錄) 時

珍曰く、按ずるに、陸佃の埤雅に『菊はもと鞠と書き、鞠に従ふ。鞠は窮の意味だ。

月令に、九月菊に黃華ありとあつて、是が華の窮極だから鞠と謂ふ』とある。節華

なる名稱は、やはりその節候に應ずる意味を取つたものだ。崔寔の月令には『女節、

女華は菊の花の名、治臍、日精は菊の根の名』とある。抱朴子には『仙方に所謂、

日精、更生、周盈とあるは、いづれも一の菊に對して根、莖、花、實を異る名で呼

んだのだ』とある。

頌曰く、唐の天寶單方圖には、白菊を載せて『原は南陽の山谷、及び田野の中

(二)南陽ハ晉ノ郡名、
尤ノ註ヲ見ヨ。

(二) 潁州、大觀ニ州ヲ川ニ作ル。潁川ハ管ノ郡名、許昌、即チ今ノ河南省許縣ニ治ス。

(三) 汝南ハ管ノ郡名、王孫、苦參ノ註ヲ見ヨ。

(四) 上黨ハ管ノ郡名、人參ノ註ヲ見ヨ。

(五) 建安郡ハ管ノ郡名、建安、即チ今ノ福建省安寧縣ニ治ス。

(六) 順政郡ハ梁ノ郡名、興州、即チ今ノ陝西省略陽縣ニ治ス。

(七) 河内郡ハ管ノ郡名、野王、即チ今ノ河南省懷慶ニ治ス。以上七郡ハスベテ前朝州郡ノ制ニ因リテ稱シタルモノナリ。

(八) 木村(康)曰ク、現今市場ニ出ヅルモノハ白菊花ニシテ、茶劑トシテ嗜好飲料ニ好ンデ用キラル。

に生じたもので、(二) 潁州地方では回峰菊と呼び、(三) 汝南では荼苦蒿と名け、(四) 上黨及び(五) 建安郡、(六) 順政郡ではいづれも羊歡草と名け、(七) 河内では地薇蒿と名ける』といつてある。

集解

別錄に曰く、菊花は(五) 雍州の川澤、及び田野に生ずる。正月に根を採り、三月に葉を採り、五月に莖を採り、九月に花を採り、十一月に實を採り、いづれも陰乾する。

弘景曰く、菊に兩種あつて、一種は莖が紫で氣が香しく味が甘い、葉は羹にして食へる、これが眞の菊である。一種は莖が青くして大きく、蒿艾の氣があつて味は苦く、食ふに堪へない、これは苦蕒と名くるものだ。眞の菊ではない。葉は如何にも似てゐるが、ただ甘と苦とで識別が出来る。菊は南陽(二) 酈縣に最も多く、今は近道の處處にあつて、種を取つて栽ゑる。又、白菊といふものがある、莖、葉はすべて似てゐるが、ただ花が白い。五月取るものである。仙經では菊を妙用といふ。但し多く得難いものだ。常にこれを服するがよいのである。

藏器曰く、白菊は平澤に生ずる。五月紫白色の花を開く。

(一) 雍州ハ今ノ陝西省南部、長安ヲ中心トシタル一帯ノ地ナリ。水部井泉水、金部金牙石ノ註參照。

(二) 鄆縣ハ今ノ河南省内郷縣境ノ地ニ在リ。

(三) 菊潭、即チ漢ノ南陽鄆縣ノ地ナリ。

縣ノ西北ニ菊潭水アリ、隋ニ因テ縣名トス。前註鄆縣參照。

(四) 大、大觀ニ小ニ作ル。

(五) 小、大觀ニ大ニ作ル。

頤曰く、處處にあるが、南陽の(一)菊潭のものを佳しとする。初春に地に布いて細苗が生え、夏茂り、秋花咲き、冬實るものだ。しかし頗る種類の多いもので、ただ莖が紫で氣が香しく、葉が厚く柔く、嫩葉のうちは食し得て、花は微し(二)大きく



〔 菊 〕

味は甚だ甘いものだけが眞なるものである。莖が青く太く、葉が細く氣が烈しく、蒿艾に似て花が(三)小さく、味の苦いものは苦薏と名ける。眞の菊ではない。南陽の菊にも兩種あつて、白菊といふは、葉が大きく艾葉のやうで、莖は青く、根が細く、花は白く、莖は黄色だ。黄菊といふは葉は蒿薔に似て花、莖すべて黄色だ。現に服餌家は多く白いものを用ゐてゐる。又一種、小やかな花を開き、瓣の下が小さい珠子のやうなものがあつて、珠子菊といふ。藥に入れて佳良だといふ。

宗○頤曰く、菊花は、近世では二十餘種あるが、單葉で花が小さくして黄に、葉の

綠色が深く小さくして薄く、九月の季候きこうに應じて花を開くものが正しいのである。

(二) 鄧州 鄧州ごうしゅうの白菊で單葉のものもやはり藥に入れる。その他は皆醫經には用ゐない。

瑞すい曰く、花が大きくして香しいものは甘菊である。花が小さくして黄色のものは黄菊である。花が小さくして氣の悪いものは野菊である。

(二) 鄧州ハ隋ノ開皇年間ニ置キ、大業年間ニ南陽郡ト改メ、唐ニ鄧州トナス。明清皆河南省南陽府ニ屬シ。今ハ縣トナス。春秋ノ鄧國ノ地ナリ。

時珍曰く、菊の品種には凡そ百種もあつて、舊根から自から莖、葉が生える。花

の色は品種に由りそれぞれ同じくない。宋朝の劉蒙泉りゅうもうせん、范至能はんしにのう、史正志しせいしなどがそれ

ぞれ菊譜を書いてあるが、やはり全部を網羅し盡したとはいへない。その莖にも獨

株のものあり、蔓延するものあり、紫、赤、青、緑こころなかりの殊があり、その葉にも、大、

小、厚、薄、尖せん、禿むくの異があり、その花にも、千葉せんちやう、單葉たんちやう、有心、無心、有子、

無子、黄、白、紅、紫、中間色、深ふか色、淺あさ色、大、小の別があり、その味にも、甘、

苦、辛の差異があり、又、夏菊なつぎく、秋菊あきぎく、冬菊ふゆぎくといふやうな區別もある。しかし、概

して藥に入れるには、單葉にして味の甘いものに限ることになつてゐる。菊譜所載

の甘菊かんぎくは鄧州黄ごうしゅうわう、鄧州白ごうしゅうはくといふがそれだ。甘菊なるものは、始めは山野に生じたも

のだが、今では一般に栽培してゐる。その花は細碎なもので、品姿は甚だ高雅では

(二) 五千葉ハ重瓣。

（二）捺ハ字典ニ乃入切、手按ナリトアリ、播ノ意トスベシ。

（二七）鼈龜ハ蛙屬ノ一種金線蛙、和名トノサマカヘル。

ない。蓋は蜂窠のやうで中に細子がある。やはり（二）捺種する事も出来る。嫩葉、及び花はいづれも燂でて食へる。白菊花は稍や大きいが味は甚だ甘くない。これも秋季に採る。菊の子無きものは牡菊といふ。焼灰を池中に撒けば能く（二七）鼈龜を殺すといふ説が周禮に出てゐる。

花 葉、根、莖、實、いづれも同じ。氣味 【苦し、平にして毒なし】 別錄

に曰く、甘し。損之曰く、甘きものを藥に入れる。苦きものは藥に入れない。呆曰く、苦く甘し、寒である。升るべく降るべく、陰中の微陽である。

時珍曰く、本經には『菊花は味苦し』といひ、別錄には『菊花は味甘し』といひ、その他の本草諸家は、甘きものを菊とし、苦きものを苦蕒とし、甘きもののみを藥に入れることになつてゐるが、謹んで按ずるに、張華の博物志には『菊に兩種あつて、苗、花は一樣だがただ味に小異がある。苦きものは食ふわけに行かない』とあり、范至能の菊譜の序には『ただ甘菊の一種のみは食物にもなり藥にも入れる。その他の黄、白の二花はいづれも味が苦く、食ふわけに行かないが、いづれも藥には用ゐ得る。頭風を治するには白いものが就中良い』とある。この二説に據れば、菊

なるものの種類には白から甘、苦の二種あるので、食品には甘菊を用ゐるが、薬に入れるには諸菊いづれもよく、野菊、即ち苦薺と名くるものだけが用ゐられぬといふことになる。故に景煥の牧豎閑談に『眞菊は齡を延べ、野菊は人を泄せしめる。正に黄精は壽を益し、鉤吻は人を殺すと同様な關係だ』といったのだ。

之才曰く、朮、及び枸杞根、桑根白皮が使となる。

(二八) 女猷—藥誌三二六(明)、四二(三一七)。

(二八) 主治

【諸風の頭眩、腫痛、目が脱けるやうに覺えて涙の出るもの、皮膚の死肌、惡風、濕痺、久しく服すれば、血氣を利し、身體を軽くし、老衰に耐へ、天年を延べる】(本草經) 【腰痛去來して陶陶たるものを療じ、胸中の煩熱を除き、腸、胃を安んじ、五脈を利し、四肢を調へる】(別錄) 陶陶とは縱緩(ハナレ、ユルム)の貌である。

【頭、目の風熱、風旋で地に倒れるもの、腦骨の疼痛を治し、身體の表面の一切の游風を消散せしめ、血脈を利す。いづれも忌む所のものはない】(寶權) 【枕に作つて用ゐれば目を明かにする。葉も目を明かにする。生のもの、熟せるもの、いづれも食つてよし】(大明) 【目の血を養ひ、翳膜を去る】(元素) 【肝氣不足に主效がある】(好古)

白菊 氣味

【苦く辛し、平にして毒なし】

主治

【風眩。白髪にならぬ】（弘景） 【髭髪を染めれば黒くする。（巨勝、茯苓、

蜜に和して丸にして服すれば、風眩を去り、白髪を黒く變じ、老衰せず、顔色を益す】（藏器）

發明

震亨曰く、黃菊花は土と金とに屬し、水と火との性を含み、能く陰血を補するものだから目を養ふのだ。

時珍曰く、菊は春生じ、夏茂り、秋花咲き、冬實り、完全に四季の氣を受け、飽くまで露、霜を経凌ぎ、葉は枯れても落ちず、花は槁れても零れず、味には甘、苦を兼ね、平にして和なる性を稟けてゐる。往昔の人は、この物のよく風熱を除き、肝を益し、陰を補することを謂つて居るが、蓋しこの物は金、水の精英を稟受すること就中多く、能く金、水の二臟を益するものだといふことには氣が付かなかつたのだ。水を補することは火を制する結果となり、金を益すことは木を平にする結果となるのであつて、木が平になれば風が息み、火が降れば熱が除ける。これを用ゐて頭目の諸風を治すといふは、理論的に機微なる關係が存するのである。黃花のものは金、水の陰分に入り、白花のものは金、水の陽分に入り、紅花のものは婦人の血

(一〇九) 鮮ハ華ノ俗字、音賀、玉露也トアリ、サカヅキナリ。
(一一〇) 落英ハ落チタ花瓣。

(一一一) 湖廣ハ湖南、兩廣。
(一一二) 羸ハ瘠ナリ、風羸ハ瘠ル風土病ナ云フカ。

(一一三) 顚ハ英ニ通ズ。

分に入るものであつて、いづれも薬に入れ得るものだ。入神の妙はすべてこれを用ゐ扱ふその人に據るのである。菊は、苗は蔬とすべく、葉は啜るべく、花は餌ふべく、根と實とは薬とすべく、之を囊にすれば枕とすべく、これを釀しては飲とすべく、本より末に至るまで如何なる部分も有功ならざるところはない。前賢はこれを君子に比し、神農は之を上品に列し、隱士は採つて酒に拵に入れ、騷人はその落英を餐したといふも、誠に然るべきことである。費長房は『九日に菊酒を飲めば不祥を辟け得る』といひ、神仙傳には『康風子、朱孺子、いづれも菊花を服して仙と成つた』とあり。荊州記には『(一一一) 湖廣の地は舊くから(一一二) 風羸の病がある不健康地だが、菊潭の水を飲むのでその地の者には長壽者が多い』とある。かやうに菊の植物として貴重なること、到底他の多くの花卉類の比肩し得べきところではない。鍾會の菊に五美あるの讃には『圓花高く懸るは天の極に準ずるなり、純黄にして雜らざるは后土の色なり、早く植ゑて晚く發くは君子の徳なり、霜を冒して(一一三) 顚を吐くは貞質を象はすなり、盃中に體輕きは神仙の食なり』とある。西京雜記には『菊の花、莖、葉を採り、秫米に雜へて酒に釀し、翌年九月に至つて始めて熟するものを

用ゐる』とある。

附方

舊四、新七。【甘菊の服食法】玉函方には

『王子喬の白髪を變じ、年壽を

(二四)本草發揮ニ成テ
成ニ作ル。

増す方は甘菊を用ゐ、三月の上の寅の日に採つた苗を玉莢と名け、六月の上の寅の日に採つた葉を容成と名け、九月の上の寅の日に採つた花を金精と名け、十二月の上の寅の日に採つた根、莖を長生と名ける。以上四味をいづれも百日間陰乾して等分を取り、(二四)成の日に合せて千杵擣いて末にし、一錢匕づつを酒で服す。或は蜜で梧子大の丸にして酒で七丸を服す。一日三服づつ百日繼續すれば、身體が軽く潤澤になり、一年で髪の白が黒に變ずる。これを服すること二年すれば一旦落ちた齒が再び生え、五年すれば八十歳の老人も變じて兒童となる』とある。孟詵は『正月葉を採り、五月五日に莖を採り、九月九日に花を採る』といふ。【白菊の服食法】太清靈寶方には次の方を舉げてある。九月九日に白菊花二斤、茯苓一斤を、いづれも擣き篩つて末にし、一日三回、二錢づつを溫酒で調へて服す。或は煉つた松脂で和して雞子大の丸にし、一丸づつを服すれば頭眩に主效があり、久しく服すれば顔色を好くし、老衰せしめぬ。藏器曰く、抱朴子に『劉生の丹法では、白菊汁、蓮花

二五 紫草、茜草并ニ
地血ノ名アリ。

二六 風池ハ耳後髮際

ニアル經穴ノ名。

二七 大觀ニ七チ十二

作ル。

二八 大觀ニ散チ九ニ

作ル。

汁、^(五)地血汁、^{ちけつじゆ}櫻汁を丹に和し、蒸して服す』とある。【白菊花酒】天寶單方に『男子、婦人頭風の久患で眩悶し、頭髮が乾落し、胸中に痰壅^{たんよう}し、發作^{はつさ}する毎に頭旋し、眼昏して覺えず倒れんとするものは、その發作の兆候を認めたとき、先づ兩の^(六)風池^{ふうち}に各二^(二七)七壯^{しちじやう}づつ灸し、同時に此の酒、及び^(二八)散を服すれば永く瘥える。その法は、春末夏初に白菊の軟苗を取り收めて陰乾し、擣いて末にし、一日二回、空腹に一方寸ヒづつを無灰酒^{むぐいしよ}に和して服し、漸次に三方寸ヒに増加する。若し酒を飲めぬものならば、ただ羹^{かう}か粥汁^{しやくじゆ}に和して服するもよし』とある。また秋八月に花と共に採收して暴乾し、切つて三大斤を生絹袋に入れ、酒三大斗の中に七日間貯へ、日毎に三回服す。常に酒の氣を繼續するが佳し^よ。(蘇頌圖經) 【風熱頭痛】菊花、石膏、川芎各三錢を末にし、一錢半づつを茶で飲む^(簡便方)。【膝風疼痛】菊花と陳艾葉で護膝^{こう}を作り、久しく用ゐれば自から除く。(吳曼扶壽方) 【痘痘の目に入りたるもの】^{はんどう}障^{しやう}を生ずるには、白菊花、穀精草^{こくせいそう}、綠豆皮^{りよくづひ}等分を末にし、一錢づつを乾柿餅^{かんしへい}一枚、粟米泔一盞と共に煮て、泔が盡きたときその柿を食ふ。かくして一日三枚づつ食へば、發病後日淺きものは五七日、久しきものは半月で效が現はれる。(仁齋直指方) 【病後

(一) 牧野云フ、今ノ人ノ稱スルあぶらぎくは *Chrysanthemum invariatum* folium Makino. ノ學名ナ有スルモノデ、我邦關東地方ニ多イモノデアル。又滿洲方面ニ毛産スル、此品ハ多分植物名實圖考卷ノ九ニアル野山菊デハサイカト思フ、私ノ

胃を生ずるもの】白菊花、蟬蛻せんてい等分を散にし、二三錢づつに蜜少量を入れて水で煎じて服す。大人、子兒共に屢々效驗を得た。(救急方) 【疔腫ちやうしゆで垂死のもの】菊花一握を搗いた汁一升を口に入れば直ちに活さる。これは神驗の方である。冬季なれば根を採る。(肘后方) 【婦人の陰腫】甘菊苗を搗き爛して湯に煎じ、先づ熏くゐんじてから洗ふ。(危氏得效方) 【酒酔の醒めぬには】九月九日に採つた眞菊花を末にし、方寸匕を飲んで服す。(外臺祕要) 【眼の昏花こんくわ】雙美丸——甘菊花一斤、紅椒こうせうを目を去つて六兩を末にし、新地黃汁で和して梧子大の丸にし、就寢時に五十丸づつを茶清で服す。(瑞竹堂方)

花上水 主治 【色を益し、陽を壯にし、一切の風を治す】(大明)

(一) 野 菊 (拾 遺)

和名 あぶらぎく、又、しまかんきく
學名 *Chrysanthemum indicum*, L.
科名 きく科(菊科)


釋 名

苦蕒 時珍曰く、蕒きくとは蓮子の心のことだ。この物は味が苦く、それに似てゐるから同名を呼ぶのである。

集 解

藏器曰く、苦蕒は澤畔に生ずる。莖は馬蘭のやう、花は菊のやうだが、

此ニあぶらぎくト稱
スルノハ右ノあぶら
ぎくデハナクしまか
んきくト云フモノデ
アル、此花ヲ往時肥
前長崎ナドデ油ニ漬
ケテ藥用ニシタノデ
ソレデあぶらぎくノ
名ガ出來タノデア
ル、故ニあぶらぎく
ハ宜シク此種ノ名ト
スベキモノデアル。



〔菊 野〕

菊は甘く、薏は苦い。諺に『苦いと薏のやうだ』といふそのものだ。

時珍曰く、苦薏は處處の原野に極めて多い。菊と異らないが、ただ葉が薄くて尖が多く、花が小さくて莖が多く、蜂窠のやうな形状のものだ。

氣味は苦く辛くして慘烈である。

根 葉 莖 花 氣 味

を服すれば大いに胃氣を傷める。

【苦く辛し、溫にして小毒あり】震亨曰く、野菊花

主 治

【中を調へ、洩を止め、血を破る。婦人の腹内の宿血によし】〔藏器〕【癰

腫、疔毒、瘰癧、眼癰を治す】〔時珍〕

附 方

新四 【癰疽丁腫】一切の無名腫毒。孫氏集效方では、野菊花を莖共に

搗き爛し、酒で煎して熱服し、汗を取り、渣を傳ければ直に癒える。○衛生易簡方では、野菊花の花、莖、葉と蒼耳草各一握を共に搗き、酒一椀を入れて絞汁を服し、

②牧野云フ、ふも
 ズニ酷似シタモノデ
 アルガ、葉ノ面背ト
 モ異色ナノツトソレ
 ハ緑ツテ居リ、今其
 何ノ種タル事不明デ
 アレガ多分 A. vultu-
 rosus, L. ノ一種
 アラウト思フ、我
 邦ノ學者之レチいぬ
 にもキ(A. Kobekaw-
 ma, Miy.) トスレド
 モ中々居ナイ。
 ③里門ハ村ノ入口
 ノ史。
 ④史註ハ歴史ノ註。
 ⑤奉州、菊ノ註チ
 見ヨ。
 ⑥上黨、菊ノ註チ

菴
蘭

（本經上品）

科學和	名無	名無	名無
名名	Artemisia vulgaris, L. var. (?)	名名	名名
きく科(菊科)		きく科(菊科)	きく科(菊科)

釋名

覆閭

時珍曰く、菴えんは草屋、閭ろは(三)里門である。この草は蒿かうの屬で、

釋名 覆閭 時珍曰く、菴えんは草屋、閭ろは三里門である。この草は蒿かうの屬で、その老莖は菴閭を蓋覆する材料になるところから名稱となつたのだ。貞元じやうげん廣利方に菴蘭蒿といひ、又、史註に『菴廬は軍行の宿室なり』とあるところを見れば、閭の字は廬と書くべきものかも知れぬ。

集
解

集 解 別錄に曰く、菴藟子は（菴藟子）雍州の川谷に生じ、また（五）上黨、及び（六）道邊（七）に生ずる。十月實を採つて陰乾する。弘景曰く、形狀は蒿、艾類のやうだ。近道の處處にある。仙經にも時にこれを用ゐ、民家ではこれを種ゑて蛇を辟ける。

見ヨ

(名) 道邊、此ニハ上黨郡ノ北境、國境地方ヲ指ス。

(名) 苑、金陵本ニ花ニ作ル。

(名) 臙ハ腹面ヲ云フ、

(名) 臙驢ハ牝驢、牡馬所生ノ雜種獸。

頌曰く、今は江淮かうわいにもある。春苗が生え、葉は艾、蒿のやうで高さ二三尺になり、七月花を開き、八月實を結ぶ。九月實を採る。

時珍曰く、菴藷の葉は艾には似ない。菊葉に似て薄く、細さいく多く、表、裏共に青い。高いものは四五尺あり、その莖は色白く、艾の莖のやうで粗あらい。八九月に細い淡黄色の花を開き、細い艾實のやうな實を結ぶ。實の中に細子があつて、極めて繁殖し易いものだ。藝を苑者はこれを以て菊を接ぐ。

子 氣 味

【苦し、微寒にして毒なし】別錄に曰く、微温なり。普曰く、神農、雷公、桐君、岐伯は苦し、小温にして毒なしといひ、李當之は温なりといふ。權曰く、辛く苦し。時珍曰く、降るもので、陰中の微陽である。足の厥陰の經の血分に入る。之才曰く、荊實、薏苡ぎぎが使となる。

主 治

【五臓の瘀血おけつ、腹中の水氣、臙脹留熱、風寒濕痺、身體の諸痛。久しく服すれば身體を軽くし、天年を延べ、老衰せぬ】本經【心下が堅く、膈中の寒熱するもの、婦人の月經不通を療じ、食物を消化し、目を明かにする。距驢きとろがこれを食つて神仙となる】別錄【氣を益し、男子の陰痿不起いんゑに主效があり、心腹脹滿を

二〇閃挫ハ關節捻挫、クシキ。

(二)大觀ニ大ノ上ニ皆ノ字アリ。

治す【甄權】【腰脚重痛、膀胱痛、及び骨節煩痛、食物の落付かぬもの】【大明】【酒に

搗つて飲めば二〇閃挫腰痛、及び婦人産後の血氣痛を治す】【時珍】

發明

頌曰く、本經に『久しく服すれば身體を軽くし、老衰せぬ』とあるが、

古方には服食するものは稀であつて、ただ諸種の雜治の藥中に入るものである。胡

洽の驚邪を治する狸骨丸の類の如

きでは二〇大方中にこれを用ゐて

ある。孫思邈の千金翼、韋宙の獨

行方には『跪折瘀血に主效ある。

いづれも菴間の單味煮汁を服す。


また末にして服するもよし』とあ

る。今は一般に打撲を治するに多く此の法を用ゐ、或は飲にし、或は散にし、その

效は最も速かだ。

時珍曰く、吳普本草、及び名醫別錄に、いづれも『距驢が菴蘭を食つて神仙とな

る』とあるが、これもただその壽命の長いことを謂つただけのことで、距驢とは獸



〔菴 蘭〕

(二) 麝ハ麝ヲ正ト
ス、一種ノ鼠ニシテ

距驢ト共生スルモ
ノ。

の名だ。騾ろに似て小さく、前足が長く、後足が短く、自から物を食ふことの出来ぬ動物で、毎に(三)麝鼠けつそを負ふてゐてそれに物を嚙かませて食ふものだ。

附方

曹一、新二。

【療血の散ぜぬもの】變じて癰腫と成るものである。生菴藹しやうあんらん

蒿の搗汁一升を服す。(廣利方)

【月經不通】婦人が持病の風冷で留血が積聚し、月經

の通ぜぬには、菴藹子一升、桃仁二升を酒に浸して皮尖を去り、研けん勻きんぎんして瓶に入れ、

酒二升に浸封して五日後に、一日三回、三合づつを日毎に服す。(聖惠方) 【産後の血

痛】菴藹子一兩を水一升、童尿二盃で煎じて飲む。(漢淵集簡方)

附錄

對廬(別錄)

有名未用に曰く、味苦し、寒にして毒なし。疥瘡かいさうの久し

く癒えずして死肌を生じたるものに主效があり、大熱を除く。煮汁で洗ふ。菴藹に

似たもので、八月採收する。

著

音は尸(シ)である。(本經上品)

和名 未詳
學名 Artemisia sp.
科名 きく科(菊科)

(一) 牧野云フ、從來我邦ノ學者之レチのナギミナギミヲモテ(Achillea stirac, Lach.)ニ充テタレドモコレヲ誤リデアツタ、著ハArtemisia 屬ノ一種ナレドモ其種ハ尙ホ未詳デアアル。

釋名

時珍曰く、按ずるに、班固の白虎通には『孔子は、著なる文字の意味は


(二) 少室ハ嵩山ノ一峰、嵩山ハ河南省登封縣ニ在リ。

(三) 蔡州ハ金部金ノ註、上蔡ハ防風ノ註ヲ見ヨ。

著であるといつた。老人は長い年處を経て多くの事物に遭遇し、よくすべてを知つてゐることを表はしたものだ』と記載してある。陸佃の埤雅には『草にして壽命の長いものだ。故に文字は著に従ふ』とある。博物志には『著は千歳にして三百莖となる。その本がかやうに老たものだから吉凶を知るのだ』とある。

集解

別錄に曰く、著實は(三)少室の山谷に生ずる。八月、九月に實を採つて日光で乾かす。



〔草 著〕

恭曰く、この草は所在にある。莖を筥に作り得るものだ。陶氏は誤つて楮實をこの物としてゐるが、楮實は味が甘く、この物は味が苦いのである。今此に正して置く。

の旁にこの草が生える。蒿のやうで叢をなし、高さは五六尺、一本に十莖、二十莖から多きは五十莖もある。その莖が真直に長く伸びる點が他の多くの蒿類と異なる特

徴だ。秋後に枝端に紅紫色で菊花のやうな形の花が咲き、艾實のやうな實を結ぶ。史記の龜策傳に『龜は千歳にして乃ち蓮葉の上に遊び、著は百莖が一根を共にする。これが生ずる土地には獸に虎、狼が無く、蟲に毒螫がない』とあり、徐廣の註に『劉向の言に、龜は千歳にして靈なるもの、著は百年にして一本に百莖を生ずる』といひ、褚先生は『著が百莖に滿つればその下に必ず神龜が居てこれを守り、その上に常に青雲があつてこれを覆ふ。傳に「天下和平にして王道正しきを得れば、著の莖が一丈の長さになり、その叢に滿百莖を生ずる」といふ。今の時世では著を取るに八十莖以上、長さ八尺のものさへ已に得難いので、ただ滿六十莖以上、長さ六尺のものを取つて用ゐ得るだけだ』といつてある。現に蔡州から朝廷へ獻納するが、いづれもさやうなこといふを言はない。して見れば、これ位のものもやはり神物に屬するもので、普通にはないものなのだ。

時珍曰く、著なるものは蒿屬の神草である。故に易には『著の徳は圓にして神なり。天子の著は長さ九尺、諸侯は七尺、大夫は五尺、士は三尺』といつてある。張華の博物志には『末が本より太いものを上とする。次は蒿であり、次は荊であつて、

皆滿月の時に溶する』とある。して見れば、卦を數へるに著のないときは荊、蒿を代用してもよいのである。

實氣味

【苦く酸し、平にして毒なし】

主治

【氣を益し、肌膚を充たし、目を明かにし、智慧を聰明にし、先見の明を得る。久しく服すれば饑を覺えず、老衰せず、身體を軽くする】（本經）

葉主治

【痞疾】（時珍）

附方

新一。【腹中の痞塊】 著葉、獨蒜、穿山甲末、食鹽を、共に好き醋を

用ゐて搗いて餅にし、痞の大、小を量つて適當に貼る。兩炷香の時間を度とする。

痞は化して膿血となり、大便に従つて排出するものだ。（劉松石保壽室方）

艾（別錄中品）

和名 よもぎ

學名 *Artemisia vulgaris*, L. var. *indica*, Maxim.

科名 きく科（菊科）

釋名

冰臺（爾雅） 醫草（別錄） 黃草（埤雅） 艾蒿 時珍曰く、王安石の字

説に「艾は疾を灸（なぐ）意義は治に同じめ得るもので、久しく經たものほど善い。故に

文字は又に従ふのだ』とある。陸佃の埤雅には『氷を圓く削つて手に持ち、日光に向けて透る光を艾に受けければ火が付く』とある。この物に氷臺なる名稱があるのはこのためであらう。醫家でこれを用ゐて多くの病に灸するから灸草といふ。灸の一灼きを一壯と云ふは、壯健の人を標準とするのである。

集解

別錄に曰く、艾葉は田野に生ずる。二月三日に採つて暴乾する。

頌曰く、處處にあるが、復道、及び四明の産が佳いとしてあつて、この種が多くの病を治するに尤も勝れてゐる。この草は初春に地に布いて苗が生え、莖は蒿に類し、葉の背は白く、苗の短いものが良い。三月三日、五月五日に葉を採つて暴乾する。久しく歳月を経た古いものを用ゐるがよい。

(一) 復道、大觀ニ復ニ作ル。唐、宋ニ復州アリ、或ハソノ地タイフカ。唐ニハ山南道ニ屬シ、宋ニハ湖北路ニ屬ス。即チ今ノ湖北省漢陽府沔陽州治ナリ。未詳。

(二) 四明ハ山名、今ノ浙江省鄞縣ノ西南百五十支里、餘姚縣ノ南百十支里ニ在リ。江南ノ一名山ナリ。故ニコノ山ヲ中心トスル一帯ノ地ヲ四明ト稱ス。

時珍曰く、艾葉は、本草には產地の記述がなく、ただ『田野に生ずる』とあつて、宋の時代には湯陰、復道のことを佳しとし、四明のものの形態を圖してあるが、近代では湯陰の産を北艾と謂ひ、四明の産を海艾と謂ひ、成化年代以來は蕪州の産が勝れたものとして用ゐられ、方物にも充てて天下に重きをなし、蕪艾と稱して喧傳されてゐる。他の地方の艾は酒壺に灸しても透らないが、蕪艾ならば一灸

蕩陰ナリ。隋ニ湯陰ニ改ム。今ノ河南省彰德府ノ湯陰縣ソノ地ナリ。

(六) 蕪州ハ言聞、時珍父子ノ生地ナリ。北周ニ置き、元ニ路トナス。明初ニ府トナシ、尋テ州トナシ、蕪州府ニ屬ス。今ハ改メテ湖北省蕪春縣トナス。

(六) 人ハ虎ノ誤。支那ノ古代艾虎懸門ノ風アリシナリ。

で直ちに透徹する點が特長である。この草は山原に多く生ずるもので、二月に舊い根から苗が生えて叢をなし、その莖は直く伸びて色が白く、高さ四五尺、葉は四邊に廣がる。葉の形狀は蒿のやうだが分れて五尖となり、極上にまた小尖があつて表が青く裏が白く、茸があつて柔く厚い。七八月に葉の間から車前の穂のやうな穂が出て細い花を開き、實は枝



〔艾〕 白

に出て細い花を開き、實は枝に盈ちて累累と結び、その中に細子があり、霜が降つてから後に枯れる。一般に五月五日に莖のまま刈取り、暴乾して葉を採り收める。予が父月

池子、諱は言聞の著書に蕪艾傳一卷があつて、『山陽に産し、采るに端午を以てす。病を治し疾に灸するに、功小補に非ず』といふ讚がある。又、宗懷の荆楚歲時記には『五月五日の雞鳴前に艾を採る。人の形に似たものを取集めて貯へ、それで病に灸すれば甚だ效驗がある。この日艾を采つて人の形を作り、門の戸に懸けて置け

ば毒氣をはらふ。その莖を乾して麻油をしめし、火を付けて灸炷に點ずれば灸瘡を滋潤ならしめ、癒えるまで疼いたまない。また著策の代用にもなり、燭の燈心にもなる』とある。

葉 修 治

宗奭そうしやく曰く、艾葉を乾して擣き、青滓せいしを去つて白い部分を取り、それに石硫黄末少量を入れたものを硫黄艾と謂ひ、灸家で使用する。米粉少量を入れて擣いた末は服食の藥に入れる。

時珍ときちん曰く、凡そ艾葉を用ゐるには、久しく置いた古いものを修治して細軟にして用ゐねばならぬ。これを熟艾じくかいといふ。生艾を用ゐて灸を點じては肌脈を傷めるものだ。故に孟子に『七年の病に三年の艾を求む』といつてある。清淨な葉を揀より取つて塵屑ちんせつを拂ひ去り、石臼に入れて木杵もきしで搗き熟し、渣滓を篩ひ去つて白い部分を取り、再び綿のやうに柔く搗き爛れる程度に搗き、使用に際して焙じ燥して用ゐれば灸火に效力を發揮する。婦人の服する丸、散藥に入れるには、熟艾を醋で煮乾かし、搗いて餅にして烘やき乾かし、再び末に搗いて用うべきものである。糯米こめ糊に和して餅にしたものや酒で炒つたものもあるが、いづれも佳くない。洪容齋こうようさいの隨筆に『艾を

(七) 木村(康)曰ク、
 よもぎノ成分ハ〇、
 〇二%ノ精油ヲ含有
 シ、ソノ主成分ハチ
 ネオール(五〇%)ニ
 シテ、他ニツヨイン
 及ビセスキテルペ
 ン、セスキテルベン
 アルコールノ類ヲ含
 有ス。中尾万三、澁
 江忠三―藥誌五一〇
 (大、一五)六三六。
 (八) 木村(康)曰ク、
 艾葉ハソノ含有スル
 グローリカリウム及
 鞣酸アルカリニヨリ
 解熱ノ效ヲ致スト雖
 モ、家兎ニヨル艾葉
 越幾斯ノ試験ニヨレ
 バ、ソノ解熱セシム
 ルニ必要ナル量ハ致
 死量ニ近キ故、解熱
 藥トシテハ用ヰルチ
 得ズト。大橋秀吉―
 東醫、一〇(一九二
 七)一一六。

強く有力ならしめるは六ヶ敷いものであるが、白茯苓三五片を入れて共に碾り、即時に細末にして用ゐるも特殊な一方法だ」といつてある。

(七) 氣味

【苦し、微温にして毒なし】恭曰く、生のは寒、熟せるものは熱である。元素曰く、苦し、温である。陰中の陽である。時珍曰く、苦くして辛し。生のは温、熟せるものは熱、升るべく降るべく、陽であつて足の太陰、厥陰、少陰の經に入る。苦酒、香附かうぶが使となる。

(八) 主治

【あらゆる病に灸する。煎にして用ゐれば吐血、下痢、下部の膿瘡、婦人の漏血を止め、陰氣を利し、肌肉を生じ、風寒を辟け、子を儲けしめる。煎に作るには風に當ててはならぬ】別錄【搗汁たうじゆを服すれば傷血を止め、蛇蟲じゆうちゆうを殺す】(弘景)【衄血、下血、膿血痢に主效がある。水で煮、または丸、散の隨意にして用ゐる】(蘇恭)【崩血、腸痔血を止め、金瘡たふを搗し、腹痛を止め、胎を安らかにする。苦酒で煎にして用ゐれば癰を治するに甚だ良し。搗汁を飲めば心腹一切の冷氣、鬼氣を治す】(甄權)【帶下たひげを治し、霍亂轉筋、痢後の寒熱を止める】(大明)【帶脈の病となつて腹が脹は滿し、腰が溶溶として水中に坐する如くなるを治す】(好古)【中を温め、冷を

（九）滿、本草洞玄ニ
痛ニ作ル。

逐ひ、濕を除く（時珍）

發明

説曰く、春季に艾の嫩葉を採つて菜にして食ひ、或は麪に和して彈子大の餛飩にして三五箇を吞み、飯を食つて上から壓すれば、一切の鬼、惡氣を治す。長きに互つて服すれば冷痢を止める。又、嫩艾で作つた乾餅子を生薑煎で服すれば、瀉痢、及び産後の瀉血を止めること甚だ妙である。

頌曰く、近世では艾を單服するものがあり、或は蒸した木瓜と和して丸にし、或は湯に作つて空腹に飲むものもある。甚だ虚羸を補するものではあるが、けれどもやはり中毒を發することがあつて、ために熱氣が衝上し、狂燥して始末がつかなくなり、眼を攻め、瘡が生じ、出血するに至る場合がある。誠に妄りに服すべきものではない。

震亨曰く、婦人の不妊症は、多くは血が少いために受精不能となるのである。俗醫は、子宮の虚冷と考へて辛、熱の藥を投じ、或は艾葉を服さしめたりするが、何ぞ知らん艾は性至熱なるものであつて、火を用ゐて灸すれば氣が下行し、藥に入れて服すれば氣が上行するものなのだ。本草にはただその性を温なりといつただけで、熱

(一〇)太陽ノ眞火ハ日輪ノ火。
(一一)肅殺ハ嚴厲摧殘ノ意。
(一二)沈ハ深ナリトアリ、重病ヲ云フ。

(一三)熱因ハ熱性ニ同シ。

といつてないところから、世人はその温を喜んでおほむ率ねこれを多く服し、久しきに亙つて中毒を發してゐる。しかし罪を艾に歸するわけには行かない。予は蘇頌の圖經を讀んで、この問題に關し深く感ずるところがあつた。

時珍曰く、艾葉は、生では微苦にして甚だ辛く、熟では微辛にして甚だ苦い。生は温、熟は熱、純陽である。以て(一〇)太陽の眞火を取るべく、以て絶るにたんだん垂たる元陽を回めぐらすべく、これを服すれば三陰に走つて一切の寒濕を逐ひ、(一二)肅殺の氣を轉じて融和をなし、灸すれば諸經に透つて百種の病邪を治し、(一三)沈ちん痾かの人を起たしめて康泰にする。その功まことに大なるものである。蘇恭が『その性は寒なり』といひ、蘇頌が『毒あり』といふは、一はその能く諸血を止めるを見、一はその熱氣の上衝するを見て、性の寒なるもの、毒なるものと誤認したので。蓋し血は氣に隨つて行り、氣が行れば血が散ずるものであつて、(一四)熱因のものを久服すれば火の上衝を惹ひき起おこすことに理解を缺いたのだ。そもそも藥の目的は病を治するにある。病的中として作用を十分に發揮すれば、それで能事を畢はるのだから、直ちにこれを止むべきものである。若し元來虛寒、癰冷ようれいのもの、婦人の濕鬱、帶漏の患者の場合ならば、それ

に對しては艾を用ゐて當歸、香附の諸藥を和し、以てその病を治するといふ方法に何の不都合なところがあらうか。而るに、ただ妄りに妊娠を圖るに急にして、間斷なく艾を服し、更にその藥力を助くるに辛、熱のものを以てするが如きは、藥性久しきに互つて偏の現象となり、遂に火を躁する結果となるのである。そもそも何ものの罪であるか、艾に何の罪ありと言ひ得るか。艾附丸には、心腹、少腹の諸痛を治し、婦人の諸病を調へるに頗る深い效力があるではないか。膠艾湯には、虛痢、及び妊娠、産後の下血を治するに就中著しい效驗があるではないか。老人の丹田の氣の弱きもの、臍腹に冷を畏るものには、熱艾を布袋に入れてその臍腹を覆ひ溫むれば言ふべからざる妙がある。寒濕脚氣にもやはりこれを足袋の裏に夾むがよいものだ。

附方

舊二十四、新二十七。

【傷寒時氣】溫疫で頭痛し、壯熱し、脈盛なるには、

乾艾葉三升を水一斗で一升到煮取つて頓服し、汗を取る。(時後方) 【妊娠傷寒】壯熱

して赤斑を生じ、變じて黑斑となり、尿血するには、艾葉を雞子大ほどを酒三升で

二升半に煮取り、二回に分服する。(傷寒類要) 【妊娠風寒】突然風寒に中つて人事

(五)本草發揮ニ三十一二作ル。

(六)承漿ハ下唇ノ正中ノ穴、頰車ハ耳前ノツガヒノ穴。
(七)不仁ハ無感覺。
(八)斛ハ日本ノ三斗九升餘。
(九)瓦甌ハ瓦製ノ蒸籠和名コシキ。

(一〇)大觀ニ奇ヲ得ニ作ル。

(一一)大觀ニ臣ヲ亞ニ作ル。

(一二)穀道正門トハ肛門ヲ指ス。

不省となり、中風の如き症状には、熟艾(二五)一兩を米醋で炒つて極熱し、絹に包んで臍下(一六)を熨すれば良久して甦る。(婦人良方)【中風口喎】長さ五寸の葦の筒を用ゐ、一

方の端を耳中へ刺入れ、四面を麪で密封して風の透らぬやうにし、一方の端へ艾で

七壯灸する。右を患ふものには左へ灸し、左を患ふものには右へ灸する。(勝金方)【中

風口噤】熟艾で(二六)承漿(一七)の一穴、頰車(一八)の二穴に各五壯を灸する。(千金方)【中風掣痛】

不仁のもの、不隨のもの、いづれも乾艾を(一九)斛ほどの量を揉み團めて(二〇)瓦甌

の中に入れ、頤の下方の孔を盡く塞いで只一箇の孔を残し、その孔に患部を當てて

中の艾を焼く。二時間経てば反應が現はれる。(肘后方)【舌縮口噤】生艾を搗いて傅

ける。乾艾をしめしてもよし。(聖濟錄)【咽喉腫痛】醫方大成では、艾の嫩葉(二一)の搗汁

を少しづつ嚥む。○經驗方では、青艾の莖、葉一握を醋で搗き爛し、喉の上に傅

ける。冬季は乾艾を用ゐるも(二二)可し。李臣(二三)が所傳の方である。【癰癤諸風】

熟艾を陰囊の下、(二四)穀道正門(二五)の中間に當て、患者の年齢の多少に隨つて灸する。(斗

門方)【鬼擊中惡】突然感染し、胸、脇、腹中が刀で刺されたやうに汚刺切痛して

觸れることも出來ず、ともすれば吐血し、鼻中出血し、下血するは、一名鬼排とい

(二三) 撮口ハロヲ閉
ルコト。

ふ病である。熟艾雞子三箇ほどを水五升で二升に煎じて頓服する。(肘後方) 【小兒の

臍風】(二三) 撮口するには、艾葉の燒灰で臍中を填め、帛で縛つて置けば效がある。或

は蒜さんを敷いて上から灸し、口中に艾の氣が出るやうになれば立ちに癒える。(簡便方)

【狐惑蟲匿】病人が齒に色澤がなく、舌上が白くなり、或は睡ることを好み、痛さ痒

さが何れの部分にあるかを知らず、或は下痢するには、急に下部に治療を加ふべき

ものである。それを知らずして上部に治療を加へると、下部に蟲を生じて肛門こうもんを食

ひ、爛れが五臟に現はれるやうになつて死亡するものだ。これには管の中で艾を燒

き、下部を熏して烟を入れる。或は少し雄黃ゆうわうを加へるが更に妙だ。罌中びゅうちゅうで烟に燒い

て入れるもよし。(肘後方) 【頭風の久痛】蕪艾わがいを揉んで丸にし、時時に嗅ぐ。黃水の

出るを度とする。(青囊雜纂) 【頭風の面瘡】痒くして黃水の出るには、艾二兩を醋一

升で砂鍋で煎じ、一日三回、汁を取つて紙上に塗つて貼る。(御藥院方) 【心腹ななの惡氣】

艾葉の搗汁を飲む。(藥性論) 【脾胃の冷痛】白艾末二錢を沸湯で服す。(衛生易簡方) 【蚘

蟲心痛ちゅうじんつう】刺すが如く痛み、口より清水を吐くには、白熟艾一升、水三升を一升に煮

て服すれば蟲を吐出する。或は生艾の搗汁を取り、深夜五更かうはに香脯一片を食つてそ

(三) 野雞痔ハ形狀雞心、雞肝ニ似タルヲ云フ。

の汁一升を飲む。蟲を下出するものだ。(肘後方) 【口より清水を吐くもの】 乾蘄艾の煎湯を啜る。(經證奇方) 【霍亂吐下】 止まぬには、艾一把を水三升で一升到煮て頓服する。(外臺祕要) 【老人、小兒の白痢】 艾薑丸——陳北艾四兩、乾薑を炮いて三兩を末にし、醋で煮た倉米糊で梧子大の丸にし、七十丸づつを空心に米飲で服す。甚だ奇效がある。(永類方) 【諸痢久下】 艾葉、陳皮等分の煎湯を服す。また末にし、酒で煮爛した飯に和して丸にし、二三十丸づつを鹽湯で服す。(聖濟總錄) 【暴泄の止まざるもの】 陳艾一把、生薑一塊を水で煎じて熱服する。(生生編) 【大便後の下血】 艾葉、生薑を煎した濃汁三合を服す。(千金方) 【野雞痔病】 豫め槐柳湯で洗ひ、艾でその上に七壯を灸して效を取る。郎中の王及が驛に乗つて西川へ往く途中、數日にして痔病が甚しく發り、胡瓜のやうになつて腸の端が貫かれるやうに覺え、熱は火の如くにして忽ち打ち倒れた。途中のこととて手當の施しやうもなく、困つてゐた。その時その驛の長が『これは灸すれば瘥える』といつて、前記の方法で三五壯灸すると、忽ち一道の熱氣が腸中に入るやうに覺え、夥しく轉瀉して同時に血穢を併出し、瀉出して後は胡瓜のやうなものの所在がなくなつた。(經驗良方) 【妊娠下血】 張仲景は『婦

人には、漏下のものあり、半産後に下血の絶えぬものあり、妊娠下血のものもある。いづれも膠艾湯を主として用ゐる。阿膠二兩、艾葉三兩、芍藥、甘草各二兩、當歸、地黄各三兩、芍藥四兩、水五升、清酒五升を三升に煮てから、膠を納入れて盡く溶かし、その溫酒一升づつを一日三回に服す。（金匱要略）【妊娠胎動】或は腰痛し、或は心を搶さ、或は下血して止まず、或は逆産で産兒が腹中で死亡したるものには、艾葉雞子一箇ほどを酒四升で二升に煮取り、二回に分服する。（肘后方）【胎動で心を壓迫するもの】痛みを覺ゆるには、艾葉を雞子ほど、頭醋四升を二升に煎じ、分けて溫服する。（子母秘錄）【婦人の崩中】連日止まぬには、熟艾を雞子ほど、阿膠を炒つて半兩、乾薑一錢を用ゐ、水五盞で先づ艾、薑を二盞半に煮て傾け出し、それに膠を入れて溶化し、三服に分けて一日の内に服し盡す。（初虞世古今錄驗）【産後の瀉血】止まぬには、乾艾葉半兩、炙熟した老生薑半兩の濃煎湯を一服する。立ろに妙效がある。（孟詵食療本草）【産後の腹痛】死せんとするは寒に感ずるが原因だ。陳蘄艾二斤を焙じ乾し、搗いて臍上に鋪き、その上に絹を覆ふて熨斗で熨す。口中より艾の氣が出るまで試むれば痛が自から止む。（楊誠經驗方）【突然の吐血】一二口吐き、或は心

衄し、或は内崩するには、熟艾三團、水五升を二升到煮て服す、ある方では、焼灰

二錢を水で服す。(千金方) 【鼻血の止まぬもの】灰を吹く。また艾葉を煎じて服する

もよし。(聖惠方) 【盗汗の止まぬもの】熟艾二錢、白伏神三錢、烏梅三箇、水一鍾を

八分に煎じ、就寢時に溫服する。(通妙眞人方) 【火眼腫痛】艾を燒き烟をたてて盥を

覆ふせ、烟の盡るを待つて盥の上に著いた煤を刮下し、溫水で調化して眼を洗へば

直ちに瘥える。更に黃連を入れるが尤も佳し。(斗門方) 【面上の肝黯】艾灰、桑灰各

三升を用ゐ、水で三回繰返して淋汁を取り、五色の布に入れて共に煎じ、丸にし

得る程度に煎じて少量づつ傳ける。自から爛れ脱ちること甚だ妙である。(外臺秘

要) 【婦人の面瘡】粉花瘡と名ける。定粉五錢を菜子油で調へて盥内に泥り、艾一

二團を燒いてその烟で熏じ、烟の盡くるを待つて地上に覆ひ、一夜置いて取出し、

調へて搽る。永く癰痕が無くなり、また肉も生じ易い。(談華翁試驗方) 【身體、面部の

疣目】艾火で三壯灸すれば取れる。(聖惠方) 【驚掌風病】蕪艾の眞のもの四五兩を水

四五盥で煮て五六回たぎらせ、大口瓶に入れ麻布を二層にかけて縛り、手の心をそ

の瓶の上に置いて熏じ、冷えれば再び熱する。神の如き效がある。(陸氏積德堂方) 【疥

(二五) 疳瘡ハ甜瘡ノ誤ナラン、甜瘡ハミツガサ。

(二六) 大觀ニ爛上ニ黃字アリ、黃爛瘡ハ黃水瘡和名ミツガサノコトナラン。

(二七) 韓字ハ本草發揮ニ幹トアリ。

瘡の靈法】熟蕪艾二兩を用ゐ、木鼈子三錢、雄黃二錢、硫黃一錢を末にし揉んで艾中に入れ、分けて四本の撚りにし、一本づつを陰陽瓦中に入れ、寢具中に置いて烘き熏じ、後に通聖散を服す。(醫方摘要) 【小兒の(二五) 疳瘡】艾葉一兩を水一升で四合に煮て服す。(備急方) 【小兒の(二六) 爛瘡】艾葉の焼灰を傳けるがよし。(子母秘錄) 【臍瘡口冷】瘡口の合はぬには、熟艾を烟に焼いて熏ずる。(經驗方) 【白癩風瘡】乾艾を多少に随つて麴に浸し、普通の方法のやうに酒に醸して日毎に飲む。痺を覺えれば瘥える。(肘后方) 【疔瘡腫毒】艾蒿一擔を灰に焼いて竹筒中で淋汁を取り、一二合で石灰を和して糊のやうにし、先づ針で瘡を痛いまでに刺してその藥を點ける。三回試みればその根が自から抜ける。玉山 (二七) 韓光が此の方で一般人に治療を施して神驗があり、貞觀の初年、衢州の徐使君が此の方を求め傳へたものである。予も此の方で三十餘人を治療して效驗を得た。(孫眞人千金方) 【發背の初期】未だ成らざるもの、及び諸熱腫。濕紙を上に掲つて見て、先づ乾いた部分が頭になるものだ。その部分へ艾を着けて壯數に拘はらず灸する。痛むものには痛まなくなる迄灸し、痛まぬものには痛むまで灸する。それで毒は散ずるものだ。散せずとも内攻を免かれるの神

二八 錢字ハ大觀ニ從
フ。

二九 大觀ニ三十三
ニ作ル。

方である。(李絳兵部手集) 【癰疽ようその合はぬもの】瘡口の冷滯れいたいである。北艾の煎湯で洗ひ、

後に白膠で重する。(直指方) 【咽喉骨哽ごっかう】生艾蒿數升を水、酒共に一斗で四升に煮て

少量づつ飲めば下る。(外臺祕要) 【誤つて銅どう錢を吞みたる時】艾蒿一把を水五升

で一升到煎じて頓服すれば下る。(錢相公篋中方) 【諸蟲蛇傷】艾で數壯を灸するが甚だ

良し。(集簡方) 【風蟲牙痛】蠟を化して少量を紙にのし、それに艾を鋪ふいて箸で筒に

巻き、烟に焼いて左右に随つて鼻を熏じ、また烟を口に満てて氣を吸ふ。疼うづきが止

まり、腫が退く、靳季謙きんきけんはこの病で月餘に互つて苦しんだが、この法を一回試みて

直ちに癒えた。(普濟方)

實 氣味

【苦く辛し、暖にして毒なし】

主治

【目を明かにし、一切の

鬼氣を療ず】(甄權)

【陽を壯にし、水臓、腰、膝を助け、また子宮を暖める】(大明)

發明

詵ごいし曰く、艾子と乾薑と等分を末にして蜜で梧子大の丸にし、空心にこころ

三丸づつ服し、飯三五匙を食つて壓する。一日二回づつ服すればあらゆる惡氣あくきを治

し、其鬼神は速かに走出する。農家の患者などには此の方を與へるが甚だ適するも

のだ。

(一)夏臺、李時珍ノ
說ニ據レバ、よもぎ
即チ艾ト同物ナラン
トノ事デアル。

(二)牧野云フ、海邊
ニ生ズル亞灌木デ莖
葉灰白毛ヲ布キ異觀
ヲ呈スル、學名ハ一
に *C. artemisioides*、
イタ藥、ト稱スル、我
邦デハ琉球、臺灣、小
笠原島ニ産スル。
(三)武當ノ太和山、
武當ハ石部縣石ノ註
チ見ヨ。太和山ハ今
ノ湖北省均縣ノ南武
當山ノ東南ニ相接
ス。
(四)失樞ハ欠刻ナ云
フ。

附 錄

(一)夏臺(別錄)

有名未用に曰く、

味甘し。百病に主效があり、絶氣を濟す。

弘景曰く、この藥にも神異があつてさうなのだが、一向に用ゐることを識らぬのは遺憾なことだ。時珍曰く、艾を氷臺と名け、このものを夏臺と名けるが、艾には百病に灸し、能く絶氣を回すといひ、このものには百病に主效があり、絶氣を濟ふといふのだから、恐らくこれは一物を重複して掲げたものであらう。故に艾の後に附録して置く。

(二)千年艾 (綱 目)

和名 もくびやくかう(木白蒿)
學名 *Crossostephium chinense* Makino.
科名 きく科(菊科)

集 解

時珍曰く、千年艾は(一)武當の太和山中に産する。小莖で高さ一尺ばかり、その根は蓬蒿のやうなもので、葉は長さ一寸餘で、失樞がなく、表面は青く背



[艾 年 千]

面は白い。秋野菊のやうで小さい黄色の花を開き、青珠や丹顆のやうな形の實を結ぶ。三伏の日に葉を採つて暴乾するものだ。その葉は艾に

は似て居らぬが、艾の香氣があり、磨り揉めは碎ける。艾葉の様に毛茸きようじようをばなさぬものだ。道士間の交際に贈答用品として用ゐられる。

華 氣味

【辛く微し苦し、溫にして毒なし】

主治

【男子の虛寒、婦人

の血氣諸痛に水で煎じて服す】（時珍）

（一）木村（康）曰ク、

茵陳蒿ハ我邦ニ於ケル市販品ハ、立飲ノ候採集乾燥セルかはらふもぎノ果穂ヨリ成レドモ、上海品ニヨレバ越冬状態ノかはらふもぎノ全草ヲ用ウルモノナルガ如シ。

茵陳蒿（本經上品）

和名 かはらふもぎ
學名 *Artemisia capillaris* Thunb.
科名 きく科（菊科）

釋名

藏器曰く、この草は蒿類ではあるが、冬を経て枯れず、更に舊苗に因つて生ずるものだ。故に因陳いんちんと名ける。蒿の字は後に加へたものだ。時珍曰く、按ずるに、張揖の廣雅、及び吳普本草には、いづれも因塵いんじんと書いてある。何の意義か判らない。

集解

別錄に曰く、茵陳いんちんは太山たいざん、及び丘陵、坡岸はがんの上に生ずる。五月、及び立秋に採つて陰乾する。弘景曰く、今は諸處にある。蓬蒿に似て葉は緊つて細く、秋後に莖は枯れるが冬を経て枯れず、春になるとまた生える。韓保昇曰く、葉は青

(二) 和州ハ石部馬腦ノ註ヲ見ヨ。

(三) 南山ハ石部五色石脂ノ註ヲ見ヨ。

(四) 大觀ニ四ニ作ル。

(五) 江寧府ハ草部芳草類當歸ノ註ヲ見ヨ。

(六) 階州ハ石部玉ノ註ヲ見ヨ。

(七) 大觀ニハ一ナ亦ニ作ル。

蒿に似て背面が白い。大明曰く、茵蔯は^(二)和州^{わしゅう}、及び^(三)南山^{なんざん}の嶺上に生ずる。一名石茵蔯といふ。

頌曰く、近道いづれにもあるが、太山のもの佳きには及ばない。春初に苗が生えて高さ^(四)三五寸になる。蓬蒿に似て葉は緊つて細く、花、實は無い。五月、七月に莖、葉を採つて陰乾する。今はこれを山茵蔯といつてゐる。^(五)江寧府^{かうねいふ}の一種の茵蔯は、葉は大きく、根は粗く^(六)して黄白色だ。夏になると花を開き實を結ぶ。^(七)階州^{かいしゅう}の一種の白蒿は、^(七)一に青蒿に似たもので背が白い。それをその地方では皆茵蔯と稱して藥に入れてゐる。現に南方の醫師間で用ゐる山茵蔯には數種あつて、種類の説を爲し『山茵蔯は、汴京^{べんきやう}、及び北地で用ゐてゐるものは、艾蒿のやうで葉が細く背が白く、氣はやはり艾のやうで味は苦い。乾せば色が黒くなる。江南で用ゐるものは、莖、葉すべて家茵蔯に似て大きく、高さ三四尺あり、氣は極めて香しく味は甘く辛い。俗にまた龍腦薄荷^{りゅうなごめいこう}と名ける。吳中で用ゐるものは、あれは石香薷^{せきかうじゆ}で、葉は至つて細く黄色だ。味辛く甚だ香烈で性の溫なるものだ。若し誤つて脾を解する藥として服すれば大に煩せしめる』といふ。これを本草の記載に照して見るに、本

（ハ）大觀ニ腦ニ作ル。

草にはただ茵陳蒿とあつて山茵陳とはないが、註に『葉は蓬蒿に似て緊つて細い』とあるのだから、今の汴京、北地で用ゐる山茵陳がそのものに當つてゐる。ところが大體世俗の方では、山茵陳を、^ハ體痛を療じ、傷寒を解し、汗を發し、肢節の滯氣を



〔蒿 陳 茵〕

行り、痰を化し、^ハ脇を利し、勞倦を治する肝要のものとして用ゐてゐるが、本草の本文に就て考ふるに、茵陳はただ黃疸を療し、小便を利すにあつて、世俗の方とは全然合致しない。現に實驗に據れば、汴京で用ゐ

る山茵陳は、肌を解し、汗を發する藥としては灼然たる效が少く、江南の山茵陳は、傷寒、腦痛を療する點に於いて非常に優れた功力がある。近頃醫界の議論では『所謂家茵陳なるものやはり能く肌を解し、脇を下し、胸中の煩を去るものだといふが、方家では用ゐることが少で、ただ研つて飲として服する位ものだ。これは本草には記載がなく、俗間の方から發見されたもので、茵陳蒿とは確に別の一種

の植物だ。主治の功用も自ら異ふ。茵蔯蒿、即ち山茵蔯なりとは斷じ得ない』といふけれども、此の説もやはりまだ正確な根據とはなり得ないやうだ。要するに、功力の點で比較すれば江南のものが勝れてゐるが、文獻上の權威なる本草經に、其事が記載されなかつたといふわけだから、醫方に用ゐるには更に研究の餘地あるものといふべきだ。

（一〇）八角トハハツノ
分岐アルモノノコ
ト。

穀曰く、凡そこれを用ゐるには、葉に八角あるものを陰乾し、根を去つて細かに剉んで用ゐる。火を犯さしめてはならぬ。

（一一）沐、當ニ糲ニ作
ルベシ。
（一二）三字救荒野ニ據
テ改ム。

時珍曰く、茵蔯は、古代には多く栽培して蔬菜にした。故に藥に入れるには山茵蔯を用ゐたのであつて、それが家茵蔯との區別を生じた所以である。洪舜俞の老圃賦に『醃糟、紫薑の掌、沐醢、青蔯の絲』とあるその青蔯はこの物だ。今は淮揚地方では、三月三日にやはり野茵蔯の苗を採つて粉麪に和し、茵蔯餅といふものを作つて食ふ。後世では、各地それぞれ傳はるところに據つて使用し、名稱を付したので、ために名稱と事實に混亂を生じたわけである。現に山茵蔯は、二月に苗が生え、莖は艾のやう、葉は淡色の青蒿のやうで背面が白く、葉は岐れて緊つて細く、扁平

ると整なるとあり、九月に細い黄色の花を開いて大さ艾子ほどの實を結び、花、實いづれも菴藨えんろうの花、實と似てゐる。また花、實の無いものもある。

莖葉(二二) 氣味

【苦し、平にして微寒なり、毒なし】 昔曰く、神農、岐伯、

雷公は苦し、毒なしといひ、黃帝は辛し、毒なしといふ。權曰く、苦く辛し、小毒あり。大明曰く、石茵蔯は苦し、涼にして毒なし。簡砂たうしやを伏す。張元素曰く、苦く甘し、陰中の微陽であつて、足の太陽の經に入る。

(二三) 主治

【風濕寒熱、邪氣熱結、黃疸。久しく服すれば身體を軽くし、氣を益し、老衰に耐へ、顔色を白くし快活にし、天年を長くする。白兔は食つて仙となる】

(未經) 【全身の發黃、小便不利を治し、頭熱を除き、(二四) 伏瘕ふくかを去る】 (別錄) 【關節を

猪子吉人・東醫四(明三三)一二七、一三三九。

(二四) 伏瘕ハ腹中ノ結聚。

(二五) 茵蔯ハ閑推ヲ云フ、芝經ハ氣絶。

發明

弘景曰く、仙經に『白蒿を白兔が食へば仙となる』とある。而るにこ

こには茵蔯としてあるが、これはこの本文の方の誤だ。

宗奭曰く、張仲景は、傷寒しやうかんで熱甚しくして發黃し、身體、顔面悉く黄色なるを治

（六）大觀ニ而字無ク
病不去ノ三字アリ。

（七）知アルトハ效能
ノ表ハレルコト。

（八）苗トハ一般ノ植
物ノ苗ヲ指ス。潞ハ
淫雨ニ遭フナリ。

（九）大觀ニハ瘡ニ作
ル。

するに、これを用ゐれば極めて效ありといふ。ある僧が、傷寒後の發汗が徹底せずして、ために留熱があり、身體、顔面が黃色となつて熱多く、一个年近くも癒えなかつた。醫師は食治の方法を講じたが、少しもその病證に對應せず、（一〇）而して食慾は減ぜなかつた。そこで予がこの藥を與へて五日間服ませると、病は三分の一を減じ、十日にして三分の二を減じ、二十日にして悉く除き去つた。その方は、山茵陳、山梔子各三分、秦艽、升麻各四錢を散にし、三錢づつを水四合で二合に煎じて滓を去り、食後に溫服して（一一）知あるを度とするのである。この藥は山茵陳を基本としたものだから茲に記錄する。

王好古曰く、張仲景の茵陳梔子大黃湯は、濕熱を治し、梔子藥皮湯は、燥熱を治す。（一二）苗が潞すれば濕黃し、苗が旱するときは燥黃すると同様なもので、濕なれば瀉し、燥なれば潤せばよいのである。この二藥は陽黃を治するもので、韓祿和、李思訓は陰黃を治するに茵陳附子湯を用ゐたが、大抵茵陳を君主藥として大黃、附子を佐とし、それぞれ寒熱の程度に隨つて用ゐたのである。

附方

舊二、新六。

【茵陳羹】大熱黃疸、傷寒頭痛、風熱瘴瘧を除き、小便

(二〇)癰瘍ハ汗斑、即チあせなまづ。

(二一)牧野云フ、集解ノ文ヲ玩味スルニ誠ニ能クかはらにんじんト合ス。

を利す。茵蔯を細に切つて羹にして食ふ。生で食ふもよし。(食醫心鏡) 【全身の風痒】
瘡疥を生ずるには、茵蔯を煮た濃汁で洗へば立ろに瘡える。(千金方) 【(二二)癰瘍風病】
茵蔯蒿二握を水一斗五升で七升に煮取り、先づ皂莢湯で洗つて次にこの湯で洗ふ。
冷えれば更に作り、隔日に一回洗ふ。然らざれば恐らく痛むものである。(崔行功纂要)
【風疾攀急】茵蔯蒿一斤、秬米けふまい一石、麴きよく三斤を和し、普通の方法のやうにして酒に
醱して服す。(聖濟總錄) 【金の如き色の癰黃】好く眠り、涎を吐くには、茵蔯蒿、白鮮
皮等分を水二鍾で煎じて一日二回に服す。(三十六黃方) 【全身黃疸】茵蔯蒿一把を生薑
一塊と共に擣き爛らし、日毎に胸前と四肢に擦る。【男子の酒疸】茵蔯蒿四根、扨
子七箇、大田螺だいでんらを殻のまゝ一箇を擣き爛らし、煮沸した白酒一大盞を注ぎ入れて汁
を飲む。祕方である。【眼熱赤腫】山茵蔯、車前子等分を湯に煎じ、茶調散を調へ
て數服する。(直指方)

(二) 青 蒿 (本經下品)

和名 かはらにんじん
學名 *Artemisia nipponica*, *linno.*
科名 きく科(菊科)

(一) 藟音李又玄切
音キ。

(二) 狙ハ狸ノ一種。

釋名

草蒿(本經)

方漬(本經)

藟音は牽(ケン)である。去聲に發音する。

狙蒿(蜀本)

香蒿(衍義)

保昇曰く、草蒿は、江東地方では狙蒿と呼ぶ。

氣臭が狙

に似てゐるからだ。北方では青蒿と呼ぶ。爾雅に『蒿は藟なり』とあり、孫炎の註

に『荆楚地方では蒿を藟といふ』といひ、郭璞の註には『今人は青蒿と呼ぶ。香菜

中で炙いて啖へるものが藟である』といつてあるがそれである。時珍曰く、晏子に

『蒿とは草の高きものなり』とある。按ずるに、爾雅に、蒿類の中で獨り藟のみが

蒿の單稱となつてゐるのは、他の諸蒿は皆葉の背面が白いが、この蒿のみ獨り青い

點が他の諸蒿と異つてゐるからではあるまいか。

集解

別錄に曰く、草蒿は華陰の川澤に生ずる。弘景曰く、諸處にある。

即ち今の青蒿だ。世間ではやはりこれを取つて香菜を雜せて食ふ。

保昇曰く、嫩いうちに醋に漬けて茹にすれば自然に香しいものだ。葉は茵陳蒿に

似てゐるが背面が白くない。高さは四尺ほどになる。四月、五月に採つて日光で乾

して藥に入れる。詩に『呦呦たる鹿鳴、野の蒿を食ふ』とあるは即ちこの蒿であ

る。

〔註〕華陰ハ石部白石
英ノ註ヲ見ヨ。

頤曰く、青蒿は、春苗が生え、葉は極めて細い。食し得る。夏になれば高さ四五尺になり、秋後に細かい淡黄色の花を開き、花の下に粟米大の子を結ぶ。八九月に子を探つて陰乾するものだ。根、莖、子、葉、いづれも薬に入れて用ゐる。乾し炙いて飲に作れば香しくて尤も佳い。



〔蒿〕

青

宗奭曰く、青蒿は春を迎へることが最も早く、一般に摘み採つて蔬菜にする。根は赤く、葉は香しい。沈括の夢溪筆談に『五、青蒿は一類に自から二種あつて、一種は黄色だ。一

(五) 白井曰ク、青蒿、黄花蒿相似テ稍異ナル、一類二種トハ之ヲ指スモノノ如シ。
(六) 銀ハ銀州、山草類柴胡ノ註ヲ見ヨ。
(七) 綏ハ西魏ニ置キタル綏州、即チ今ノ陝西省綏德縣ノ地ナリ。

種は青色で、本草に青蒿と謂ふものが是である。やはり區別はあるのだ。陝西、(六) 銀(七) 綏の地方の蒿叢中に、時に一兩株特に目立つて青いものがあつて、その地方ではこれを香蒿といふ。莖、葉は通常の蒿と同一だが、ただ通常の蒿は色が淡青で、この蒿は深青だ。杉や檜の色(八)のやうであつて、秋深くなれば他の蒿はいづれも黄になるが、この蒿だけは猶ほ青く、その氣は芬芳である。恐らく古人はこの深青のも

のを用ゐて勝れたるものとしたのであらう。然らずんば諸種の蒿の一として青くないもののあつたためしはない』とある。

時珍曰く、青蒿は、二月苗が生え、莖は粗く、指ほどあつて肥えて軟かい。莖、葉共に色は深青だ。その葉は微し菌蔭に似てゐるが表裏共青く、その根は白く硬い。七八月に細かな黄花を聞いて頗る香しい。大さ麻子ほどの實を結び、中に細子がある。

修治

數曰く、凡そこれを用ゐるには、中ほどが妙であつて、膝に到れば仰ぎ、腰に到れば俛す。子を使ふときは葉を使つてはならぬ。根を使ふときは莖を使つてはならぬ。子、葉、根、莖の四件を同時に使へば忽ちに痼疾となる。葉を採つて用ゐるには、七歳の小兒七人から取つた尿に七晝夜浸し、漉出して晒し乾して用ゐる。

葉 莖 根 子

氣 味

【苦し、寒にして毒無し】時珍曰く、硫黃を伏す。

主 治

【疥癩、癰瘡、惡瘡、蝨を殺す。留熱の骨節の間に在るを治し、目を明かにする】本經【思氣、尸疰の伏し。留、婦人の血氣で腹内の滿するもの、及び冷熱

(八) 此文解シガタシ。膝ニ到ルト云フモノハ成長ノ中途ニアルモノ、腰ニ到ルト云フモノハ充分成長セルモノヲ指スモノカ。

(九) 木村(康)曰ク、成分ハ苦味質、精油及ビアブラタニン。

W. P. 781.

U. S. D. 1921.

(一〇) 留、大觀ニ連トアリ、尸症ノ伏連ハ尸病一種伏尸チ指スモノナラン。病名彙解ニ説アリ。

(一一) 蒜髮ハ斑髮ノコト、ワカシラサ。
(一二) 擣、大觀ニ接ニ作ル。

(一三) 伏トハ三伏チ云フ、夏至後第三庚日チ初伏トナシ、第四庚日チ中伏トナシ、立秋後第一庚日チ末伏トス。

久痢。秋、冬は子を用ゐ、春、夏は苗を用ゐる。いづれも擣汁たつじゆを服し、また曝乾して末にし、尿を入れた酒で和して服す【藏器】【中を補し、氣を益し、身體を軽くし、勞を補し、顔色の衰ひを駐とどめ、毛髪を長く黒くし、老衰せず、兼ねて(一四)蒜髮さうぼうを去り、風毒を殺す。心痛、熱黄には生で(一五)擣いて汁を服し、并に貼る】大明【瘧疾寒熱を治す】(時珍)【生で擣いて金瘡に傅ければ血を止め、疼を止めるに良し】(蘇恭)【煨灰で紙を隔てて淋汁を取り、石灰に和して煎じて用ゐれば、惡瘡の瘰癧ろくぎ、癰癤ようたんを治す】(孟詵)

〔發明〕 頤曰く、青蒿は骨蒸、熱勞を治するに最たるもので、古方ではこれを

單用してある。

時珍曰く、青蒿は、春木、少陽の氣を受けることの最も早いものだから、主たる治效のある病證は皆少陽、厥陰けつゐんの血分の病である。按ずるに、月令通纂に「(一六)伏ふくの内の庚かうの日に青蒿を採り、屋敷の内に懸けて置けば邪氣を辟ける。陰乾し末にして貯へ、冬至とうじと元日げんじつとに家族が各二錢を服するもよし」とある。これに由つて觀れば、青蒿が鬼魅きまい、伏尸ふくしを治すといふも、蓋し伏する作用のあるものと見える。

附方

黃四、新十三。

【男女の勞瘦】青蒿を細かに剉み、水三升、童尿五升と共に

一升半に煎じ、滓を去り器に入れて煎膏し、梧子大の丸にして空心の時、及び就寢時に二十丸づつを溫酒で服す。(斗門方)

【虛勞寒熱】肢體がだるく、疼くには、男

女に拘はらず、八九月青蒿の實を結ぶとき採つて枝梗を去り、童尿に三日浸して晒干して末にし、二錢づつを烏梅一箇の煎湯で服す。(靈苑方)

【骨蒸鬼氣】童尿五大斗

を澄清し、八九月に子を帶びた最も適當の時に採つた青蒿五斗を細かに剉んで和

し、大釜に入れて猛火で三大斗に煎じて滓を去り、釜を一旦洗ひ淨めて再び微火で二

大斗ほどに煎じ、豬膽一箇を入れて共に一大斗に煎じ、火を去り冷えるを待つて甕

器に盛り、服用せんとする時は、甘草二三兩を炙熟して末にし、それと煎じ和して

千杵搗いて丸にし、空腹にして二十丸を粥飲で服し、漸次に三十丸まで増加して止

める。(崔元亮海上方)

【骨蒸煩熱】青蒿一握、豬膽汁一箇、杏仁四十箇の皮尖を去つて

炒り、童尿一大盞で五分に煎じて空心に溫服する。(十便良方)

【虛勞盜汗】煩熱して

口乾くには、青蒿一斤の汁を取つて熬膏し、人參末、麥門冬末各一兩を入れて丸に

し得るまでに熬り、梧子大の丸にして毎食後に二十丸を米飲で服す。これを青蒿煎

（二日）發物詳ナラズ、
刺撃性ノ物ヲ指ス
カ。

と名ける。（聖方綱錄）【瘡疾寒熱】肘後方では、青蒿一握、水二升の搗汁を服す。○

存仁方では、五月五日未明に採つて陰乾した青蒿四兩、桂心一兩を末にし、發作せぬ前に酒で二錢を服す。○經驗方では、端午の日に採つて陰乾した青蒿葉、桂心等

分を末にし、一錢づつを、先づ寒するには熱湯で、先づ熱するには冷酒で、發作する日の五更に服す。絶對に（二日）發物を忌む。【痰の甚しき溫瘧】熱するのみで寒せぬ

には、青蒿二兩を童尿に浸して焙じ、黃丹半兩と末にして二錢づつを白湯で調へて服す。（仁存方）【赤、白下痢】五月五日に採つた青蒿と艾葉等分を豆豉と共に搗き、

餅にして日光で乾したものを蒿豉丹と名ける。これを一餅づつ水一盞半で煎じて服す。（聖濟總錄）【鼻中衄血】青蒿の搗汁を服し、并に鼻中を塞ぐが極めて效驗がある。

（衛生易簡方）【酒痔の便血】青蒿を用ゐ、葉を用ゐるときは莖を用ゐず、莖を用ゐるときは葉を用ゐずに末にし、排便前には冷水で、排便後には酒水で調へて服す。（永類鉤方）【金瘡、撲損】肘後方では、青蒿を搗いて患部を封ずれば血が止つて癒える。

○ある方では、青蒿、麻葉、石灰等分を五月五日に搗き和して晒し乾し、使用の際に末にして搽る。【牙齒腫痛】青蒿一握を水で煎じて漱ぐ。（濟急方）【毒蜂の螫傷】青

蒿を嚼んで封ずれば安全である。(肘後方) 【耳に濃汁の出るもの】青蒿末を綿で裹んで耳中に納れる。(聖惠方) 【鼻中の息肉】青蒿灰、石灰等分の淋汁を熬膏して點ける。(聖濟總錄)

子 氣 味

【甘し、冷にして毒なし】

主 治

【目を明にし、胃を開くには、

炒つて用ゐる。勞瘦を治し、身體を壯健にするには、尿に浸して用ゐる。惡瘡、疥

癬、風癢を治するには、水で煎じて洗ふ。(大明)

【鬼氣を治するには、末にして

酒で方寸匕を服す】(孟詵) 【功力は葉に同じ】(時珍)

附 方

新一。

【結熱の眼澀】三月三日、或は五月五日に青蒿の花、或は子を採

つて陰乾して末にし、二錢づつを空心に井華水で服す。久しく服すれば、目を明か

にし、夜間讀書に堪へる。これを青金散と名ける。(十便良方)

節間の蟲 蟲部を見よ。

黃 花 蒿 (綱 目)

和名 くそにんじん
學名 *Artemisia annua*, L.
科名 きく科(菊科)

(五)大觀ニハ瘡ノ下ニ設蟲ノ二字アリ。

釋名 臭蒿

集解

大明曰く、臭蒿しゅうかう、一名草蒿といふ。時珍曰く、香蒿、臭蒿共に通じて



〔蒿〕 花 黄

草蒿と名けて差支ないわけだ。この蒿は青蒿とよく似てゐるが、この蒿は色が緑色で淡黄色を帯び、辛く臭く、食ふわけに行かぬ。民家で採つて醬黄しやうわうや酒麴しゆきくの蔽おほひにするものがこれである。

葉

氣味

【辛く苦し、涼にして毒なし】

主治

【小兒の風寒、驚熱】(時珍)

子

氣味

【辛し、涼にして毒なし】

主治

【勞を治し、氣を下し、胃を

開き、盜汗、及び邪氣、鬼毒を止める】(大明)

(一) 白蒿 (本經上品)

和名無し

學名 *Artemisia Stroversiana*, Willd.
科名 きく科(菊科)

釋名

藝(爾雅)

由胡(爾雅)

葦蒿(食療)

蒿

音は商(シャウ)である。時

(一) 牧野云フ、今アレツトシユナイデル氏ニ據ツテ姑ク下ノ學名ニ本品ニ加ヘテ置ク、同氏ノ記スル所ニ據レバ支那北京

(二) 木村(康)曰ク、成分ハ精油〇・三%サントニンハ含まズ。文獻

C. M. P. 37 (1923)

150—

W. P. 779.

藥誌四二〇(一一九)

同 四二四(四八九)

同 四三九(六六五)

同 四六四(八三七)

ノ山地ニテ其處ノ土人ハ此學名ノモノヲ白蒿ト稱シテ居ルトノ事デアアル、我邦ノ學者ハ之レヲしろもぎ(A. Mellesiana)ニ充テ居レドモソレハ誤リデアアル、又是レハおほもぎデモナイ。

(一〇) 爾雅ニ類ニ作ル。

(一一) 中山ハ石部石灰ノ註ヲ見ヨ。

(一二) 大觀ニ嵯上ニ紫ノ字アリ。

(一三) 錯、大觀ニ粗ニ作ル。

珍曰く、白蒿には水、陸の二種あつて、爾雅には通じて繁ふんといふ。繁殖ふんし蔓まん衍えんし易いものだからである。『繁は藨蒿せうこうなり』とあるは今の陸に生ずる艾蒿あいかうのことで、辛くむれ臭くして香氣が美くない。『繁は山胡さんこなり』とあるは今の水に生ずる蕒蒿ろうかうのことで、辛く美き香氣がある。『繁の醜はづは秋に蒿となる』とあるは水陸二種に共通の言葉である。かやうに言つたわけは、この物は春期にはそれぞれ各種の名稱があるが、秋になつて老いれば一様に蒿と呼ぶからである。藨らうといひ、蕭せうといひ、萩せいといふも皆老蒿に共通の名稱で、秋氣の肅賴さうらいの氣を形容したものだ。

集 解

別錄〇に曰く、白蒿は中山ちうざんの川澤に生ずる。二月に採收する。弘景曰く、蒿は種類の甚だ多いものだが、俗間で白蒿といふものを聞いたことがない。方藥家でも用ゐない。また一向に識しるものもない。


恭曰く、爾雅にいふ藨蒿せうこう、即ち白蒿で、所在にある。葉は頗る細支さいしに似て表面に白毛があり、錯さく澀じふして青蒿あよりも粗い。生えた當初から秋に至るまでやはり他の蒿よりは白いものである。

禹錫曰く、蓬蒿は蔬菜として食へるものだ。故に詩箋に『豆を以て藥俎はんそを薦すすむ』

(六)大觀ニ幡下ニ蒿ノ字アリ。

(七)牧野云フ、蕒蒿ハ我邦ノ學者ハ之ヲオホよもぎニ充テ居ル、此品ニハいぶきよもぎ、ゆまよもぎ、うらじろよもぎ等ノ別名ガアル、やまよもぎハ此レト同種デアルト考ヘル。

とあり、陸機の詩疏に『凡そ艾の白色なるものを(六)幡といふ』とある。現に白蒿は多くの諸草に先んじて發生して、香が美く、食料となるものだ。生でも蒸してもよし。頌曰く、この草は古には菹にしたものだが、今は蕒蒿は食ふがこれは食はない。



〔蒿 白〕

或は白蒿、即ち蕒蒿ではないかと疑ふものがあるが、孟詵の食療本草には、また別に蕒蒿の一箇條を掲げてあつて、その所説の同じからぬところを見ると、明かに二種別箇のものである。そこで古と今とでは食品そのものに相異のあつたことが判る。又、現に階州では白蒿を茵陳といふ。茵、葉はやはり似てゐるが、薬に入れては恐らく用ゐられぬものだらう。

時珍曰く、白蒿は處處にあつて、水、陸の二種類ある。本草に用うべしとして掲げたのは蓋し水に生ずものだ。故に中山の川澤に生ずるとあつて、山谷、平地とはいつてない。二種共に形状は相似てゐるが、ただ陸に生ずるものは辛く、むれ、臭く、水

（ひ）嘉蔬ハ長キ野菜
ノ意。

に生ずるものの香美なるには及ばない。詩に『呦呦たる鹿鳴、野の苹を食ふ』とある。苹とは即ち陸に生ずる藜蒿のことだ。鹿といふ動物は九種の解毒の草を食ふもので、この白蒿もその一なのである。詩に『于に藜を采る、沼に汙に』とあり、左傳に『薪藜、蘊藻の菜、以て鬼神に薦め王公に羞む可し』とあるは、いづれも水生の白蒿を指したものである。これ等の根據から言へば、本草の白蒿は萋蒿なること疑ないのである。鄭樵の通志に、苹を萋蒿なりといふは誤だ。鹿は山獸である、萋は水蒿ではないか。陸機の詩の疏に、苹を牛尾蒿としたのも誤りだ。牛尾蒿は色が青い、白いものではない。細葉で直上に伸び、形狀が牛尾のやうなものである。萋蒿なるものは川の堤や澤の中に生ずるもので、二月苗が芽生え、葉は艾の嫩葉に似て岐が細く、表面が青く裏面は白い。莖は或は赤く、或は曰く、根は白くして脆いものだ。その根、莖を採つて、生または熟し、または菹にし、曝して、いづれも食物になる。蓋し嘉蔬なるものだ。景差の大招には『吳の酸萋蒿は沾薄ならず』とあつて、吳の地方では巧みに萋蒿を淪で酸く調理して齋菜にするが、その味が沾（味重きない）ならず、薄味淡きないならずして甘美なものだ。それ

を謂つたものである。これは正に水生のものを指す。

苗根 氣味

【甘し、平にして毒なし】思選曰く、辛し、平なり。時珍曰

く、瘡疥を發す。

主治

【五臟の邪氣、風寒濕痺。中を補ひ、氣を益し、毛髮を長く黒くし、

(上) 心懸ハ懸痛ノ略
イタムコト。

心懸じんけんして食少く、常に饑ゆるものを療ず。久しく服すれば身體を輕くし、耳目を聰

明にし、老衰せぬ】〔本經〕【生で揉み醋に漬けて菹にして食へば、甚だ健康に益があ

る。擣汁を服すれば、熱黃、及び心痛を去る。曝さららして末にし、米飲で空心に一匙を

服すれば、夏季の暴水痢を治す。燒灰の淋汁を煎じたものは淋瀝疾を治す】〔孟詵〕【膈

を利し、胃を開き、河豚魚の毒を殺す】〔時珍〕

發明

弘景曰く、服食家の七禽散に『白兔が白蒿を食へば仙となる』とある

は、菴藷と同一用法だ。時珍曰く、本經には白蒿を上品に列し、功あつて毒なしと

してあるが、古今の方家がこれを用ゐることを知らない。服食する方法秘訣を得な

かつたためではあるまいか。

附方

舊一：『惡瘡、癰疾ようぢき】但しこれは惡疾で、全身、面部に瘡あるものだ。

（二〇）金陵本東ニ作ル。

（一）牧野云フ、本品ノ角蒿ハ下條ノ馬先蒿ト同一品デアルト云フ、サウスルト名稱ヲ異ニシテ重出シテ居ルト云フ事ニナル。

（二）大觀ニ白ノ上ニ葉字アリ。

（三）大觀ニ青チ實ニ作ル。

（四）欒字大觀ニ據ル

いづれも服するがよし。白艾蒿（二〇）東で一升ほどの煮汁を取り、麴、及び米を用ゐて酒を醸すと同一方法で醸し、熟するを待つて少しづつ服す。（梅師方）

子 氣 味 （ 缺 ） 主 治 【 鬼氣には末にし酒で服するが良し】（孟詵）

（一）角 蒿 （唐本草）

和 名 はなま
學 名 *Incarrilla sinensis, Lam.*
科 名 のうせんかづら科（紫葳科）

集 解

恭曰く、角蒿は（二〇）白蒿に似たもので、花は瞿麥のやうで紅赤の愛すべきものだ。子は王不留行に似て色が黒く、さやになる。七月、八月に採收する。保昇曰く、葉は蛇牀、青蒿に、子角は蔓菁に似て（三）青黒色で細く、秋熟する。所在いづれにもある。宗奭曰く、莖、葉は青蒿のやうで、約三四分徑の淡紅紫色の花を開き、花が終つてから長さ二寸ばかりの微し（四）彎曲した角を結ぶ。穀曰く、凡そこれを用ゐるには、紅蒿、并に邪蒿を用ゐてはならぬ。この二味は眞に角蒿に似たものだが、ただこのものは香しく、角が短い。角蒿は、採取すると槐砧（くわいじん）上で細かに剉んで用ゐる。

氣味

【辛く苦し、小毒あり】

主治

【乾濕癩、諸惡瘡の蟲あるもの】（唐

本）【口齒の瘡を治するに絶勝のものだ】（宗輿）

附方

舊二、新一。

【齒齲^{しづ}宜露^{せんろ}】

多くは瘡が原因のものだ。角蒿を灰に焼いて

夜間上に塗る。絶對に油膩^{ゆじ}のも

の、沙糖、乾棗^{かんざう}を食ふことを忌

む。（外臺秘要）【口瘡の瘡えぬも

の】胸中に入るものだ。いづれ

もこれが生じたときは、大人、

小兒に拘はらず、角蒿の灰を取



〔蒿 角〕

つて塗る。やがて出る汁を吐き出せば一夜にして效がある。（千金方）【月蝕耳瘡】蒿灰を摻るが良し。（集簡方）

（二）藨蒿（拾遺）

和名未詳
學名未詳
科名きく科（菊科）？

（一）牧野云フ、我邦ノ學者ハ之レヲきツレバミニ充テ居レドモ申ラヌ、きツレ

（五）宜露ハ齒縫出血。

あざみニハ野苧麻ノ漢名ガアルガ此名ハ本書ニハ見エテ居ナイ。

釋名


蕺蒿（爾雅） 蕺蒿（同上） 抱娘蒿

時珍曰く、陸農師は『（りん）蘼（み）なる語の

意味は高いといふことで、我（が）はやはり我（が）（タカクソビユ）の意味だ』といふ。我とは科の高いことだ。この物は蘼（み）を覆（おほ）ふ養蠶具（ようさぐ）に作り得るものだから蘿蒿（らかう）と謂ひ、根が叢生するものだから抱娘（はうにやう）といふ。

集解

時珍曰く、蘿蒿は高い岡に生ずる。小薊（せうけい）に似たもので、多くの草に先つて舊根から生ずる。爾雅に『我（わ）は蘿のこ



〔蕺〕 〔蒿〕
—— 抱娘蒿 ——

とだ』とあり、詩の小雅に『菁菁（せいせい）たるものは我』とあり、陸機の注に『即ち我蒿のことだ。』水澤の地、下濕の地に生ずるもので、葉は斜蒿に似て細く科（し）生ずる。二月（し）生の莖、葉が食へる。また蒸してもよく、香美なものだ』とある。頗

る蕺蒿（しやうかう）に似てゐるが、ただ味に（し）麻（ま）を帯び、蕺蒿ほどの甘、香がない。

（一）大觀ニハ澤田トアリ。
（二）大觀及本書ニ科ノ下ニ生ノ字アリ。
（三）大觀ニハ生莖葉ヲ中莖ノ二字ニ作ル。

（四）麻ハ麻痺スルコト。

(一)牧野云フ、馬先蒿ヲしほがまぎくニ充テシ從來ノ説ハ非ナルモノデアツタ、馬先蒿ノ屬ノモノハ一モ我邦ニハ産セヌ。
(二)大觀ニ矢ヲ屎ニ作ル。

(三)南陽ハ北ノ註ヲ見ヨ。

(二)馬先蒿 (本經中品)

和名 はなごま
學名 *Incarrilla sinensis, Tuna.*
科名 のうぜんかつら科(紫葳科)

釋名

馬新蒿 唐本) 馬(二)矢蒿 本經) 練石草(別錄) 爛石草(同上) 虎麻

時珍曰く、この蒿は臭氣が馬矢(矢は屎に同じ)のやうだから命けたもので、馬先とは馬矢の書き誤りだ。馬新はまた馬先の音の誤りである。弘景曰く、練石草、一名爛石草、即ち馬矢蒿のことだ。今は方藥には一向用ゐない。

集解

別錄に曰く、馬先蒿、練石草はいづれも(三)南陽の川澤に生ずる。

恭曰く、葉は大きくして莖蔚の



〔馬 先 蒿〕

やう、花は紅白色だ。二月、八月に莖、葉を採つて陰乾して用ゐる。八月、九月に實が熟する。俗に虎麻といふものがそれだ。一名馬新蒿といひ、所在にある。莖蔚は苗が短小で

子が夏季中に熟する。初生時にはこの蒿と二物極めてよく似てゐる。

禹錫曰く、按ずるに、爾雅に『蒿は牡蒿なり』とあり、注に『即ち蒿の子無きもの』とある。詩には『我に匪ずんば伊れ蒿なり』とあり、陸機は『即ち牡蒿だ』といふ。二月始めに生じ、七月花を開く。花は胡麻の花に似て紫だ。また八月に小豆に似た角を生ずるが、その角は鋭くして長い。一名馬新蒿といふものはこれである。頌曰く、郭璞は、牡蒿を『子無し』といひ、陸機は『子有り』といひ、二説に少異があるが、今は子有るものを用ゐるが正しいとなつてゐる。

時珍曰く、別錄には、牡蒿と馬先蒿とを元來二箇條に別けてある。陸機の所謂子有るものは馬先蒿だ。それに子の無い牡蒿を引用して解釋したのは誤だ。牡蒿の詳細はその本條を見よ。

氣味 【苦し、平にして毒なし】 別錄に曰く、練石草は寒なり。

主治

【寒熱鬼疰、中風濕痺、婦人帶下の病で子無きもの】 本經 【練石草は、五癰を治し、石淋、膀胱中の結氣を破り、水道、小便を利す】 別錄 【惡瘡】 弘景

附方

舊一。

【大風癩疾】 骨肉疽敗し、眉鬚墮落し、身體疼痛するには、馬

(一)牧野云フ、陰地
 厥ハ醫學正傳デハ陰
 地ト書カレテアル
 學者ハ之ヲ從來我邦
 のはなわらびニ充テテ
 居ルガ、私モ此レハ
 正ジイト思フカラ此
 ニ舊ニヨツテサウシ
 テ置ク、本書ノ圖并
 ニ植物名實圖考ノ圖
 ハ其文章ニ基ヅキ想
 像ヲ描イタモノト思
 フノデ、ソレニ信テ
 措ク事ハ出来ヌ感ガ
 アル。

(二)鄧州ハ菊ノ註チ
 見ヨ。

(三)順陽縣ノ内郷即
 チ今ノ河南省内郷縣
 ノ地ナリ。

(四)外家詳ナラズ外
 科云云ノカ、金陵本
 ニモ外家トアリ。或
 ハ外丹家ノ略カ。

(五)木村康曰ク、民
 間薑ヲ煎ジテ冷嗽ノ
 痛及ビ下痢止トス。

高麗 薑 二四

先蒿、一名馬矢蒿、一名爛石草を炒り搗いて末にし、方寸匕づつを食前に溫酒で服す。一日三服して一年繼續すれば都て瘥える。(肘後方)

(二)陰地厥 (宋圖經)

和名 ふゆのはなわらび
 學名 *Isotria medeoloides*, Sw.
 科名 はなやすり科(瓶爾小草科)

集解

頌曰く、(一)鄧州(二)順陽縣の内郷の山谷に生ずる。葉は青蒿に似て莖は



〔陰地厥〕

青紫色、花は微黄色の小さい穂になる。根は細辛に似たものだ。七月根を採つて用ゐる。時珍曰く、江、浙地方にもある。(外家ではこれを探つて丹砂、硫黄を制するに用ゐる。

根苗氣味

〔甘く苦し、微寒にして毒なし〕

主治 〔腫毒、風熱〕(蘇頌)

附方

新一。

〔男女の吐血〕吐血後に胸膈の虛熱するには、陰地厥、紫荷車、

貫衆、甘草各半兩を、三錢づつ水で煎じて服す。(聖濟總錄)

牡蒿 (別錄下品)

和名 なつふもぎ
學名 *Artemisia japonica*, Thunb.
科名 きく科(菊科)

釋名

齊頭蒿

時珍曰く、

爾雅に『蔚は牡蒿なり。蒿の子無きもの』とあり、

牡の名稱はそれから出てゐる。諸種の蒿は葉がいづれも尖つてゐるが、この蒿の葉

は獨り廣く開いて禿してゐる、故に齊頭なる名稱を呼ばれたのだ。

集解

別錄に曰く、牡蒿は田野に生ずる。五月、八月に採收する。弘景曰く、

方藥には一向用ゐない。恭曰く、齊頭蒿である。所在にあるもので、葉は防風に似

て細く薄くして光澤がない。



〔蒿 牡〕
——蒿 頭 齊——

時珍曰く、齊頭蒿は三四月苗が生え、

葉は扁で本が狭く末が廣く開き、禿岐がある。嫩葉のうちは食へるものだ。鹿の

食ふ九草の内の一である。秋細かな黃花を開き、大さ車前の實ほどの實を結ぶ。その實の内にある子は肉眼で見えぬほどの微細なものだ。そのために、世人は子が無

いものと思つてゐる。

苗 氣味

【苦く微し甘し、温にして毒なし】

主治

【肌膚を充實し、氣

を益し、暴かに肥らせる。血脈を滿盛せしめるものだから久く服してはならぬ】（別

録）【水に搗つて服すれば陰腫を治す】（時珍）

附 方

新二。

【瘡疾寒熱】齊頭蒿根、

滴滴金根各一把を生で酒一鍾に搗つて

發作前に服し、渣を男は左、女は右の（三）寸口に傅ければ二日にして止まる。（海上名方）

（一）滴滴金ハ旋覆花ノ一名。
（二）寸口ハ腕頭ノ脈穴ノ名。

（二）九牛草（宋圖經）

和名 ひとつばふもぎ
學名 *Artemisia integrifolia*, L.
科名 きく科（菊科）



九牛草

集 解

頌曰く、（三）鈞州の山

岡上に生ずる。二月苗が生え、獨

牛 莖で高さ二尺ほどあり、葉は艾葉

に似て圓く長く、背面に白毛があ

り、表面は青い。五月苗を採つて

（一）牧野云フ、種種ナル點カラ考ヘテ私ハ今此九牛草チ下ノヤウニ斷定シタ。
（二）鈞州ハ山草類仙茅ノ註チ見ヨ。

用ゐる。時珍曰く、陳嘉謨の本草蒙筌に、この草を蕪艾きがいといつてあるは誤だ。

苗 氣味

【微し苦し、小毒あり】

主治

【風勞を解し、身體の痛を治す。

甘草と共に煎じて服す。その他の多くの薬に入れては用ゐない】蘇頌

芫 蔚 (本經上品)

和名 めはじき、又、やくもさう
學名 Leonurus sibiricus, L.
科名 唇形科(唇形科)

釋名

益母(本經)

益明(本經)

貞蔚(別錄)

蕪(爾雅)

音は推 スキ)であ

る。野天麻(會編)

豬麻(綱目)

火杖(本經)

鬱臭草(圖經)

苦低草(圖經)

夏枯

草 外臺

土質汗(綱目)

時珍曰く、この草、及び子は、いづれも充盛、密蔚みつゐなるも

のだ。故に芫蔚と名ける。その功力が婦人に適し、目を明にし、精を益するところか

ら益母なる名稱があり、その莖が四角で麻に類するところから野天麻と謂ふ。俗に

豬麻と呼ぶは、猪が喜んで食ふからである。夏至の後に枯れるところから、また夏

枯草なる名稱がある。近效方にはこれを土質汗といひ、林億は『質汗なるものは西

方の番夷地方に産し、熱血を諸薬に合せて煎じて作つたもので、金瘡、折傷を治す。

(一)本經及大觀共ニ
大札ニ作ル。

(二) 大觀ニ思テ思ニ
作ルニ據ル。

益母も煎にして折傷の治療に用ゐ得るところから、土質汗と稱へるのだ』といふ。

禹錫曰く、爾雅に『萑すんは萑すんなり』とあり、その注に『今の茺蔚のこと、又、益母と名ける』といひ、劉歆は『萑は臭穢しゅうたいだ。臭穢、即ち茺蔚だ』といひ、陸機は『萑は益母である。故に曾子はこれを見て(三)恩を感じたのだ』といつてある。

集解

別錄に曰く、茺蔚じゅうゐは海濱、池澤に生ずる。五月採收する。弘景曰く、現に處處にあるもので、葉は萑じんのやう、莖は四角である。子の形は細く長くして三稜がある。方に用ゐることはやはり稀だ。



〔母 益 蔚 茺〕

頤曰く、現に園圃や田野に極めて多い。郭璞の爾雅注には『葉は萑に似て莖は四角、華は白くして節の間に生じ、節毎に雞冠子に似

て色の黒い實が成る。莖は四角稜になつてゐる。五月採收するものだ』といひ、又、『九月實を採る』といふが、醫方には實を用ゐることは稀だ

宗奭（しゅう）曰く、茺蔚（しゅうふ）の初春に生えた嫩芽は、やはり採つて浸し洗つて苦味を淘り去り、水煮し菜にして食へる。冬を凌いで凋悴せぬものだ。

時珍（し）曰く、茺蔚は水に近い湿地に甚だ繁茂するもので、春初に蒿の嫩葉のやうな苗が生え、夏に入つて長さ三四尺になる。莖は四角で黄麻の莖のやう、葉は艾葉のやうで背面が青く、一梗三葉で葉に尖岐がある。一寸ほどづつに節があつて、節毎に穗が簇生（さうせい）して莖を抱く。四五月の頃に穗の内に小さい花を開き、その花には紅紫のものと微白色のものとあつて、夢毎に内に四粒の細子があり、一粒の大きさは同蒿の子ほどのもので、三稜のある褐色のものだ。藥肆では往往これを巨勝子（きょしょうし）と稱して賣つてゐる。この草は生えた時は臭氣があり、夏至（げし）の後に枯れる。その根は白色だ。蘇頌の圖經に『その葉は荏に似て、子は雞冠子に似て色黒く、九月實を採る』といひ、寇宗奭の衍義に、これを『冬を凌いで凋（し）まぬ』といふはいづれも誤傳である。この草には白花、紫花の二種ありて、莖、葉、子、穗皆一樣だが、ただ白花のものは氣分に入り、紅花のものは血分に入るもので、區別して用ゐるがよいのである。按ずるに、閨閣事宜（けいかくじぎ）に『白花のものを益母といひ、紫花のものを野天麻といふ』とあり、

返魂丹の註には『紫花のものが益母だ。白花のものは違ふ』とある。陳藏器の本草には『茺蔚は田野の間に生え、一般に臭草と呼んでゐる。天麻は平澤に生え、馬鞭草に似て節毎に紫花を生じ、花の中に青葙子のやうな子がある』とあり、孫思邈の千金方には『天麻草は莖が火麻のやうだ。冬苗が生え、夏鼠尾花のやうな赤花を著ける』とある。これ等はいづれも茺蔚と天麻とを別種の二物としたらしいが、蓋しこの物は一物の二種なることを知らぬのだ。凡そ植物の花にはいづれも赤と白とがある。牡丹や芍薬や菊花の類のやうなものだ。又按ずるに、郭璞の爾雅注には『蕕、音は椎。即ち茺蔚、又、益母と名けるものだ。葉は荏に似て華が白く、その華は節の間に生える』とあり、又『蕕、音は推。莖が四角で葉が長く鋭く、穂があつてその穂の間に紫、縹色の花がある。これは飲に作り得るもので、江東では牛蒡と呼ぶ』とある。これに據つて見れば、蕕、蕕なる名稱は元來同じもので、ただ花の色で區別したものだ。その物の一物なることに疑ない。宋代の重修本草には、天麻草として誤註してゐるが、天麻とは謬も尤も甚しい。陳藏器の本草には又、蠶菜なるものを掲げて『江南の陰地に生ずる。益母に似て莖が四角、節に對して白花がある。産

後の血病の主薬だ』とあるが、これは茺蔚の白花のもののことだ。故にその功用の主として血病に在ることも同一なのだ。

子修治

時珍曰く、凡そこれを用ゐるには、微し香しく炒り、また或は蒸熟することもある。烈日で曝燥して舂き篩ひ、殻を去り仁を取つて用ゐる。

氣味

辛く甘し、微温にして毒なし』別錄に曰く、甘し、微寒なり。時珍曰く、甘く辛し、温なり。灰は硫黄を制す。

主治

【目を明にし、精を益し、水氣を除く。久しく服すれば身體を軽くする】〔本經〕【血逆、大熱、頭痛、心煩を療ず】〔別錄〕【産後の血脈】〔大明〕【仁を舂いて生で食へば、中を補し、氣を益し、血脈を通じ、精髓を充填し、渴を止め、肺を潤ほす】〔吳瑞〕【風を治し、熱を解し、氣を順にし、血を活かし、肝を養ひ、心を益し、魂を安んじ、魄を定め、婦人の經脈、崩中、帶下、産後、産前の諸病を調へる。久しく服すれば子を儲けしめる】〔時珍〕

發明

震亨曰く、茺蔚子は、血を活かし、氣を行らし、陰を補するの功がある。故に益母と名けるのだ。凡そ産前、産後の全體を支配するものは血氣であつて、

(三) 木材(康)曰ク、
葉ハレサスリント云
フ結晶性物質、脂肪
油、惡臭アル腦分、
樹脂等ヲ含有ス。
久保田晴光、中島晴
吉「醫海時報」一七七
一(昭三)二。
Pöckel-Ber. Pharm.
Gesell. 14(1904) 372.
W. P. 654.

産前に用ゐれば滯なく、産後に用ゐれば虚なく、行中に補するところのあるものである。

時珍曰く、茺蔚子は、味甘く微し辛し、氣は温である。陰中の陽、手、足の厥陰の經の藥であつて、白花のものは氣分に入り、紫花のものは血分に入り、婦人の經脈不調、妊娠、出産一切の血氣の諸病を治する妙品である。然るに醫方でそれを心得て用ゐるものは鮮いが、時珍は常にこれを四物、香附の諸藥と共に用ゐて一般の患者の治療に甚だ多く効果を擧げてゐる。蓋し包絡は血を生じ、肝は血を貯藏するものであつて、この物はこれに對して血を活し、陰を補する作用のあるものだから、能く目を明かにし、精を益し、經を調へ、婦人の諸病を治するのである。李東垣氏は『瞳子散大したものには茺蔚子の使用を禁ずる。その辛、温の氣味は散を主とし、能く火を助けるものだ。當歸も辛、温ではあるが、苦、甘を兼ねるので、能く血を和する作用があるからこれは禁ぜぬのだ』といつてあるが、予の考では、目は血を得て能く物を視るもので、茺蔚は血を行ることが甚だ捷かなものだ。瞳子散大は血の不足だから、これを禁ずるは火を助けるからではないと思ふ。血滯で目を病む

(一) 此條解説ノ義理
稍通解シガキモノ
アリ。

ものに宜いものだから『目を明かにする』といつてあるのだ。

莖

大明曰く、苗、葉、根も同功である。

氣味

藏器曰く、寒なり。時珍曰

く、莖、葉は味辛く微し苦し、花は味微し苦く甘し、根は味甘し。いづれも毒なし。

(五) 鏡ハ鑑ノ誤。

鏡源に曰く、硫黃、雌黃、砒石を制す。

主治

【癰瘡】浴湯にして用ゐるが

(六) 丹遊ハ丹毒。

【擣汁を服すれば浮腫に主效があり、水を下し、惡毒丁腫、乳癰、丹遊等の毒を消す。いづれも傳ける。又、汁を服すれば胎兒の腹中で死亡したもの、及

び産後の血脹悶に主效がある。汁を耳に滴入すれば聾耳に主效がある。擣いて蛇虺

(七) 面藥ハ化粧藥。

の毒に傳ける】(蘇恭) 【七面藥に入れば顔を光澤にし、粉刺を治す】(藏器) 【血を活

し、血を破り、經を調へ、毒を解し、(八) 胎漏、產難、胎衣不下、血運、血風、血痛、

(八) 胎漏妊娠中ノ出血。

崩中漏下、尿血、瀉血、疳痢、痔疾、打撲内損の瘀血、大小便の不通を治す】(時珍)

發明

時珍曰く、益母草は、根、莖、花、葉、實、いづれも藥に入れて同様に

用ゐ得るものだが、手、足の厥陰の血分の風熱を治し、目を明かにし、精を益し、

婦人の經脈を調へる場合には、茺蔚子を單用するが良く、腫毒、瘡瘍を治し、水を消

し、血を行らし、婦人の産前の諸病を治する場合には、竝用するが良い。蓋しその

（之）吉安ハ今ノ江西省吉安縣、即チ舊廬陵縣ノ地ナリ。

根、莖、花、葉は行らすことが専らであり、子は行中に補の効果があるからだ。

附 方

舊十四、新七。

【濟陰返魂丹】さいいんほんつたし 咎殷の產實に次の如く記載してある。『こ

の方はは、吉安吉安の文江高師禹が禮を厚くして名醫に求め得たもので、その妙效は神の如く、甚だ多くの人命を活かしたものだ。能く婦人の産前、産後の諸疾しよしやくの病證を治す。野天麻、又、益母と名け、又、火杖と名け、又、負擔ふたんと名ける。即ち茺蔚子を用ゐる。葉は艾葉に似て、莖は火麻に類し、梗は四角で面が凹くぼんだものだ。

四、五、六月に節毎わうぐいに蓼花れうかうのやうな紅紫色の花を開く。南方、北方到る處にあるものだが、白花のものは違ふ。端午の日、小暑の日、或は六月六日、花の正に開いた時、根のまま採收して陰乾し、葉、及び莖、子を用ゐる。鐵器を忌むものだから石器で碾すつて細末にし、煉蜜で彈子大の丸にし、病證に随つて嚼んで服し、湯を使として用ゐ、その根を焼いて性を存し、末にして酒で服す。功效は黑神散と上、下がない。その藥は丸數に一定の限度がなく、病の癒るを度とする。或は梧子大の丸にして五七十丸づつを服し、又は搗いて濾しもろ淨めた汁を熬膏して服す。○産前の臍腹痛で或は音おとするには米飲で服す。○産前、産後の臍腹刺痛、胎動不安、下血止

二〇五心ハ手足ノ心
及頂心ヲ指スガ如
シ。

まぬものは當歸湯で服す。○産後に童尿に一丸を溶かして服すれば、能く魂を安んじ、魄を定め、血氣が自然に順調になり、諸病が起らぬ。又、よく血痛を破り、脈息を養ひ、經絡を調へる。いづれも溫酒で服す。○胎衣不下、及び横産で順ならざるもの、死胎が下らずして日を経て脹滿し、心悶、心痛するには、いづれも炒鹽湯を用ゐて服す。○産後の血運で、眼暗く、血熱し、口渴し、煩悶し、鬼神を見るかの如く狂言し、人事不省なるには、童尿を和した酒に化して服す。○産後血塊を結成して臍腹奔痛し、時に寒熱を發して冷汗を出し、或は顔が垢黑ずんで赤く、二五心煩熱するには童尿酒で服し、或は薄荷の自然汁で服す。○産後に惡露が盡きず、結滯して刺痛し心胸に上衝して滿悶するには童尿酒で服す。○産後血水を瀉するには棗湯で服す。○産後の痢疾には米湯で服す。○産後の血崩、漏下には糯米湯で服す。○産後の赤、白帶下には煎膠艾湯で服す。○月經不順には溫酒で服す。○産後の中風で牙關緊急し、半身不遂となり、失音、失語するには童尿酒で服す。○産後に氣喘、欬嗽、胸膈不利で、惡心し、酸水を吐き、顔面が浮腫し、兩脇が疼痛し、舉動自由ならぬには溫酒で服す。○産後一箇月以内の欬嗽で自汗、發熱するは、久

（二）兩太陽穴へ目尻
ノ處。

しきに互れば變じて骨蒸となる。これには童尿酒で服す。○産後に鼻衄し、舌黒く、口乾くには童尿酒で服す。○産後に（二）兩太陽穴が痛み、呵欠し、心忪し、氣短く、羸瘦し、飲食欲なきもの、血風で身熱し、手、足が頑麻し、あらゆる節節が疼痛するには、いづれも米飲に溶して服す。○産後の大、小便不通で煩躁し、口苦きには薄荷湯で服す。○婦人の久しく子なきには溫酒で服す。【益母膏】近效方の、産婦の諸疾、及び折傷内損で瘀血があり、曇天の日毎に痛むを治する神方。三月に益母草、一名負擔、一名夏枯草を、根、葉、莖、花のまゝ採つて洗ひ淨め箔上にのして日に曝し乾かし、竹刀で長さ五寸に切る。鐵刀を用ゐてはならぬ。それを大鍋中に入れて水で二三寸深さに浸して煎煮し、草が煮爛れて水が三分の二を減じたとき、草を漉し去つて汁を約五六斗取り、盆に入れて半日澄し、綿で濾して濁滓を去り、その清汁を釜に入れて慢火で一斗に煎じ、稀餲のやうにして瓷瓶に封じて貯藏し、使用の都度、梨子ほどの量を取り出して暖酒に和し、一日二回服す。或は羹粥に和すもよし。遠隔地の旅行には、丸にし得るまでに煉つて携帯する。七日まで服すれば疼は漸次に平復するものだ。産婦の惡露盡きざるもの、及び血運は一二服で癒える。

その藥は忌むもの無し。又、能く風を治し、心力を益す。（外臺秘要） 【婦人の難産】

益母草の搗汁七合を、半減するまでに煎じて頓服すれば立るに止む。新物の無い場合には、乾けるもの一大握を水七合で煎じて服す。（韋宙獨行方） 【腹中の胎兒死亡】益母

草を搗き熟し、暖水少量を和して絞取つた汁を頓服する。（韋宙獨行方） 【後の血運】心

氣絶せんとするには、益母草の研汁一盞を服するが絶妙である。（子母秘錄） 【産後の

血閉】下らぬには、益母草の汁一小盞を酒一合に入れて温服する。（聖惠方） 【帶下赤

白】益母草を開花時に採つて末に搗き、二錢づつを食前に温湯で服す。（集驗方） 【尿

血】益母草の搗汁一升を服すれば立るに瘥える。これは蘇澄の方である。（外臺秘要）

【赤白雜痢】困重するには、益母草を日光で乾し、陳鹽梅を焼いて性を存し、等分

を末にして三錢づつを、白痢には乾薑湯で、赤痢には甘草湯で服す。これを二靈散

と名ける。（衛生家寶方） 【小兒の疳痢】死に垂たるには、益母草の嫩葉を米と共に粥に

煮て十分に食ふ。瘥えるを度とする。甚だ佳いものだ。汁を飲むもよし。（二二）（廣利方）

【痔疾下血】益母草葉の搗汁を飲む。（食醫心鏡） 【一切の癰瘡】婦人の（二二） 妬乳、乳癰、

小兒の頭瘡、及び浸淫黃爛、熱瘡、疥疽、陰蝕には、いづれも天麻草を切つて五升、

（二二）大觀二濟ニ作ル。
（二三）妬乳ハ乳房炎及
乳房腫。

（二）乳ハ乳出ント
欲シテ出デザルヲ云
フ。

水一斗半を一斗に煮取り、分けて數回洗へば痒さを殺す。（千金）【急、慢疔瘡】聖惠方では、益母草を搗いて封じ、また絞汁五合を服すれば消する。○醫方大成では、益母草を四月花共に採つて焼いて性を存し、先づ小尖刀で十字に疔根を開いて血を出し、次に根を透つて開破して血を捻出し、拭き乾してから、稻草心に藥を蘸けて瘡口に入れ、底部に達せしめる。良久して紫血が出るはずだから、そのときはまた捻出して淨め、再び藥を捻り込んで紅血が見えるやうになつて止める。一晝夜に三五回藥を捻り込めば、重きものも二日にして根が爛れ出で、輕きものは一日で出る。瘡が脹起すればそれは根が出るのである。針で取り出して、その後へ藥を傅ければ肌を生じて平易く癒える。風寒、房事、酒、肉、一切の毒物を忌む。【癰毒の已に破れたるもの】益母草を搗いて傅ける。甚だ妙である。（斗門方）【二回 勒乳で成つた癰】益母を末にし、水で調へて乳上に塗れば一夜にして自ら瘡える。生で擣くもよし。（聖惠方）【喉閉腫痛】益母草を擣き爛らし、新汲水一盞で濃汁を絞つて頓服する。直に吐して癒える。冬季には根を用ゐる。（衛生易簡方）【汁の出る疔耳】茺蔚の莖、葉の汁を滴らす。（聖惠方）【粉刺黑斑】閨閣事宜に『五月五日に天麻の紫花のものを根

(二五) 一伏時一晝一夜間。伏火觀ニ復ニ作ル。

(一) 牧野云フ、集解ノ李時珍ノ説ニ從ヘバ之レハ白花ノ益母草(即チめはじきノ

共に採つて晒乾^{しやかん}して灰に焼き、商陸の根を搗いて自然汁に酸醋を和したものでその灰を搜^ませて餅にし、炭火で煨いて半年間貯藏したものを面藥に入れて用ゐる。甚だ能く飢を潤ほす』とある。蘇頌^{そうじゆ}曰く、唐の則天皇后^{すいてんくわうじやう}が益母を鍊つて顔の澤^{つや}を出した法は、五月五日に根と苗と完全なものを採り、土の著かぬやうにして曝乾し、搗き籤^{ふさ}つて麪と水を和し、雞子大の團にして再び曝乾し、そこで四方に孔をあけた一箇の爐を作り、上下に火を置いて中央にその團を置き、大火で一炊の時間程焼いて大火を去り、小火を留めて火の絶えぬやうにして養ひ、(五)一伏時經^たつてから取り出して甕器に入れ、研り篩つて再び三日間研つて取り收める。これを使用するには澡豆^{さうづ}を使用する方法のやうにして日毎に用ゐるのである。ある方では十兩づつに滑石一兩、麝脂^{せんじ}一錢を加へる。【馬咬^{ばかう}の瘡】苦低草を細かに切り、醋に和して炒つて塗る。(孫真人方) 【新生小兒】益母草五兩を水で煎じて浴すれば、瘡疥が生ぜぬ。(簡要濟衆)

璽 菜

音は懸(ザ)ンである。(拾遺)

和名 きせわた
學名 *Lacurnus micranthus*, Maxim.
科名 唇形科(唇形科)

自花品）テアルガ、
支那デモ之レニ反對
シ別ニ一種ノ草デア
ルト主張スル者ガア
ル、然レドモ其形状
ノ詳ナル事ハ不明デ
アル、我邦ノ學者ハ
之レヲきせわたニ充
テテ居ル、然シ其根
據ハ極メテ薄弱デア
レドモ私ハ姑ク此ニ
之レニ從フテ置ク。

集解

藏器曰く、ざしさい 薺菜は江南かうなんの陰地に生ずる。益母に似て莖が四角だ。節に對して白花を開く。時珍曰く、これは益母の白花のもののことであつて、爾雅に所謂すう 薺といふがこの物だ。紫花のものは爾雅の所謂すう 藨である。薺と藨とはいづれも同一音で一物の二種なのだから、この條にもやはり主治は血病にあるとしてあつて、益母の功と同一である。郭璞は獨り白花のものを指して益母とし、咎



〔薺 藨 花 白〕
——薺 藨 花 白——

殷は白花のものは益母でないといつてゐるが、その説はいづれも明確を缺いてゐる。嫩苗なうは食へるものだから菜といふのだ。寇宗奭が『薺藨の嫩苗は煮て食へる』といつてあると合致する。

苗 氣 味

【辛し、平にして毒なし】

主 治

【血を破る。産後の腹痛には

煮汁を服す】（藏器）

薇 衛

薇の音は眉
(ビ)である。

(本經上品)

和名	未詳
學名	未詳
科名	未詳

釋名

藥衛(本經)

鹿衛(唐本)

吳風草(唐本無心(吳普))

無顛(吳普)

承

膏別錄)

承(麋)

吳普)

恭曰く、南方ではこれを吳風草、一名鹿衛といふ。鹿が

疾のときこの草を衛むとやがて瘥える。時珍曰く、蘇恭の説に據れば、薇衛、鹿衛

とあるは麋衛と書くべきことになる。鹿と麋とは一類の動物だ。按ずるに、酈道元

の水經注に『魏興錫山には薇衛草が多く生えてゐる。この草は、風があつても伏

さず、風がなくて獨り自から搖れる』とある。これで見ると、吳風もやはり無風と

書くが正しいであらう。その方が通ずるやうだ。藏器曰く、一名無心草といふが、

それは草に心の無いものといふのではない。方藥に用ゐることは稀れだ。

集解

別錄に曰く、

薇衛は漢中の川澤、及び冤句、邯鄲に生ずる。七月に

莖、葉を採つて陰乾する。

恭曰く、この草は叢生するものだ。茺蔚、及び白頭翁に似て葉に毛があり、莖が

(一) 牧野云フ、從來我邦ノ學者ハ集解ノ文ニ從フテ薇衛ヲ大吳風草、小吳風草ニ分チ甲チちやうりやうさうトシ乙チやぶれがミトシテ居ルガ是レハ中ツテ居ナイト斷ジ私ハ之レニ從ハヌ、ソシテ其薇衛ノ眞物ハ何デアルカ今判然シテ居ナイ。

(二) 饒大觀ニ肌ニ作ル、

(三) 魏興錫山、今ノ陝西省興安府安康縣ハ六朝時代ノ魏興ノ地ナリ。安康ヨリ東、漢水ニ沿ヘル今ノ白河縣ノ地ハ漢ニ錫トイフ。錫山トハ恐ラクソノ地ノ山チイフナルベシ。日本寛文版本草綱目ニ魏ノ興錫山ト讀ミタルハ謬ナラン。

(四) 漢中ハ石部特生

舉石漢中、梁州ノ註
參照。宛句ハ沙參ノ
註ヲ見ヨ。邯鄲ハ土
部白堊ノ註ヲ見ヨ。
(五) 楚ハ石部石炭ノ
註ヲ見ヨ。



〔衛 薇〕

赤い。また大、小の二種あつて、(五) 楚の地方
では、大なるものを大吳風草、小なるもの
を小吳風草といふ。

保昇曰く、葉は茺蔚に似て叢生し、毛が
ある。その花は黄色、その根は赤黒色であ
る。

莖 葉

氣 味

【苦し、平にして毒なし】 別錄に曰く、微寒なり。之才曰く、

秦皮と配合すれば良效がある。

主 治

【風濕痺の歷節痛、驚癇の吐舌、悸氣。賊

風、鼠瘻、癰腫】(本經)

【暴癰に水を逐ひ、癢癢を療ず。久しく服すれば身體を軽く

し、目を明かにする】(別錄)

【婦人が服すれば妊娠を絶つ】(藏器) 【水で煎じて癰疽、

甲疽、惡瘡を洗ふ】(時珍)

外科精義に記載してある。

發 明

時珍曰く、麋衛は素問に用ゐてあるもので、風病、自汗を治する薬で

ある。しかるに後世では用ゐることを知らない。誠に醫方上の缺點といふべきだ。
その素問の文には『黃帝曰く、ある病は身熱し、懈惰し、汗出ること浴せる如く、

(六) 大觀ニ三ナ十二作ル。

惡風少氣する。これは何の病であるか。岐伯曰く、その病は酒風と名ける。これを治するには、澤瀉（たくこや）、朮各（じゆつ）三五分、麋銜五分を以て合せ、三指を以て撮ふ。飯を後にする』とある。飯を後にすとは、先に藥を服することだ。

附方

新三。

【年深き惡瘡】無心草根、釣苓根（うりやうこん）、狼毒（ろうどく）、白丁香各五錢、麝香一

字を末にして摻る。○又ある方では、無心草根、乾薑各二錢、釣苓根三錢を末にして摻る。（いづれも外科精義）【小兒の破傷風】拘急（こうきふ）し、口噤（こうしん）するには、沒心草半兩、白附子（びやくし）を炮（や）いて二錢半を末にし、一字づつを薄荷酒で灌（そそ）ぎ下す。（聖濟錄）

附錄

七 無心草（宋圖經）

頌曰く、（一）秦州（しんしゅう）、及び商州（しょうしゅう）、鳳翔（ほうしやう）に生じ、各縣いづ

(七) 無心草
(和名) 未詳
(學名) 未詳
(科名) 未詳
(八) 秦州、商州ハ石部丹砂ノ註ヲ見ヨ。
(九) 鳳翔ハ石部石蟹ノ註ヲ見ヨ。

れもこれを産する。三月花を開き、五月實を結ぶ。六七月に根、苗を採つて陰乾して用ゐる。性溫にして毒なし。積血（しやくけつ）に主效があり、氣塊を逐ひ、筋節を益し、虛損を補し、顔色を潤ほし、澀洩（せきせう）、腹痛（ふくつう）を療ずる。

時珍曰く、麋銜を一名無心草といふ。此の草の功用と相近い。その圖に描れた形狀もやはり相近い。恐らくは同一物のことであらう。故に此に附記して後の研究に俟つ。鼠耳草にもやはり無心なる名稱はあるが、これとは同一物でない。

(一) 牧野云フ、小野
 蘭山ハ夏枯草ノ眞物
 ナジふにひとヘトシ
 うつばくさチサウデ
 ナイト斷ジテ居レド
 モ私ハ之レニ反對ス
 ル、此じうにひとヘ
 ハ A. Junc. (きらんさ
 う屬)ノ一種で、多分
 支那ニハ無イ品(然
 シ其類品ハアツテ
 モ)デアアラウト思フ、
 昔支那デハ夏枯草ト
 稱スルモノハ幾品カ
 アツタカ知ラスガ、
 今日デハうつばくさ
 チ夏枯草トスルチ正
 シイ事ダト考ヘル。
 (二) 大觀ニヨレバ以
 下頌ノ説ナリ。

(二) 夏 枯 草 (本經下品)

和 名 うつばぐさ
 學 名 *Brassica vulgaris*, L.
 科 名 唇形科(唇形科)

釋 名

夕 句 (本經)

乃 東 (本經)

燕 面 (別錄)

鐵 色 草

震亨曰く、この草は

夏至が過ぎると枯れる。蓋し純陽の氣を稟けたもので、陰氣に遭へば枯れる。故にこの名稱があるのだ。

集 解

別錄に曰く、夏枯草は蜀郡の川谷に生ずる。四月に採收する。

恭曰く、處處にある。(三) 平澤に生ずるもので、冬至後に旋復に似た葉が生え、三

月、五月に穂になつた花を開く。紫白色で丹參の花に似たものだ。子も穂になる。

五月には枯れるものだ。四月に採收する。

時珍曰く、原野の間に甚だ多い。苗は高さ一二尺ばかり、莖はやや四角で葉は節

に對して生える。旋復の葉に似たものだが、長大で細齒があり、背面が白くて紋

が多い。莖の端が長さ一二寸の穂になり、その穂の中に淡紫色の小さい花を開く。

一穂に四粒の細子がある。丹溪が『子無し』といったのは觀察の粗漏だ。嫩苗は燂

で浸して苦味を取り、油、鹽を拌ぜれば食し得る。

正誤

宗奭曰く、今はこれを臭鬱きううつといふ。秋季から生じ、冬を経て凋しぼまず、

春白花を開き、夏子を結ぶ。

震亨曰く、臭鬱は草に臭味のあるものだ。即ち莞薺じやうきのことである。夏枯草には臭

味がない。この二種は明かに別箇のものだ。二物俱ぐに春生えて夏枯れるが、夏枯は先に枯れて子が無く、臭鬱は後に枯れて子を結ぶ。

莖葉

氣味

【苦く辛し、(五)寒にして毒なし】之才曰く、土瓜が使となる。

汞こ、砂を伏す。

主治

【寒熱、癰癰、鼠瘻そろう、頭瘡づさう、癥ちやうを破り、瘰、結氣、脚腫濕

痺を散じ、身體を軽くする】(本經)

發明

震亨曰く、本草には、夏枯草の大いに癰癰を治し、結氣を散ずること

を言つて、厥陰けつゐんの血脈を補養する功力あることに言及してないが、その寒熱を退けるを観るに、虚せる者には使ふべきだが、實せる者には行、散の藥を佐とし、外治として艾灸がいきうを用ゐ、やはり漸次に效を取るべきである。

時珍曰く、黎居士の易簡方に「夏枯草は目疹を治す。沙糖水に一夜浸して用ゐる

〔同〕本村康百ク、本草家ハジふにひとヘチ夏枯草ノ本條トシうつばぐさチ滁州夏枯草トスレドモ、本邦市場ニ於テハ普通ノウつばぐさチ用サ。
〔成分〕うつばぐさノ全草ハ水ニ可溶性ノ無機鹽類約三・五％チ含有シ、其内約六八％ハ鹽化カリヨリ成ル、又水ニ難溶性ノアルカロイド様物質チ含有ス。
久保田晴光、中島清吉——滿醫九(昭三)二六七。
〔並〕大觀ニ溫トアリ。

（六）即系也ノ三字、
醫學綱目ニ日本又名
目系ノ六字ニ作レリ
之ニヨリテ訂正ス。

のであつて、その能く内熱を解し、肝火を緩にする功力を應用するのだ」とあり、樓
全善は「夏枯草は、眼球が疼痛して、夜間特に甚しきものを治するに神效がある。



〔草 枯 夏〕

或は苦、寒の藥を點けて、た
めに反つて甚しく疼くものに
神效がある。蓋し眼球は眼本
に連つて居り、（六）日本はまた
目系と名づくるもので、厥陰
の經に屬する。夜間特に甚し
きもの、及び苦、寒の藥を點

けて反つて甚しく疼くものは、夜と寒とはやはり陰だからだ。夏枯草は純陽の氣を
稟け、厥陰の血脈を補するものだから、右の病證に神の如き治效があるので、陽を
以て陰を治するのだ。ある男子は、夜になると眼球が疼き、眉稜骨から頭の半に連
つて腫痛し、黃連膏を點すれば反つて甚だしく疼き、諸藥も效がなかつたが、厥
陰、少陽に灸して見ると、疼は随つて止まつたが、半日にしてまた發作し、更に月

餘に互つてその状態が繼續した。そこで夏枯草二兩、香附二兩、甘草四錢を末にし、一錢半づつを清茶で調へて服せたところ、咽を下ると疼が半減し、四五服にして全く癒えた』といつてある。

附方

舊一、新六。

【目を明にし、肝を補す】肝虚で眼睛が(七)痛み、冷涙が止

(七)大觀ニ痛ヲ疼ニ
作ル、血ヲ筋ニ作ス。

差明ハ腺病性結
膜炎、
臘茶ハ樽茶、

臘茶ハ樽茶、

まらず、血脈が痛んで(八)差明し、日光を怕れるには、夏枯草半兩、香附子一兩を末にし、一錢づつを臘茶湯で調へて服す。(簡要濟衆) 【赤白帶下】夏枯草を開花時に採つて陰乾して末にし、毎服二錢を米飲で食前に服す。(徐氏家傳方) 【血崩の止まぬ

もの】夏枯草を末にし、方寸匕づつを米飲で調へて服す。(聖惠方) 【産後の血運】心

氣絶せんとするには、夏枯草を搗き、絞汁一錢を服するが甚だ妙である。(徐氏家傳方)

【撲傷、金瘡】夏枯草を口で嚼爛して瘡上を罌すれば癒える。(衛生易簡) 【汗斑白點】

夏枯草を煎じた濃汁で日毎に洗ふ。(乾坤生意) 【瘰癧、馬刀】已に潰れたると、未だ

潰れざると、或は日久くして漏と成つたものとを問はず、夏枯草六兩、水二鍾を七

分に煎じ、食事と時間を隔てて温服する。虚甚きには煎汁を熬膏して服し、竝に患

部へ塗り、十全大補湯に香附、貝母、遠志を加へて併用するが尤も善し。この物は

血を生ずるので、瘰癧を治する聖藥である。得易い草だがその功は甚だ多い。(薛巳外科經驗方)

(一) 劉寄奴草 (唐本草)

和名 未詳
學名 未詳
科名 未詳

釋名

金寄奴 (大明)

烏藤菜 (綱目)

時珍曰く、按ずるに、李延壽の南史に

『宋の高祖劉裕は小字を寄奴きぶといつた。微賤の頃、三新州でこも荻を伐つてゐて一疋

(一) 新州ハ新洲ノ訛、
新洲ハ一名薛家洲ト
イフ。今ノ江蘇省江
寧縣ノ北、大江中ニ
在リ。
(二) 大體ニ葉ヲ狄ニ
作ル。



劉寄奴

の大蛇に遇つた。その場で射止めたが、翌る日往つて見ると、その附近に白で何物かを杵くやうな音響が聞える。近寄つて見ると、青衣を著た數人の童子が楸くわの木この林で藥を搗いてゐた。「何をしてゐ

るか」と尋ねると、「吾等の主神が劉寄奴に射撃されたので、今それに傳ける藥を合

せてゐるのだ」と答へた。裕が「神ともいはれるものが、なぜその射撃した者を殺して丁はぬのか」といふと、「寄奴は王者たる人間なのだ。殺すわけに行かない」と答へた。その時裕が童子共を叱咤すると、皆あわてて逃げ散じたが、薬はそのまま取り残して往つたので、それを取收めて持ち歸り、その後戦場で金瘡を受けた度毎に、その薬を傳けると直ちに瘡が癒えるのであつた。世人はこの挿話に因んで、この草を劉寄奴と呼ぶ」と記載してある。鄭樵の通志には『江南地方では、漢の時代から劉の文字を卯金刀といふ。そこで轉じて劉を金と呼び、それからこの草をも金寄奴なる名稱で呼んでゐる』とある。江東地方ではこれを烏藤菜といふさうだ。

集解

恭曰く、劉寄奴草は江南に生ずる。莖は艾蒿に似て長さ三四尺、葉は山蘭草に似て失長である。一本の莖が直上に伸びて穂があり、葉は交ひ違ひに生える。子は稗に似て細かい。

保昇曰く、今は越州に産する。蒿の類だ。高さは四五尺、葉は菊に似て花の色が白く、實は黄白色で穂になる。夏季に苗を採收して日乾する。

頌曰く、今は河中府、孟州、漢中、滁州にもある。春苗が生え、莖は艾

(四) 越州ハ石部蛇黄ノ註ヲ見ヨ。
(五) 大觀ニ日字アリ。
(六) 河中府ハ石部石中黄子ノ註ヲ見ヨ。
(七) 孟州ハ石部石膏ノ註ヲ見ヨ。
(八) 漢中ハ石部礬石ノ註ヲ見ヨ。
(九) 滁州ハ人參註ヲ見ヨ。

蒿に似て表面に四稜があり、高さは二三尺以内、葉は柳に似て青い。四月形が瓦松のやうで碎小な黄白色の花を開き、七月黍に似て細かい實を結ぶ。根は淡紫色で蒿莖に似てゐる。六月、七月に苗、及び花、子を採り、通じて用ゐる。

時珍曰く、劉寄奴は一莖直上し、葉は蒼朮に似て尖つて長く、糙澀で表面は深く、背面は淡い。九月に莖の端が數枝に分開し、一枝毎に十朶ほど簇つた小花を開く。花は白瓣黄蕊で、形は小菊の花のやうだ。花が終ると苦賣の花の絮のやうな白絮が出る。子は細長く、やはり苦賣の子のやうだ。所謂黍、稗のやうな實のものといふは此の物とは同一物ではないやうだ。葉も蒿に類するものではない。

子 苗も同じ。

修 治

敷曰く、凡そこれを採收したならば、莖、葉を去つて

實のみを用ゐ、布で薄殻を拭ひ去つて清淨にし、酒を拌せて午前十時から午後四時まで蒸して暴乾して用ゐる。時珍曰く、莖、葉、花、子、いづれも用ゐ得る。

氣 味

【苦し、溫にして毒なし】

主 治

【血を破り、脹を下す。多く服す

れば下痢を起す】（蘇恭）【下血、止痛。産後の餘瘀を治し、金瘡の血を止めるに極めて效がある】（別錄）【心腹痛、下氣、水脹、血氣、婦人の經脈、癥結を通じ、霍亂、

水瀉を止める【大明】「小兒の尿血には、新なものを研末して服す」【時珍】

附方

舊一、新七

【大小便血】

劉寄奴りうきぞを末にし、茶で二錢を調へて空心に服

すれば止まる。【集簡方】

【折傷の瘀血あせ】

腹内に在るものには、劉寄奴、骨碎補、延胡

索各一兩、水二升を七合に煎じ、酒、及び童尿各一合を入れ、溫めて頓服する。【千金方】

【血氣脹滿】

劉寄奴の穗實さんじつを末にし、三錢づつを酒で煎じて服す。量を過して

はならぬ。吐、痢を起すものだ。これは破血の仙藥である。【衛生易簡方】

【霍亂で痢す

るもの】劉寄奴草の煎汁を飲む。【聖濟總錄】

【湯火灼傷】

劉寄奴を搗いて末にし、先づ

糯米漿を鶏の羽にひたして上を掃ひ、その末を搽る。如何なる場合でも、痛まず、

痕の遺のこらぬ大驗の方である。凡そ湯火傷には、先づ鹽末を搽つて肉を保護し、壞やぶれ

ぬやうにして然る後に藥を搽るを妙とする。【〇〇（本事方）】

【風が瘡口に入りたるもの】

腫痛するには、劉寄奴を末にして搽れば止まる。【聖惠方】

【小兒の夜啼やてい】

劉寄奴半兩、

地龍を炒つて一分、甘草一寸を水で煎じ、少量づつ灌そそぐ。【聖濟總錄】

【赤白下痢】

〇〇陰

陽交帶するには、赤、白を問はず、劉寄奴、烏梅、白薑等分を水で煎じて服す。赤

には梅を増加し、白には薑を増加する。【艾元英加宜方】

〇〇大觀ニ經驗方ニ
作ル

〇〇陰陽ハ熱ノ有無
ニ就キテ云フモノ
カ。

(二) 牧野云フ、此者ハ決シテめこしツ一名はぐろさうデハナイ。

(三) 均州ハ石部長石ノ註ヲ見ヨ。

(一) 曲節草 (宋圖經)

和名 米
學名 米
科名 米
詳詳

釋名

六月凌

音は令(リヤウ)である。(圖經)

六月霜(綱目) 綠豆青(圖經)

蛇藍

時珍曰く、この草は性は寒だ。故に凌、霜、綠豆の名稱で呼ばれる。

集解

頌曰く、曲節草は(三)均州に生ずる。四月苗が生え、莖は四角で色は青く、節がある。葉は劉寄奴に似て青く、軟かなものだ。七月八月薄荷に似た花を著ける。子は結ぶがそれは用ゐない。五月、六月に莖、葉を採つて陰乾する。



〔草 節 曲〕
——霜 月 六——

莖葉

氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【發背瘡、癰腫を消して

毒を抜くには、甘草と共に末にして米汁で調へて服す】(蘇頌)

麗春草 (宋圖經)

科	學	和
名	名	名
未	未	未
詳	詳	詳

釋名

仙女蒿 (圖經) 定參草

頌曰く、麗春草は(一)檀嵎山の川谷に生ずる。

檀嵎山は(二)高密の管下に在る山だ。(三)河南(四)淮陽郡(五)潁川、及び(六)譙郡、(七)汝南郡

(一)檀嵎山、未詳。
(二)高密ハ今ノ山東省高密縣ノ地ナリ。
(三)河南郡ハ今ノ河南省洛陽、開封ニ互ル黃河以南、潁川以北一帯ノ地ナリ。
(四)淮陽郡ハ今ノ河南省ノ柘城、淮甯等安徽省ニ接スル東境ノ地ナリ。
(五)潁川郡ハ菊ノ註ヲ見ヨ。
(六)譙郡ハ淮陽郡ノ東境ニ接ス、今ノ安徽省亳縣一帯ノ地ナリ。
(七)汝南郡ハ山草類王孫、苦參ノ註ヲ見ヨ。
(八)河北ノ近山、河



〔草 春 麗〕

等ではいづれも龍羊草と呼び、(一)河北の近山、(二)鄴郡、(三)汲郡ではいづれも叢蘭艾と名け、(四)上黨の(五)紫團山にもあつて、定參草、又、仙女蒿と名ける。今は所在にある。甚だよく(六)輕黃を療ずるものだが、一般には知られてゐない。

時珍曰く、此の草は特殊の功力を有する

ものだが、その形状が記載されてない。今は瞿粟にも麗春草なる名があり、九仙子にも仙女嬌なる名があつてこの草と同名だが、恐らく同一物でないやうだ。大方の

北ハ石部金剛石ノ註
ヲ見ヨ。近山、未攷。
或ハ中央ニ近キ地方
ノ山ノ意カ。

(七) 鄆郡ハ今ノ河南
省臨漳縣一帶ノ地ナ
リ。

(八) 汲郡ハ今ノ河南
省汲縣附近一帶ノ地
ナリ。

(九) 上黨ハ人參、及
ビ石部長石ノ註ヲ見
ヨ。

(一〇) 紫園山ハ人參ノ
註ヲ見ヨ。

(一一) 續ハ心症ナリ故
ニ續黃ハ黃疸ノ一
種、心痛アルモノナ
ラン。

研究に俟つ。

花及び根

氣味

(缺)

主治

【瘰癧、黃疸】(蘇頌)

發明

頤曰く、唐の天寶年間に潁川郡の楊正が朝廷に進めた方で、名醫が皆その有効なることを實驗してゐる。その方に『麗春草は、時患傷熱が原因で瘰癧に變化し、全身壯熱して小便が黃赤になり、眼は金色の如く、顔はまた青黒く、心頭が氣痛して心臓の周圍が刺すやうに痛み、頭旋して倒れんとし、兼ねて脇下に瘰癧のあるもの、及び黃疸等を治す。實驗を経たものだ。その薬は、春三月に花を採つて陰乾し、一升を搗いて散にし、拂曉空腹にして三方寸匕を生麻油一盞に和して頓服するのである。一日に一回服し、五日を隔てて再服し、知あるを度とする。その根は黃疸を療ずるもので、搗汁一盞を空腹に頓服すれば少頃して二三回便通があり、疾は立るに已む。一劑で全癒せぬときは、七日を隔てて更に一劑を用ゐれば完全に癒える。酒、麪、猪、魚、蒜、粉酪等を忌む』とある。

旋覆花（本經下品）

和名　なぐるき
學名　*Inula britannica*, L.
科名　きく科（菊科）

釋名

金沸草（本經）

金錢花（綱目）

滴滴金（綱目）

盜庚（爾雅）

夏菊（綱

目）戴椹（別錄）宗奭曰く、花の縁が圓形に繁茂して下を覆ふから施覆花といふ。時珍曰く、諸種の名稱は皆その花の形狀に因んで命けたもので、爾雅に『葍は盜庚なり』とあるは、蓋し庚（ガノエ）は金であつて、この草は夏黄花を開いて金の氣を盜むものだといふ意味である。酉陽雜俎には『金錢花、一名毘戸沙。梁の武帝の時に始めて中國へ來たものだ』とある。

集解

別錄に曰く、旋覆は平澤、川谷に生ずる。

五月に花を採り、日光で二

十日間乾かして使用し得るものとなる。弘景曰く、近道の下濕の地に生ずる。菊花

に似て大きい。これとは別に旋菴根といふものがあつて、河南に産し、北國にも

ある。形は芍藥に似たものだ。旋菴膏を合はせる以外には用途のないもので、この

旋覆花の根ではない。

（一）大觀ニ北ヲ來比
ノ二字ニ作ル。

保昇ホシノ曰く、葉は水蘇スイソに似てゐる。花は黄で菊のやうだ。六月から九月までに花を採る。

頤イ曰く、今は所在いづれにもある。二月以後に苗が生え、水に近い土地に多く、

紅藍ベニに甚だ似てゐるが刺チがなく、


長さ一二尺ほどになる。葉は柳の

やうで莖は細い。六月に菊花のや

うな小銅錢大の深黄色の花を開

く。(三)上黨の田野の農民が金錢花

と呼んで、七八月に花を採るもの



〔花 覆 旋〕
—草 沸 金—

と、今近道の一般民家で庭や畑に栽培する金錢花とは、花、葉いづれも同一で、繁殖はふし易いものだ。恐らくそれが旋覆なのだらう。

宗奭ソウシヤク曰く、旋覆は、葉が大菊のやう、又、艾蒿アモのやうだ。秋季に大さ梧桐子の花ほどの淡黄色の花を開く。その香は菊よりも高い。別に旋花といふものもあるが、それは鼓子花コシカのことでこの花ではない。別に一條を掲げてある。

(二)上黨へ人參ノ註
ヲ見ヨ。

時珍曰く、花の形状は金錢菊のやうなもので、水澤の邊に生えるものは花が小さくて單瓣だが、民家で栽培するものは花が大きくて葦に簇つて咲く。蓋し土地の肥、瘠に因る相違である。根は細く白い。俗間の言ひ傳ひに『露水が滴下して生えるものだから繁茂し易いのだ』などいふが、蓋しさうではない。

花 修治

敦曰く、花を採取したならば、葦、并に殼皮、及び蒂子を去り、午前十時から十二時まで蒸して曬乾して用ゐる。

氣味

【鹹し、溫にして小毒あり】別錄に曰く、甘し、微溫なり。冷痢せしめる。權曰く、甘し、毒なし。大明曰く、毒なし。宗奭曰く、苦く甘く辛し。

主治

【結氣で脇下が滿して驚悸するもの。水を除き、五臓の間の寒熱を去り、中を補し、氣を下す】【本經】【胸上の痰結で唾の膠漆の如くなるもの、心胸の痰

(三) 按ズルニ膀胱下
ニ氣ノ字脱スルナラ
シ。
(四) 膨腫ハ赤目。

水、膀胱、留飲、風氣濕痺、皮間の死肉、目中の(翳)膨腫を消し、大腸を利し、血脈を通じ、色澤を益す【別錄】【水腫に主效があり、大腹を逐ひ、胃を開き、食物の通らぬ嘔逆を止める】【甄權】【痰水を行り、頭、目の風を去る】【宗奭】【堅を消し、疳を軟げ、噫氣を治す】【好古】

發明

頤曰く、張仲景の、傷寒で汗下の後に心下が痞堅し、噎氣の除かぬを治する藥に七物旋復代赭湯（ちちつせんふくたいてしかう）があり、婦人の病の雜治に三物旋覆湯があり、胡洽居士の、痰飲が兩脇に在つて脹滿するを治する藥に旋覆花丸があつて、尤も多く使用されるものだ。

成無己曰く、（五）鞭すれば氣堅するもので、この場合、旋覆の鹹は痞堅を軟かにするものだ。

震亨曰く、寇宗奭は『痰水を行き、頭、目の風を去るもの』といつてゐるが、やはり走り散ずる藥だから、虚する傾向（けいかう）の患者には多く服させてはならない。大腸を冷痢せしめるものだ。警戒を要する。

時珍曰く、旋覆は手の太陰、肺、手の陽明、大腸の藥であつて、治病上の功力はただ水を行き、氣を下し、血脈を通ずるだけに在るものだ。李衛公は『その花を嗅（か）げばよく目を損ずる』といつてある。唐慎微の本草では、誤つて旋花根の方をこの物の項に收載してあるが、訂正して置く。

附方

舊一、新三。【中風壅滯（ちゆうふうゆうせき）】旋覆花を洗淨して焙じ研り、煉蜜で梧子大の丸

（五）鞭トハ緊張スルコト。

(考) 大觀ニ方ノ上ニ
後字アリ。

にし、夜間臥床時に茶湯で五丸乃至七丸、十丸を服す。(經驗方) 【半產漏下】 虛、寒相搏ち、脈が弦花なるには、旋覆花湯——旋覆花三兩、葱十四莖、新絳少量、水三升を一升到煮て頓服する。(金匱要略) 【月蝕耳瘡】 旋覆花を焼いて研り、羊脂に和して塗る。(集簡要方) 【小兒の眉癰】 小兒の眉毛、眼睫が癰のために脱け落ちて生えぬには、野油花、即ち旋覆花、赤箭、即ち天麻の苗、防風等分を末にし、洗淨して油で調へて塗る。(綠微論)

葉

主 治

【金瘡に傅ければ血を止める】(大明)

【疔瘡腫毒を治す】(時珍)

根

主 治

【風濕】(別錄)

青 葙 (本經下品)

和名 のげいとう
學名 Celosia argentea, L.
科名 ひの科(莧科)

釋 名

草葙(本經)

葙蒿(本經)

崑崙草(唐本)

野雞冠(綱目)

雞冠莧(綱

目) 子を草決明と名ける。(本經) 時珍曰く、青葙なる名稱の意義は判らないが、胡麻の葉にも青葙なる名がある。この草もまた胡麻畑に多く生えてその名が同じや

(一) 牧野云フ、寛ハ
ひゆテ支那ノ原産デ
アルト思フ、學名ハ
Amaranthus himoo-
nus, Willd. デアツ
テ我邦ニハ往時支那
カノ漢藥シバモノデ
アル。

(二) 藥字大觀ニ據テ
輸入ス。
(三) 荆襄ハ山草類貫
衆ノ註ヲ見ヨ。

うだ、その物が似てゐるからさう呼ぶやうになつたものではないかと思ふが、青蒿せいこうにも草蒿なる名稱があつて、その功力が似たもので、名もやはり同じいのは如何なるわけだらうか。その子は目を明かにする功力が決明けつめいと同様だから草決明なる名稱がある。その花、葉が雞冠に、嫩苗がけん莧けんに似てゐるところから、雞冠莧と謂ふのである。鄭樵の通志に『俗に牛尾蒿と名ける』とあるは誤だ。

集解

別錄に曰く、青箱せいこうは平谷、道旁どうぼうに生ずる。三月莖、葉を採つて陰乾し、五月、六月子こを採る。弘景曰く、處處にあるもので、麥棚花はくほうわに似て子が甚だ細い。



別青に草蒿、或は草藁そうかうと書く名稱のものがあつて、主治の功力も特に似て居り、形狀も名稱もよく似て居り。疑はしいやうだが、實は兩種別物だ。

恭青曰く、この草は苗の高さ一尺餘で、葉は細く軟かい。花は紫白色だ。實は角子かくしになつて黒く扁へんたくして光があり、莧實けんじつに似て大きい。下濕の地に生えるもので、四月、五月にこ採る。三荆襄地方では莧けん

嵩草みんそうと呼ぶ。

頤い曰く、今は江淮の州郡や近道にもある。二月青苗が生えて長さ三四尺になり、葉は潤く、柳に似て軟かい。莖は蒿に似て青紅色だ。六月、七月の内に上が紅く下の白い花を開く。子は黒く光つて扁たく、蓂みん若じやくに似てゐる。根はやはり蒿根に似て白く、直下に伸び、獨莖の根が生える。六月、八月に子を探る。

時珍し曰く、青葙は田野の間に生ずる。嫩苗は莧に似たもので、食し得る。成長すれば高さ三四尺になり、苗、葉、花、實は雞冠草と一様で異らないが、ただ雞冠は花穂が大きくて扁たいものや團になるものがあり、この草は梢間から花穂が出て尖つて長く、四五寸あつて兎尾さびのやうな形狀だ。水紅色のものや黄白色のものもある。子は穂の中に在つて雞冠子、及び莧子と一様で見別け難い。蘇恭が『角を結ぶ』といつたのは誤だ。蕭炳は『黃花のものを陶珠たうしゆ術と名ける』といひ、陳藏器の所説と同じくない。又、天靈草てんれいさうといふものもあり、やはりこの類の草だからいづれも左に記録する。

(興) 衛大觀ニ衍ニ作ル。
(五) 桃朱術
(和名) 無シ
(學名) 未詳
(科名) 未詳

附 錄

(五) 桃朱術

炳ひ曰く、青葙の一種に、花の黄なる陶珠術たうしゆじゆつと名けるものがある。

(六) 鴈來紅
(和名)はげいとう

(學名) Amaranthus
tricolor, L.
(科名)アマルギ科(莧科)

(七) 天靈草

(和名)無シ
(學名)未詳
(科名)未詳

(八) 思莖子

(和名)無シ
(學名)未詳
(科名)未詳
(和名)無シ
(學名)未詳
(科名)未詳

る。苗はよく似てゐる。藏器曰く、桃朱術は園中に生えるもので、芹のやうに細く、花は紫色で子は角になる。傍に鏡を置き、それに向けて敲けば子が自から飛び出る。婦人が五月五日にその子を探つて身に帶びれば夫に愛されるといふ。

(六) 鴈來紅 時珍曰く、莖、葉、穗、子、いづれも雞冠と同じ。その葉は九月になると花のやうに鮮かな紅色になるからかく名けたのだ。吳地方では老少年と呼ぶ。六月葉の紅になる一種は十樣錦と名ける。

(七) 天靈草 時珍曰く、按ずるに、土宿真君の本草に『形狀は雞冠花のやうだ。葉も似てゐるが、これを折れば乳のやうな液が出る。江湖、荊南地方の河の堤や池の邊に生える。五月その汁を取つて雄黃、硫黃を制し、雌黃を煮、朱砂を煉るに用ゐ得る』とある。

(八) 思莖子 數曰く、思莖子、鼠細子二物は眞によく青葙子に似てゐるが、ただこの物は味が違ふ。思莖子の味は苦い。煎じれば涎が出る。

莖葉 修治

數曰く、凡そ用ゐるには、先づ焼いて鐵の杵臼で搗いて用ゐる。

(一〇) 溫厲ハ熱病。

(一一) 赤障ハ結膜炎。
(一二) 青盲ハ緑内翳俗
ニアテソコヒ。
(一三) 翳腫大觀ニ著腫
ニ作ル。
(一四) 瘡大觀ニ瘻ニ作
ル。

氣味

【苦し、微寒にして毒なし】

主治

【邪氣、皮膚中の熱、風癢で身

體の癢さみの。三蟲を殺す】〔本經〕 【惡瘡、疥蝨、痔蝕、下部の膿瘡】〔別錄〕 【搗汁を

服すれば大いに(一〇) 溫厲を療ず】〔蘇恭〕 【金瘡血を止める】〔大明〕

子氣味

【苦し、微寒にして毒なし】 權曰く、苦し、平なり。

主治

【唇

口青】〔本經〕 【五臟の邪氣を治し、腦髓を益し、肝を鎮め、耳目を明にし、筋骨を堅

くし、風寒濕痺を去る】〔大明〕 【肝臟の熱毒が眼を衝いた(一二) 赤障、(一三) 青盲、(一四) 翳腫、

惡瘡、疥、瘡を治す】〔甄權〕

發明

炳曰く、眼を理するに青葙子丸といふ藥がある。宗奭曰く、青葙子は、

本草經には眼を治することを説いてない。ただ藥性論と日華子とが始めて、肝を治

し、目を明かにすることを言つてある。今は一般に眼を治するものとして多く用ゐ

てゐるが、一向本經の文意に該當しない。

時珍曰く、青葙子の眼を治する功力は決明子、苧實と同様だ。本經には、眼を治

すところ言つてないが、『一名草決明』といひ、『唇口の青きに主效がある』といふ以

上、目を明にする功力の示されてあることは言ふまでもないことだ。目は肝の竅で

(五) 初平元年ハ西曆
紀元一九〇年ニ當
ル。

ある。唇口の青きは足の厥陰の經の證である。古方に熱を除くにもやはり多く用ゐてあつて、青葙子が厥陰の藥であることは明だ。況や實驗上往往に目を治する效のあるのが何より有力な權證であらう。魏略には「(五)初平年代に青牛先生なる人があつて青葙子丸を服してゐたが、年百餘歳に及んでも五六十歳位に見えた」とある。

附方

舊一。『鼻衄(びぢく)の止まぬもの』眩冒して死せんとするには、青葙子汁三

合を鼻から灌ぎ込む。(貞元廣利方)

雞冠 (宋嘉祐)

和名 けこがい
學名 *Celosia cristata*, L.
科名 ひび科(莧科)

釋名

時珍曰く、花の形狀に因(う)んだ命名だ。

集解

時珍曰く、雞冠は處處にある。二月苗が生え、夏に入つて高きは五六尺になるが、低きは纔かに數寸に止まる。葉は青く柔かで頗る白莧菜(はくけんさい)に似てゐるが、狭く尖つて赤脈がある。莖は赤色で、或は圓く、或は扁たく、筋が起つてゐる。六七月に梢の間に花を開き、紅、白、黄の三色があつて、その穂の圓く長く尖つた



【花 冠 雞】

ものはさながら青葙の穂のやう、扁たく巻いて平らなものはさながら雄雞の冠のやうだ。花の大なるものは周圍一二尺ほどのものもあり、層層溢れるやうに卷き出て愛すべきものである。子は穂の中に在つて黒く細かく、光つて滑かだ。莢實と一樣である。その穂の形の秕麥ひやくのやうなものは、花に最も耐久性があつて、霜が降りてから始めて焦げちぢれる。

苗 (二) 氣味 【甘し、涼にして毒なし】 主治 【瘡痔、及び血病】 (時珍)

子 氣味 【甘し、涼にして毒なし】 主治 【腸風瀉血、赤白痢を止める】 (藏器) 【崩中帶下を治する薬に入るには炒つて用ゐる】 (大明)

花 氣味 同上 主治 【痔漏下血、赤白下痢、崩中。赤白帶下には赤白その花の色で分けて用ゐる】 (時珍)

附 方 新十。【吐血の止まぬもの】白雞冠花を醋に浸して七回煮て末にし、二

(一) 本村(康)曰ク、
(成分)種子ハ組成不
明ノ脂肪油ツエロシ
ア油ヲ出ス。(De
Negri n. Falsis;
Pharm. Post. 1836.
29, 189(W. P. 187)
又 Weisner: Jt. P.
714 (1927)ニ據レバ
綠褐色無臭ノ極メテ
徐徐ニ乾燥スルアマ
ランツエーン油ヲ出
ス。

錢づつを熱酒で服す。（經驗方）

【結陰便血】雞冠花、椿根白皮等分を末にし、煉蜜で

梧子大の丸にし、一日二回、三十丸づつを黃芪湯（わうぎたう）で服す。（聖濟總錄）

【便後の下血】

白雞冠の花、并に子を炒り煎じて服す。（聖惠方）

【五痔肛腫】久しく瘡をずして變じ

た瘻瘡（ろうさう）には、

雞冠花、鳳眼草各一兩を水二盃で湯に煎じて頻りに洗ふ。（衛生寶鑑）【下

血脫肛】白雞冠花、防風等分を末にして糊で梧子大の丸にし、空心に七十丸を米飲

で服す。ある方では、白雞冠花を炒り、櫻櫚灰（きやうくわい）、羌活（きやうくわつ）各一兩を末にし、二錢づつを

米飲で服す。（永類鈴方）

【經水不止】紅雞冠花一味を晒乾（しつかん）して末にし、三錢づつを空

心に酒で調へて服す。魚腥、豬肉を忌む。（孫氏集效方）【産後の血痛】白雞冠花を酒で

煎じて服す。（李樓奇方）

【婦人の白帶】白雞冠花を晒乾して末にし、毎早朝空心に酒

で三錢を服す。赤帶には赤きものを用ゐる。（孫氏集效方）【白帶沙淋】白雞冠花、苦蘆

蘆（ろ）等分を焼いて性を存し、空心に火酒で服す。（摘玄）

【赤白下痢】雞冠花を酒で煎じ

て服す。赤には紅花を用ゐ、白には白花を用ゐる。（集簡方）

(一) 紅藍花 (宋開寶)

和名 べにばな、又、くれなゐ
學名 *Carthamus tinctorius*, L.
科名 きく科(菊科)

釋名

紅花(開寶) 黃藍 頌曰く、その花の色が紅く、葉が頗る藍に似たものだから藍の名がある。

集解

志曰く、紅藍花 卽ち紅花である (三) 梁、漢、及び (四) 西域に生ずる。

博物志に『張騫が種を西域で得たものだ』とあるが、今は (五) 魏の地方でもこれを栽培する。

(一) 梁ハ梁州、漢ハ漢中、石部特生、梁州ノ註ヲ見ヨ。
(二) 西域ハ今ノ新疆省ヲ指ス。
(三) 魏トハ漢ノ魏郡
卽チ今ノ河南省ノ黄河以北、山西、河北二省ニ境スル漳河流域ノ地ナリ。
(四) 棟葉ハ實ヲ盛總芭チ云フ。

頌曰く、今は處處にあるもので、民家で畑に種ゑる。冬季よく耕した土地に子を蒔けば春苗が生え、夏になると花が開く。花は下が (五) 棟葉になつて刺が多く、花はその棟上に出るのである。栽培に従事するものは露のあるうちにこれを採る。花は採れば復た出るもので、幾度か採り盡すまで採つて罷める。實は棟中に結ぶもので、大さ小豆ほどの白顆である。その花を暴乾して物を染めれば眞紅になる。又、臘脂を作る材料になる。

(七) 木村(康)曰ク、紅花ハベにばなノ花冠ヲ採集シテ乾燥セルモノナリ、花冠ハ管狀ニシテ先端分裂シ長サ約一種ニ至リ、新鮮ナルモノハ外面黃色、陳久品ハ赤褐色又ハ暗褐色ナリ、本品ハ特異緩和ノ香氣アリ、味ハ微ニ苦シ、板紅花ハ紅花ヲ壓搾シ乾燥セルモノナリ、本品ハ通常四角板狀ナリ、大サ約五六匁平方厚サ二三銖ニ至リ暗紅色ナリ、本品ハ寡ラ支那ヨリ輸入セラレ紅花ノ真品ナリ。(刈米木村、邦藥植(昭和四年版))

(成分) 花ハサフロール黃、黃色素、及ビカルタミン(紅色素)ヲ含有ス、種子ハ脂肪

時珍曰く、紅花は二月、八月、十二月いづれも種を蒔いてよい。雨後に子を蒔くもので、麻を蒔く方法の通りである。生えたばかりの嫩い葉、苗は食し得る。その



〔花 藍 紅〕

葉は小薊せうぎの葉のやうで、五月になれば花を開く。花は大薊の花のやうで、色が紅い。早晩に花を採り、搗き熟して水で淘り、布袋で絞つて黄汁を去り、また搗いて酸粟米泔清でまた淘り、また袋で絞つて汁を去り、一夜青蒿で覆ふて置いて晒

し乾し、或は捏ね、或は薄餅にして陰乾して貯藏し、藥に入れるときは揉み碎いて用ゐる。その子は五月に採り、淘淨し搗き碎いて煎じ、その汁に醋を入れて蔬菜に拌せて食へば、極めて濃厚で美味なものだ。又、車の脂、及び燭火の材料にもなる。

花 氣 味

【辛し、溫にして毒なし】 元素曰く、心に入つて血を養ふ。所

謂、その苦、溫は陰中の陽だから心に入るのだ。常歸を佐とすれば新血を生ずる。好古曰く、辛くして甘く苦し、溫であつて肝經かんけいの血分の藥である。酒に入れるがよ

油二—三 ㊦チ含有ス、主トシテ油酸及リノール酸ノグリセリドヨリ成ル。

紅花ハ婦人病藥ニ總經藥ニ供シ、酒ニ冷浸シテ服用ス、又食用紅ヲ製シ婦人ノ化粧用或ハ菓子ノ無害著色料トス。

文獻Muh. Ann. 136 (1863) 155, Jones; Chem. Ztg. 34, 1003

232. 龜高徳平—化誌二九(明、三九) 龜高徳平, A. G. Perkins

—化誌三一(明、四二) 一七七、黒田

ちか子—日本藥學會講演(昭、四、一、羽根田作夫) 植研、四(昭、二) 一四二。

(ハ) 衡任(展) 解已ニ前ニ出ヅ。

(ニ) 本草發揮ニ漫ニ作ル。

し。

主 治

【産後の血運、口嚙、腹内の惡血が盡きずして絞痛するもの、胎兒が腹中で死亡したものには、いづれも酒で煮て服す。また蠱毒にも主效がある】(開寶) 【多く用ゐれば留血を破り、少しく用ゐれば血を養ふ】(震亨) 【血を活し、燥を潤ほし、痛を止め、腫を散じ、經を通ずる】(時珍)

發 明

時珍曰く、血は心包に生じて肝に貯藏し、衡任に屬する。紅花汁はこれと類を同うするものだから、能く男子の血脈を行らし、女子の經水を通ずるのであつて、多く用ゐれば血を行り、少く用ゐれば血を養ふものである。按ずるに、養荷(先) 慢筆に『新昌の徐氏の妻は、産運を病んで一旦死亡したが、ただ胸膈が微かに熱するので、名醫陸某が、「これは血悶といふ病だ。紅花數十斤あれば活きる」と言つて、急にそれを買ひ調へさせて大鍋で湯に煮取り、三箇の桶に盛つて窓格子の下にそれを据ゑ、病婦を昇き出してその上に寝せて熏じ、湯が冷えると再び湯を加へて熏じた。すると少頃して病婦は指を動かすやうになり、半日にして遂に蘇つた』と記載してある。按ずるに、これはやはり唐の許胤宗が、黃芪湯で柳太后の風病を

熏じた時と同一手段を應用したものだ。

附 方

舊五、新三。

【六十二種の風】張仲景が六十二種の風を治し、兼ねて腹

（二〇）鐘大觀ニ強ニ作
ル。

（二一）大觀ニ海上方ニ
作ル。

（二二）大觀錄上秘字ア
ル。

内の血氣刺痛を治した方。紅花一大兩を四分し、酒一大升で煎じて鍾（二〇）半にして頓服する。止まぬときは再服する。（圖經本草）【一切の腫疾】紅花を搗き熟して汁を取つて服す。三服を過ぎずして瘥える（外臺秘要）【喉痺壅塞】通ぜぬには、紅藍花を搗いて絞汁一小升を取つて服し、瘥えるを度とする。冬期で生花がないときは、乾いたものを浸し濕して汁を絞り、煎じて服するが極めて效驗がある。（二一）（廣利方）【熱病が因で胎兒の死亡せるもの】紅花を酒で煮た汁二三盞を飲む（熊氏補遺）【胎衣不下】方は上に同じ（楊氏產乳）【産後の血運】心悶氣絕するには、紅花一兩を末にして二服に分け、酒二盞で一盞に煎じて續けざまに服す。若し口嚙するときは押し開いて灌ぎ込む。或は尿を入れるが尤も妙である。（子母二二錄）【水の出る聾耳】紅藍花三錢半、枯礬五錢を末にし、綿杖を以て出水を拭ひ淨めて粉末を吹き込む。花がないときは枝葉を用ゐる。ある方では礬を去る（聖惠方）【噎膈で食物を拒むもの】端午に第一回と第二回に咲いた紅花を採り、無灰酒で拌せて焙じ乾かし、瓜子のやうな

(一) 牧野云フ、さふらんハ和蘭デハ *Andromeda* トイヒ英語デハ *Andromeda* ト稱スル、此等ハ原トハあらびあ語カラ出タモノデア
ル、ソシテ此植物ハ小亞細亞ガ原産地テアル。

木村(康)曰ク、さふらんハ其柱頭ヲ採集シ乾燥シテ用ウルモノナレドモ、高價ナルヲ以テ贗品少ナルヲ以テ之ヲ鑑識スルニハ下ノ諸點ニ注意スルヲ要ス、さふらんハ暗赤褐色ニシテ長三糰ニ至ル小管ヲナシ、上部ニ向ヒテ漸ク擴大ス、水ニ浸シテ之ヲ開展セシムレバ其上端ニ鈍鋸齒ヲ現シ一側ニ於テ開裂ス、さふらんチ水、アムモニヤ水、エーテル或ハ酒精ニ

形の血痢^{ぐけつ}と等分を末にし、無灰酒一盞で湯を隔て頓に熱し、(酒の稠なするが如きか) 徐

ろに嘔む。初服には二分、次の日には四分、三日目には五分を服す。(楊起簡便方)

子 主 治

【天行瘡痘^{てんかうさうとう}には水で數顆を吞む】(開寶) 【功力は花と同じ】(蘇頌)

附 方

舊二、新一。【血氣刺痛】紅藍子一升を搗き碎き、無灰酒一大升を子に拌

ぜて暴乾し、重ねて搗き篩ひ、蜜で梧子大の丸にして空心に四十丸を酒で服す。(張

仲景方) 【瘡疽の出でざるもの】紅花子、紫草^{しそうじやう}茸各半兩、蟬蛻^{せんでい}二錢半を水、酒半鍾で

煎じて半減し、大小を量り加減して服す。(麗安常傷寒論) 【婦人の中風】血熱煩渴する

には、紅藍子五合を熬つて搗き、早朝半大匙を取つて水一升で煎じて七合を取り、

渣を去つて少しづつ嘔む。(貞元廣利方)

苗 主 治

【生で搗いて遊腫に塗る】(開寶)

番 紅 花 (綱 目)

和 名 さふらん
學 名 *Ocrotus sativus*, L.
科 名 あやめ科(莖尾科)

釋 名

洎夫藍(綱目) 撒法郎

浸セバ此液ヲ帶黃色ニ染ム、又さふらんニ二十萬倍ノ水ヲ加フルモ尙其水ニ黃色ヲ呈セシム、さふらんノ香氣ハ峻烈芳香性ニシテ味ハ苦シ、凡ソさふらんハ淡黃色ノ莖莖ノ混有愈鮮少ナレバ愈以テ佳品トス、佛國オルレアン市ノ東北ニ於ケルガチネー郡ヨリ出ヅルさふらんハ暗褐色ヲ有シ、殆ンド莖莖ニ屬ス、西班牙ノウアレnciaア産さふらんハ其品位佛國産ニ譲ラズ、而シテ西班牙ノアリカント州ヨリ出ヅル者ハ其色深淡洳ニシテ、多ク黃色ノ莖莖ヲ夾雜シ劣品トナス、本品チ水ニ浸シ軟化セシメ開展スルトキハ異種ノさふらん(むらさきさふらん) (Cassia veronica, Mill.) 其他紅花あるにか花、令蓋花、菊花、肉纖維等ノ如キ稍外見ノさふらんニ類似スルモノヲ夾雜ハ形狀ニヨリテ軟ク之ヲ發見スルコトヲ得、例之バむらさきさふらんハ其上端澎起スルヲ以テ眞ノさふらんと判別スルコト難カラザルベシ、又本品ニ硫酸バリウム、炭酸カルチウム、石膏等ヲ用キテ重量ヲ増加セシメタルモノハ、之ヲ浸漬スルニ當リ白色ノ物質ヲ露底ニ沈澱ムベシ、其他さふらんノ價値ニ夾雜スルモノハグリセリン、叫禁、礬砂、糖類、穀粉、紫檀末等ハ顯微鏡下ニ之ヲ區別シ得ベク、多量ノ無機性夾雜物ハ灰分ノ量ヲ増加シ糖類ノ夾雜ハ灰分ノ量ヲ減少ス、故ニ灰分ニシテ三%以下又ハ七%以上ノモノハ多少疑ヲ容ルベキモノトス。

集 解

時珍曰く、番紅花は西番^{せいばん}同回^{どうかい}の地、及び天方國^{てんほうこく}に生ずる。即ち



異^{ちが}ひがあるに過ぎない。

彼の地の紅藍花である。元朝の時代には食膳の調理に入れたといふ。按ずるに、張華の博物志に「張騫^{ちやうけん}が紅藍花の種を西域から齎^{もち}らし」とある、このものもその一種で、或は產地の地位形勢や、氣候地味の關係から多少の

氣 味

【甘し、平にして毒なし】

主 治

【心憂鬱積、氣悶して散ぜぬもの

に血を活かす。久しく服すれば精神を愉快にする。又、驚悸^{きやうき}を治す】(時珍)

附 方

新一。

【傷寒發狂】驚怖し、恍惚たるには、撒法^{さふらん}即二分を水一盞に一

番 紅 花

(生藥學一八・大・一五)二七二。

(二) 西番ハ金部鐵ノ註ヲ見ヨ。

地。一名天堂。又曰獸伽。水道自忽魯誤斯四十日始至。トアリ。即チ今ノアラビヤノ地ナリ。獸伽、即チ回回教ノ聖地メッカナリ。

(四) 天方國ハ漢書ニ所謂條支國ノ地ニシテ明史ニハ『大方古筠

(五) 木村(康)曰ク、

さふらんノ成分、さ

ふらんノ雌燕ハアル

フアクロチン、ベタ

クロチン、ガマクロ

チント云フ三種ノ色

素其他ビクロクロチ

ン(結晶性苦味質)脂

肪油(六〇)精油(〇・

六%)等ヲ含有ス。

(一) 燕トハ今ノ河北

省、及ビ遼東ノ地ヲ

指ス。

(二) 匈奴トハ今ノ蒙

古地方ヲ指ス。

燕脂 (綱目) 製品のべにてある

釋名

輕赦

時珍曰く、按ずるに、伏侯の中華古今注に『燕脂の起原は殷の

紂王の時代であつて、當時紅藍花の汁を凝らして作つたもので、脂で調へて女子の

顔を飾つたのである。(一) 燕の地方に産するところから燕脂といふ。或は輕赦とも書

く。(二) 匈奴では妻なる稱を閼氏といふが、それは音が燕脂に同じく、妻の顔が燕脂

のやうに愛らしいといふ意味だ』とある。俗に臙肢、胭支と書くはいづれも謬だ。

集解

時珍曰く、燕脂に四種ある。一種は、紅藍花の汁で胡粉を染めて製す

るもので、蘇鶚の演義に所謂『燕脂は、葉が薊に、花は蒲に似たもので、西方に産

する。中國ではこれを紅藍といひ、粉を染めて婦人の化粧料にする』とあるがそれ

である。一種は、山燕脂花の汁で粉を染めて作るものだ。段公路の北戸錄に所謂

(三) 端州ハ隋ニ置キ
宋ニ廢ス。今ノ廣東
省高要縣ノ地ナリ。

(四) 含苞ハツボミ。

『端州の山間のある花は、叢生の草で葉は藍に類し、正月蓼に似た花を開く。その地の住民は、その含苞(かんほう)のものを採つて燕脂粉を作る。また紅藍のやうに染料にもなるものだ』とあるがそれである。一種は、山榴花の汁で作るものだ。鄭虔胡本草中に載録しある。一種は、紫釧(しきん)で綿を染めて作るものだ。これは胡燕脂といふ。李珣の南海藥譜に記載してあつて、現に南方の地では多く紫釧燕脂を用ゐてゐる。俗に紫梗と呼ぶものがそれだ。概して皆血病の薬に入れるものだ。又、落葵子(らくきし)から取つた汁も粉に和して顔に塗り、やはり胡燕脂と稱されてゐるが、それは菜部に掲げてある。

氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【小兒の疳耳(ていじ)には浸した汁を滴ら

す】(問寶) 【血を活かし、痘毒を解す】(時珍)

附方

新五。

『乳頭裂破』燕脂、蛤粉を末にして傅ける。(危氏得效方)

【小兒の

驚口』白く厚く、紙を貼つたやうになるものには、坏子燕脂(はいし)を乳汁で調へて塗る。

一夜で效があるものだ。男兒の驚口には、女兒を産んだ婦人の乳を、女兒の驚口には、男兒を産んだ婦人の乳を用ゐる。(集簡方) 【漏瘡腫痛】猪膽七箇、綿燕脂十(金)箇

本草綱目拾遺

を水で洗ひ、和して七回搽ればよし（救急方）
「目に入らんとする痘の豫防法」
「膿脂を嚼んで汁を點ける」（集簡方）
「痘瘡の倒陷」
乾臙脂三錢、胡桃を焼いて性を存して一箇を研末し、一錢づつ胡荽^{こすゐ}を煎じた酒で服し、再服して效を取る（救急方）

（二）大薊小薊（別錄中品）

和名 未詳
學名 *Cirsium* sp.

和名 のあざみ
學名 *Cirsium Murexii* Maxim.

科名 きく科（菊科）

科名 きく科（菊科）

釋名

虎薊（弘景） 馬薊（范汪） 貓薊（弘景） 刺薊（日華） 山牛蒡（日華）

雞項草（圖經） 千針草（圖經） 野紅花（綱目） 弘景曰く、大薊は虎薊、小薊は貓薊

であつて、葉にはいづれも刺が多い。相似たものだ。田野に甚だ多い。方藥に用ゐることは稀だ。

○時珍曰く、薊は髻（ケイ）と同様な意味であつて、その花が髻のやうな形狀だといふことである。

虎といひ、貓といふは、その苗の形狀が恐ろしい獠猛^{ろうもう}なことの形容である。馬とは大なる物の稱だ。牛蒡とは、その根が牛蒡の根に似てゐるからだ。

（一）牧野云フ、大薊ハあざみの一種ニハ相違ナイガ其的品ハ何ッテアルカ能ク判ラヌ、何カ我がやまあざみ（*Cirsium sp. - iotum, Matsum.*）ニ似タモノナランガ其種名ハ今不明デア^ル、*C. pendulum, Fisch.* 即チたかあざみニ大薊ノ名アレド此書ノ大薊デハナイ。小薊ハ我がのあざみト同ジモノト斷ズル、*C. chinense, Gardn. et Champ.* 即チからあざみニ小薊ノ名アレド此品ハ我がやなぎあざみニ

似タモノデ此書ノ大
薊、小薊ニハ關係ハ
ナイ、又植物名實圖
考ニ小薊トシテ圖ス
ルモノハひれあざみ
(*Cirsium crispus*,
L.)デコレハ小薊ノ
正品デハナイト斷ズ
ル。

(二)薊門ハ今ノ北京
德勝門ノ西北ニ在
リ。土城門トモイフ。



〔薊 大〕

雞項とは、その莖が雞の項に似てゐるからだ。千針とか、紅花とかいふは、いづれもその花の形容である。鄭樵の通志に「爾雅に「薊は狗毒なり」とある。その藝が即ち薊だ」とあるが、果して然りや否や判らない。

藏器曰く。(三)薊門なる地名は薊の多いところから名稱となつたもので、北方の産が勝れてゐるわけであらう。

集解

別錄に曰く、大、小薊は五月採收する。

恭曰く、大、小薊は、葉は似てゐるが功力に特異點がある。大薊は山谷に生じ、根は癰腫を療ずる。小薊は平澤に生じ、腫を消する力がない。しかしいづれもよく血を破るものだ。

頤曰く、小薊は處處にあるもので、俗に青刺薊といふ。三月苗が生え、二三寸の

時に根と共に採つて菜にして食ふと甚だ美味なものだ。四月には高さ一尺餘になつて刺が多く、その中心から花が出る。その花は頭端が紅藍花のやうで青紫色だ。北國地方ではこれを千針草せんしんそうと呼び、四月に苗を採り、九月に根を採り、いづれも陰乾して用ゐる。大薊は、苗も根もこれと

似てゐるが、ただ肥大なだけである。

小

宗奭曰く、大、小薊はいづれも似た

もので、花は髻のやうだ。ただ大薊は高さ三四尺で葉が皺しんみ、小薊は高さ一尺ばかりで葉が皺しんまぬだけの相異である。菜にして食ふ。微芒びぼうがあるが人體



に害はない。

大薊根 葉も同じ。

氣味

【甘し、溫にして毒なし】弘景曰く、毒あり。權

曰く、苦し、平なり。大明曰く、葉は涼なり。

主治

【婦人の赤白沃しやくびやくく。胎を安じ、吐血、鼻衄びせくを止め、人體を肥健ならしめ

（一）赤白沃ハ赤白帶
下ニ同シ。

(四) 作連トアレドモ
大艸ニ血運ニ作ルニ
從フ。

る【別錄】「根を搗き汁を絞つて半升を服すれば、崩中下血に主效があつて立ろに瘥る」【甄權】「葉は腸癰を治す。腹臓の瘀血、(四)血運、撲損には、酒、又は尿いづれにても任意のもので研つて服す。又、惡瘡、疥癬には、鹽と共に研つて罌(おほ)【大明】小薊根 苗も同じ。氣味 【甘し、溫にして毒なし】大明曰く、涼なり。

主治

【精を養ひ、血を保つ】(別錄)【宿血を破り、新血を生ずる。暴下血、血崩、金瘡出血、嘔血等には、絞汁を取つて溫服する。煎にし、糖に和して用ゐれば金瘡を合す。また蜘蛛、蛇、蠍の毒にこれを服するも佳し】(藏器)【熱毒風、并に胸膈の煩悶を治し、胃を開き、食物を落付け、熱を退け、虛損を補ふ】○「苗は煩熱を去る。生で研つた汁を服す」(いつも大明)【菜にして食へば、風熱を除く。夏季に熱煩して止まぬには、搗汁半升を服すれば立ろに瘥える】(孟詵)

發明

大明曰く、小薊は力が微弱だ。ただ熱を退け得るだけのもので、大薊の下氣を健養する力のやうなわけに行かない。

恭曰く、大、小薊はいづれもよく血を破る。ただ大薊は兼ねて癰腫を療するが、小薊の主效は血に専らで、腫を消する力はない。

【附方】

舊五、新九。

【心熱吐血】口の乾くには、刺薊らつげいの葉、及び根を搗いて汁を

絞しぼり、二小盞さん、つつ頓服する。（聖惠方）

【舌硬出血】止まらぬには、刺薊の搗汁を酒に

和して服す。乾いたものは末にして冷水で服す。（普濟方）

【九竅きうけつの出血】方は上に同

じ。（簡要濟衆）

【突然鮮血を瀉くするもの】小薊葉の搗汁一升を溫服する。（梅師方）【崩中

下血】大、小薊根一升を酒一斗に五晝夜漬けて任意に飲む。また酒で煎じて服する

もよし。或は生の搗汁を溫服する。○またある方では、小薊の莖、葉を洗つて切り、

その研汁一盞に生地黃汁一盞、白朮半兩を入れ、半減するまで煎じて溫服する。（千金方）

【隨胎下血】小薊の根、葉、益母草やくもそう各五兩、水三大盃を一盃に煮取り、その汁

を再び一盞に煎じ、全部を一日二回に分服する。（聖濟總錄）【金瘡出血】止らぬには、

小薊の苗を搗き爛ただらして塗る。（孟詵食療本草）

【小便熱淋】馬薊根の搗汁を服す。（聖惠方）

【鼻塞不通】小薊一把、水二升を一升に煮て分服する。（外臺祕要方）【小兒の浸淫

瘡さう】痛み忍び難く、寒熱を發するには、刺薊葉を新水で調へて瘡上に傅け、乾けば

換へる。（簡要濟衆方）

【癰瘡の痒いんやうさもの】刺薊葉の搗汁を服す。（千金方）

【婦人の陰痒いんやう】

小薊を煮た湯で日毎に三回洗ふ。（廣濟方）【諸瘻の合せぬもの】虎薊根、貓薊根、酸

(一) 牧野云フ、續斷ニ三種ガアル、一ハなぐな(D. japonica, Miq) デアル、二ハD. chinensis, Batal. デアル、三ハ即チ本條デアル、然シ本條ノモノ或ハ二ノモノカモ知レヌガ、此處ニハ先ヅ下ニ記シタ學名ノモノト定メテ置ク、集解ヲ讀ンデモ續斷ニハ數品アルヤウデアル、我邦ノ學者從來之レチ唇形科ノおどり、こさう(Tanum album, L.) ニ充テシハ種カデナイ。又おにのげし(Sonchus asper, Vill.) トスルモ中ツデキナイ。

棗根、枳根、杜衡各一把、斑蝥三分を炒つて末にし、蜜で棗大の丸にして日毎に一箇を服し、并に小さき丸を作つて瘡中に入れる。時俊方) 【丁瘡惡腫】千針草四兩、乳香一兩、明礬五錢を末にし、酒で二錢を服す。汗の出るを度とする。(普濟方)

(一) 續斷 (本經上品)

和名 たうなべな(新稱)
學名 *Dipsacus asper*, Wall.
科名 まつむしやう科(山蘿蔔科)

釋名

屬折(本經)

接骨(別錄)

龍豆(別錄)

南草

時珍曰く、續斷、屬折、

接骨なる名稱は、いづれもその功力を表示したものだ。

集解

別錄に曰く、續斷は常山の山谷に生ずる。七月、八月に採つて陰乾する。普曰く、(一) 梁州に産する。七月七日に採る。

弘景曰く、按ずるに、桐君藥錄に『續斷は生じて蔓延し、莖は細く、葉は荏の大さのほどで、根は本が黄白色で汁がある。七月、八月に根を採る』とある。今は皆莖、葉を用ゐてゐる。節毎に斷ち、皮に黄皴があり、鶏の脚のやうなものをば、今時の人はまた桑上寄生とも呼ぶ。又、接骨樹なるものがあつて、高さ一丈餘ほど、葉

〔二〕常山ハ石部凝水石ノ註ヲ見ヨ。

〔三〕藥州ハ石部特生石ノ註ヲ見ヨ。

〔四〕大觀ニ諸サ諾ニ作ル。

〔五〕陝西ハ宋ノ陝西路、石部丹砂ノ註ヲ見ヨ。河中府ハ石部

石中黃子ノ註ヲ、興元府ハ石部石膏ノ註

ヲ、大觀ニ興元ノ下ニ府字アリ。舒州ハ

山草類義ノ註ヲ、越州ハ石部蛇黃ノ註

ヲ、晉州ハ石部礬石ノ註ヲ、絳州ハ石部

玄精石ノ註ヲ見ヨ。

〔六〕大觀ニ葉字下亦相似ノ三字アリ。

〔七〕葉字本草發揮ニ據ル。

が蒨藎に似たもので、その皮は金瘡に主效がある。廣州にはまた續斷藤、一名諸藤といふがあつて、莖を斷つてその切口から滴る汁を器に承けて飲めば、虛損、絶傷を療じ、それで頭髮を洗へば髪を長くする。枝を折つて地に挿めば根が生えといふ。恐らくいづれも眞物ではない。李當之は『これは虎薊のことだ』といふが、虎薊と續斷とは大いに異ふ。ただ虎薊もやはり血を療するものではある。


恭曰く、所在の山谷いづれにもある。今俗間で用ゐるものは、葉は苧に似て莖は四角、根は大薊のやうで黄白色だ。陶氏の説は非ふ。

頌曰く、今は陝西、河中、興元、舒、越、晉、絳の諸州にもある。三月以後に苗が生え、幹に四稜があり、苧麻に似て葉は兩兩相對して生え、四月に益母の花に似た紅白色の花を開く、根は大薊のやうで赤黄色だ。謹んで按ずるに、范汪の方に『續斷とは馬薊のことだ。小薊葉と似てゐるが、ただ小薊よりも大きいだけで、葉は旁翁葉に似て小さく厚く、兩邊に刺があつて人を刺す。花は紫色だ』とある。現に越州から提出した圖に描いてあるものが相類する。藥肆の商品にもやはり數種あり、粗惡品と精良品との判別がなかなか六か敷いので、一般の醫師は節毎に斷れ、

皮に黄皺あるものを眞の續斷としてゐる。

穀曰く、凡そこれを用ゐるに、草茅根さうぼうこんを用ゐてはならぬ。眞によく似てゐるが、ために誤つて服すれば身體の筋を軟かにするものだ。

時珍曰く、續斷に關する説は一定しない。桐君は『蔓生で葉が荏じんに似てゐる』と



〔斷〕

〔續〕

いひ、李當之、范汪は共に『虎藟のことだ』といひ、日華子は『大藟、一名山牛蒡さんじやうぼうのことだ』といひ、蘇恭、蘇頌はいづれも『葉は苧麻に、根は大藟に似てゐる』といふ。

なる獨立の一條を掲げてあるのであつて、いづれも正確な憑據ひんきよとすることは頗る困難だ。但し漢時代以來、久しい間大藟を續斷と言ひ傳ひて來たのである。けれども

その實物に就いて推究するに、兩蘇氏の言ふ所と桐君の説とは大體合致がっししてゐるやうだ。正しいものと見てよからう。今一般に用ゐられてゐるものは、州中から來る

(○)金陵本亦州三作
ル、然下毛州ハ川ノ
誤カハト必セテ
川中トハ今ノ四川省
ノ地ヲ指ス。

もので、色赤くして瘦せ、折れば烟塵の發するものを良しとしてある。鄭樵の通志に『范汪の所説のものは南續斷だ』とあるが、何を根據にしたものか判らない。蓋し川續斷に對して區別したものだらう。

根
修
治

根 修 治 穀曰く、凡そ採取したならば、根を横に切つて判み、又、内部に向つてゐる硬筋（こうしん）を取り去り、一伏時の間酒に浸し、焙乾して薬用に入れる。

氣味

【氣味】【苦し、微溫にして毒なし】別錄に曰く、辛し。普曰く、神農、雷公、黃帝、李當之は苦し、毒なしといひ、扁鵲は辛し、毒なしといふ。之才曰く、地黃が使となる。雷丸を惡む。

主 治

【主治】傷寒に不足を補ふ。金瘡、癰瘍、折跌に筋骨を續く。婦人の乳難。久しく服すれば氣力を益す【本經】婦人の崩中漏血、金瘡血の内漏。痛を止め、驢肉を生ずる。及び跪傷惡血、腰痛、關節の緩急【別錄】諸種の溫毒を去り、血脈を通宣する【甄權】氣を助け、五勞、七傷を補し、癥結、瘀血を破り、腫毒、腸風、痔瘻、乳癰、瘰癧、婦人産前後の一切の病、胎漏、子宮冷、面黃、虛腫を消し、小便を締め、泄精、尿血を止める【大明】

(二〇) 劍州ハ金部金、鉛ノ註ヲ見。

發明

時珍曰く、宋の張叔潛祕書が(二〇) 劍州の長官を奉職中、部下に血痢の患者があつて、ある醫師が平胃散一兩に川續斷末二錢半を入れ、二錢づつを水で煎じて服させると癒えた。その後紹興壬子(せうこうじんし)の歲、會稽地方(くわいけい)に痢疾が流行した際、叔潛の子がその方を傳ひてゐて試みたが、往往にして效驗があつたといふ。小兒の下痢にもこれを服するが有效だ。

附方

舊二、新二。

【小便淋瀝りんれき】

生續斷を搗き汁を絞つて服す。即ち馬薊根であ

(二一) 大觀ニ外臺祕要ニ作ル。

る。(二二) 初虞世古今錄驗【妊娠胎動】兩三月では墮胎(たいたい)するものだ。豫めこれを服するが

よし。川續斷を酒に浸し、杜仲を薑汁で炒つて絲を去り、各二兩を末にし、棗肉を

煮爛したものと杵き和して梧子大の丸にし、三十丸づつを米飲で服す。【産後の諸

疾】血運、心悶、煩熱し、厭厭(えんえん)として氣息絶せんとし、心頭が硬く、忽ち寒し忽ち

熱するには、續斷皮一握、水三升を二升に煎じ、三(三)服に分けて、人が(三) 一里歩

行する程の時間を隔てて再服する。この薬は産後垂死(きじく)の危篤を救ふものだ。(子母祕

録) 【打撲傷損】閃肭骨接(せんたつ)には、節骨草の草を搗爛らして罨ふ。立ろに效がある。(衛

(二二) 大觀ニ服ノ下ニ温服ノ二字アリ。
(二三) 大觀ニ二三里トアリ。一里ハ舌ガ六丁ナリ。

生馬簡方)

(一) 牧野云フ、苦芙ヲ以テあざみ屬中ノ *Christum chinense*, *Zarhin. et Champ.*

即チからあざみニ充テシ人アレドモ此處ノ苦芙デハナク同名異物ト思フ、又我邦ニテ之レヲひめあざみニ充テキレド中ラヌ、ソシテ其眞物ハ今能ク判ラス。

(二) 字彙ニ曰ク、吳人中陽秋ニ曰ク、吳人州人ヲ謂テ僮ト爲スト。僮トハ賤稱ナリ。弘景ハ南朝梁ノ人、故ニ長江以北、北朝領域ノ人民ヲ指シテ僮ト稱シタルナリ。

(三) 浙東トハ浙江ノ東部ナイフ。
(四) 食物本草ニ米粉ヲ和シテ餅餌トス、其色青翠トアリ。

苦 芙

音は模(アウ)である。(別錄下品)

和名 米 詳
學名 米 詳
科名 きく科(菊科)

釋 名

鉤芙(爾雅)

苦板

時珍曰く、凡そ物の穉いものを芙といふ。この物は嫩葉のうちに食し得るのでかく名けたのだ。

集 解

弘景曰く、苦芙は處處にある。(三) 僮人は莖を取つて生で食ふ。

保昇曰く、所在の下濕の地にある。莖は圓くして刺がなく。生で食し得るもので、子は貓薊のやうだ。五月五日に苗を採つて暴乾する。

恭曰く、今一般に、これを漏蘆といふは誤だ。

時珍曰く、爾雅に鉤芙とあるはこの苦芙のことで『芙は、大さ拇指ほどで中が空になり、莖の端に薊に似た臺がある。生えただかりのものは食し得る』とある。許慎の説文には『江南地方では、これを食べつて氣を下す』とある。現に(三) 浙東地方では、清明節にその嫩苗を採つて食ひ、一年間瘡疥が生ぜぬといつてゐる。また搗汁を(四) 米に和して食品とするが、色清く、久しきに互つて腐敗しない。造化指南に

(五) 爐火家ハ丹石家ノコト、仙術ヲ脩ムル人。
(六) 極、大觀ニ甚ニ作ル。

(一) 牧野云フ、單州湯盧正品ト見テ下ノ學者之レニ加ヘタ、此種ハ北ハ西比



〔苦〕 是「苦板は、大なるものを苦藉と名ける。葉は地黃のやうで味が苦

い。芽生えた當時は白毛があり、

〔笑〕 夏に入つて毛のある莖が抽出で、

白くして甚だ繁つた花を開き、細

い實を結ぶ。花、實のないものは地膽草と名けるもので、汁は膽のやうに苦い。處處の濕地にある。(五) 爐火家が用ゐる材料だ』とある。

苗 氣味

〔苦し、微寒にして毒なし〕

主治

〔顔面、全身の漆瘡には、

灰に焼いて傅ける。また生で食ふもよし〕別錄〕〔焼灰は金瘡を療ずるに(六) 極めて效

驗がある〕弘景〕〔丹毒を治す〕大明〕〔煎じた湯で痔を洗へば甚だ效驗がある〕〔汪頤〕

〔氣を下し、熱を解す〕〔時珍〕

漏 盧 (本經上品)

和名 ひこたい、又、るりひこたい
學名 *Echinops alatus*, Fisch.
科名 きく科(菊科)

利レ亞ヨササ那ナ經テ
南ハ我レ日本ニマテ分
布シ我レ邦ニテハ九州
ニ之レテ見ル、葉ノ
裏面白ク乾ケバ葉面
黒クナル。

(一) 喬山、弘景ハ上
郡ニ在リトイフ。
(二) 上郡ハ甘草、淫
羊藿ノ註ナ見ヨ。
(三) 大觀ニ及サ今ニ
作ル。

(四) 胡麻ノ集解ニ弘
景曰ク、細麻ハ即胡
麻ナリトアリ。

釋名

野蘭（本經）

莢蒿（蘇恭）

鬼油麻（日華）

時珍曰く、

屋根の西北の黒

い處を漏といひ、凡そ物の黒色なるを盧といふ。この草は秋後に黒くなるところが他の多くの草と異つてゐるので、漏盧なる名稱が付けられたのだ。唐韻には腐（ろう）と書いてある。莢が麻のやうなところから、俗に鬼油麻と呼ぶ。

集解

別錄（一）に曰く、漏盧は（二）喬山（喬山）の山谷に生ずる。八月根を採つて陰乾する。

弘景曰く、喬山とは黃帝を葬つた處（はうむ）を指すものと思ふ。それならば（三）上郡（じやうけん）に在る山だ。（四）及び近道からも出る。商人は苗を取つて用ゐ、俗間では根を取つて鹿驪根（ろくりこん）と名け、苦酒に磨つて瘡疥の治療に用ゐる。

恭曰く、この藥は俗に莢蒿と名ける。

莖、葉は白蒿に似たもので、花は黄色で

（五）細麻（さいま）の莢（さか）に似て太さ箸ほどの長い莢を

生ずる四五瓣の花だ。七八月以後には皆黒くなるところが他の多くの草と異なる點



〔盧 漏 州 單〕

（さ）山南ハ唐ノ十道
ノ一、山南道サイフ。
今ノ湖北省大江以北
漢水以西、陝西省終
南山以南、河南省北
嶺以南、四州省劍閣
以東、大江以南ノ地
ニシテ、荆、襄、鄧、唐
隨、郢、復、均、房、峽、
歸、夔、萬、忠、梁、洋、
金、商、鳳、興、利、閬、
開、果、合、渝、涪、渠、
蓬、嶼、巴、通、集ノ三
十三ヲ統ヅ。
（七）蘭山曰、今按今
人以下十五字大觀本
無之此乃論飛塵之漏
蘆者而非此漏蘆也引
在此者恐非。
（八）江寧府ハ茅草類
當歸ノ註ヲ見ヨ。
（九）上條ハ山草類入
露ノ註ヲ見ヨ。

で、蒿類の草である。通常はその莖、葉、及び子を用ゐる。根を用ゐた事實はさだ
見ない。鹿麝と稱するその物は、（六）山南で謂ふ木藜蘆のことだ。有毒のもので、漏



〔盧 漏 州 汭〕

盧ではない。（七）今は一般に苦苣に似
た馬薊を漏蘆といつてゐるが、これ
も誤りだ。

志曰く、別本に『漏蘆は莖の太さ
箸ほど、高さ四五尺、子の房は油麻
の房に似て小さい』とある。江東地
方ではその苗を取つて用ゐるが、功

力は根に勝る。（八）江寧、及び（九）上黨のものが佳い。陶氏は『鹿麝だ』といひ、蘇氏
は『木藜蘆だ』といふが、皆違ふ。漏蘆は自ら別種のものだ。

藏器曰く、南方では一般に苗を用ゐる、北方諸地では根を用ゐる。これは茱萸の樹
のやうに樹になつて生え、高さ二三尺ある。有毒のもので、蠱を殺す。山間の住民
は瘡疥を洗ふに用ゐる。

（一〇）曹州ハ春秋ノ曹國ノ地ニシテ後魏ニ西兗州トナシ、北齊ニ曹州ニ改ム。今ノ山東省曹州府ソノ地ナリ。

（一一）兗州ハ石部雲母ノ註ヲ見ヨ。

（一二）汴東ハ山草類赤箭天麻ノ註ヲ見ヨ。

（一三）秦州ハ石部石膽ノ註ヲ見ヨ。

（一四）海州ハ石部齒石類食鹽ノ註ヲ見ヨ。

（一五）大觀ニ花字上有英ノ二字アリ。

（一六）白莢端ニ生ズハ大觀ニ從フ。

（一七）單州ハ秦ノ單父縣ノ地ニシテ、後唐ニ單州トナス。今ノ山東省單縣ノ地ナリ。

（一八）沂州ハ石部馬薊ノ註ヲ見ヨ。

保昇曰く、葉が角蒿に似たものだ。現に（一〇）曹州、（一一）兗州の下濕の處に最も多い。六月、七月に莖を採つて日光で乾す。他の草に比して黒いものだ。大明曰く、花も苗も用ゐ得る。形態、竝に氣味は乾牛蒡に似たもので、莖の頭端に白花子を著ける。

頌曰く、今は（一二）汴東の州郡、及び（一三）秦、（一四）海州いづれにもある。舊説に、莖、葉



〔盧 海 州 秦〕

は白蒿に似たもので、（一五）花は黃白で（一六）莢端に生じ、莖の太さは箸ほど、房は油麻に類して小さいとしてあるが、現に諸州から集つた實寫圖を見るに、（一七）單州のものだけがやや類似してゐるが、（一八）沂州のものは花、葉が頗る牡丹に似てゐる。秦州のものは、

花が單葉の寒菊に似た紫色で、五六箇が同一幹に生えてゐる。海州のものは、花が紫碧色で單葉の蓮花のやう、花萼の下、及び根の旁を白茸が裹む。根は蔓青の

（二）光天觀ニハ黑乾ノ
間ニ中有黑脈日ノ五
字アリ。

やうで細く、また葱に類して本が黒い。淮^{わい}地方^{ちう}の田舎では老翁花と呼ぶ。この三州の産は、花は別だけれども葉は頗る相類し、秦、海州のものだけは葉が更に鉅齒^{きよしやう}状をなしてゐる。一物にしてかやうに甚しい異同があるのだから、醫家は何れを用ゐ



〔海 州 漏 盧〕

てよいか適從するところが無いわけだが、やはり舊説に依つて、單州から出るものを比較的的安全なりとする外はあるまい。又、本草に『飛廉^{ひれん}、一名漏盧^{れいりょ}、苦^く芙^ふと相類し、根は生では肉が白く皮が^二丸^一黒く、乾けば黒くなつて玄參^{げんじん}のやうだ。七八月に花を採つて陰乾して用ゐる』とあつて、この所説は、秦州、海州から提出した圖の漏盧と、花、葉、及び根が頗る相近い。けれども彼の地では漏盧といふだけで、一名飛廉とはいはない。數^{かず}曰く、眞に漏盧に似た一種の草があるが、その草は味苦く酸く、誤つて服すれば吐して止まぬ。

(二〇) 閩中ハ今ノ福建
省ノ地ナリ。

時珍曰く、按ずるに、沈存中の筆談に『現に方家で用ゐる漏蘆は飛廉のことだ。飛廉は一名漏蘆といひ、苗は苦苣に似て根が牛蒡のやう、綿頭のものがこれである。採つて根を用ゐる』とある。現に(二一)閩中で漏蘆といつてゐるものは、莖が油麻のやうで高さ六七尺、秋深く枯れて漆のやうに黒くなる。用ゐるには苗を採る。これが眞の漏蘆だ。その他は飛廉の條に記載する。

根 苗

修 治

斆曰く、凡そ漏蘆を採つたならば、細かに剉んで生甘草と相對して拌ぜ、午前十時から午後四時まで蒸し、漏蘆だけを揀り出して晒し乾して用ゐる。

氣 味

【(二二) 鹹し、寒にして毒なし】別錄に曰く、大寒なり。藏器曰く、毒あり。

杲曰く、毒なし。足の陽明本經の藥である。【(二三) 之才曰く、連翹が使となる。】

主 治

【皮膚の熱(二四) 毒。惡瘡、疽痔、濕痺。乳汁を下す。久しく服すれば、身を軽くし、氣を益し、耳目を聰明にし、老衰せず、天年を延べる】(本經) 【遺尿を止める。熱氣瘡痒の麻豆の如くなるものには、湯にして浴するがよし】(別錄) 【小腸を通ずる。泄精、尿血、腸風、風赤眼、小兒の壯熱。撲損に筋骨を續ぐ。乳癰、瘰

癰。金瘡には血を止め、膿を排し、血を補ひ、肉を長じ、經脈を通ずる」(大明)

發明

弘景曰く、この藥は、久しく服すれば甚だ人體に益あるものだが、服食方に用ゐられることは稀である。近道に産するものは、ただ瘡疥を療するのみだ。商人は皆苗を取つて商品とする。

時珍曰く、漏盧は、乳汁を下し、熱毒を消し、膿を排し、血を止め、肌を生じ、蟲を殺すものである。故に東垣は、これを手、足の陽明の藥とした。然るに古方では、癰疽發背を治するに漏盧湯を以て首たる藥と稱された。龐安常の傷寒論には、癰疽の治療、及び時行痘疹熱の豫防に漏盧葉を用ゐて『この物がないときは山梔子を以て代用する』といつてあるが、これはやはりその性寒にしてよく熱を解する點を取つたもので、蓋し、漏盧が能く陽明に入るものと云ふことは解らなかつたのだ。

附方

舊二、新六。

【腹中の蛭蟲】漏盧末方寸匕を餅臛に和して服す。(外臺秘要)

(二) 無辜ハ疳病。

(二五) 大觀ニ煮上ニ以水ノ二字アリ。

【小兒の無辜】疳病で肚脹し、或は時に泄痢し、冷熱不調なるには、漏盧一兩を杵いて散にし、一錢づつを猪肝一兩に鹽少量を入れたものと共に(二五)煮熟し、空心に一時に食ふ。(聖惠方) 【冷勞泄痢】漏盧一兩、艾葉を炒つて四兩を末にし、米醋三

（二六）蛇退ハ蛇ノヌケ
ガウ。

升にその藥末の一半を入れて共に熬膏し、それに残りの末を和して梧子大の丸にし、三十丸づつを溫水で服す。〔聖濟總錄〕 【産後の帶下】方は上に同じ。【乳汁不下】乃ち氣脈の壅塞に因るものだ。又、經絡の凝滯^{ぎようたい}、乳内の脹痛、不純物の蓄積で成つた癰を治するには、左の藥を服すれば自然に内消する。漏蘆二兩半、^{（二六）}蛇退十條を炙き焦し、瓜蒌十箇を焼いて性を存し、末にして二錢づつを溫酒で調へて服し、良久して熱羹湯^{ねつかうとう}を飲む。通ずるを度とする。〔和劑方〕 【歷節風痛】筋脈の拘攣^{こうれん}するには、古聖散——漏蘆を麩で炒つて半兩、地龍を土を去つて炒つて半兩を末にし、生薑二兩から取つた汁に蜜三兩を入れて共に煎じ、三五沸して好酒五合に入れ、その汁三盃で先の末藥一錢を調へて溫服する。〔聖濟總錄〕 【一切の癰疽^{ようそ}】發背疽の初發二日、ただ熱證だけのものには、漏蘆湯を服するがよい。毒を退け、膿を下す。乃ち宣熱拔毒の藥劑だ。熱が退けば服用を止める。白茸のある漏蘆、連翹、生黃芪、沈香各一兩、生粉草半兩、大黃を微し炒つて一兩を細末にし、二錢づつを姜棗湯^{きやうそうたう}で調へて飲下す。〔李迅癰疽集驗方〕 【白禿頭瘡】五月に採つた漏蘆草の燒灰を豬膏に和して塗る。〔聖濟總錄〕

(一) 牧野云フ、植物名實圖考ニ圖ガアルガ、ソレハ決シテヒレアミ *Carduus crispus*, L.) デルナク、或ル一ノ宿根生ノ薊科植物デアルガ、私ハ *Scirpus* 屬ノ一種デハナイカト想像スル。ソシテ我日本ニハ無論此草ハナイ。我邦從來ノ學者ハ飛廉ヲヒレアミニ充テキルガヒレアミハ一年生ノ草本デ集解ニアル様ニ正月ニ根ヲ採リ得ルモノデハナイ。故ニ私ハ之レヲ否定スル。ソシテ植物名實圖考卷ノ十一ノ小薊ノ圖ガ即チヒレアミデアルガ、然カシ之レチ小薊ニ充テテアルノハ正確チ缺イデキル。

飛廉 (本經上品)

和名 無し
學名 *Artemisia sp.* (C)
科名 きく科 (菊科)

釋名

漏盧 (別錄)

木禾 (別錄)

飛雉 (同上)

飛輕 (同)

伏兔 (同)

伏豬

(同) 天薺 (同)

時珍曰く、飛廉とは神禽の名であつて、その鳥の形狀は、身が鹿

で豹の文があり、頭が雀、尾が蛇で角があり、よく風氣を左右するものだといふ。

この草は、莖に箭羽のやうな皮が浮き立つてゐて、やはり風邪を療ずるものだ。それで飛廉、飛雉、飛輕など諸種の名稱を呼ばれるのだ。

集解

別錄に曰く、飛廉は河内の川澤に生ずる。正月根を採り、七月、八月

花を採つて陰乾する。弘景曰く、處處にある。苦菜に似てただ葉に切れ込みが多

く、葉の下方が莖に附著し、軽く皮が浮き上つて箭羽のやうに見える、花は紫色のもの

のだ。一般醫方には殆ど用ゐないが、道家では、枝、莖を服して長生を得るものと

し、又、神枕の方に入れる。今は別に漏盧なる植物が既にある以上、これを漏盧と呼ぶは一の別名に過ぎない。

恭曰く、この物に兩種ある。一種は平澤中に生ずるもので、陶氏所説のそのものだ。一種は山岡上に生ずるもので、葉は頗る似てゐるが、切れ込みがなくて毛が多く、莖は赤くして羽が無い。根は直下に伸びて更に旁根が生えず、肉は白く皮が黒く、中に黒脈があり、乾けば玄參のやうに黒くなる。莖、葉、及び根を用ゐて瘡蝕を療じ、蟲を殺すに有效だ。平澤に生ずるものと同様の效驗がある。今は一般に、苦芙に似た馬薊を漏盧といつてゐるが、いづれも眞物でない。

保昇曰く、葉は苦芙に、莖は軟羽に似て、花は紫色、子に白い毛がある。所在の平澤に皆あるもので、五月、六月に採つて日光で乾す。

敷曰く、凡そこれを用ゐる場合に赤脂蔓を用ゐてはならぬ。赤脂蔓は飛廉の形狀と似てゐるが、ただ赤脂蔓は酒に遇へば色が血のやうになる。それで明に識別が付く。

頤曰く、現に秦州から提出した圖の漏盧は、花が單葉の寒菊に似て色が紫だ。五七枝が同一幹から出てゐる。海州の圖の漏盧は、花が紫碧色で單葉の蓮花のやうに見え、花萼の下、及び根の旁を白茸が裏んでゐて、根の色は黒く、蔓青のやうで細

い。又、葱本に類似してゐる。陶氏、蘇氏所説の飛廉と近いが、しかし彼の産地ではただ漏盧とのみ呼んでゐる。當今の醫家も稀に飛廉を使ふといふことだが、果して正確なものとは思はれない。

時珍曰く、飛廉はやはり蒿類の植物だ。蘇頌の圖經では、海州提出の圖の漏盧が

飛廉であらうと疑問の中に入れてあ

る。沈存中の筆談にも、やはり「飛廉

の根は牛蒡のやうで綿頭だ」とある。

古方の漏盧散の説明には『白茸あるものを
用ゐる』とある。して見ると、こ



〔廉〕

の白茸あるものが乃ち飛廉なることに疑ない。今右の二物に就て検討するに、氣味、功用共に相違くない。通用して差閼はないものと見える。或は一類に數種あるもので、古と今の稱呼と産地とに依つてそれぞれの異を生じたものではあるまいかと思ふ。

根及花

修治

穀曰く、凡そ根を用ゐるには、先づ粗皮を刮り去つて細か

に杵き、一夜苦酒に拌せて置いて漉出し、日光で乾かして細かに杵いて用ゐる。

氣味

【苦し、平にして毒なし】 權曰く、苦く鹹し、毒あり。之才曰く、烏

頭と配合するが良し。麻黄を忌む。

主治

【骨節の熱で脛が重く酸疼するもの。久しく服すれば身體を軽くする】

(本經) 【頭眩、頂重、皮間の邪風で蜂螫の針で刺されたやうに覺え、魚子が細かに

吹き出たやうな熱瘡、癰疽、痔、濕痺。風邪欬嗽を止め、乳汁を下す。久しく服す

れば、氣を益し、目を明にし、老衰せぬ。煮てもよし、乾いたものを用ゐてもよし】

(別錄) 【留血に主效があり、疳蝕を療じ、蟲を殺す】 蘇恭 【小兒の疳痢には、散に

して(二)漿水で服すれば大效がある】 蕭炳 【頭風旋運を治す】 (時珍)

發明

時珍曰く、葛洪抱朴子の書に『飛廉を單服すれば、身體を輕くし、天

年を延べる』とあり、又『飛廉煎を服すれば、遠距離の道を疾行し得て力が通常の

數倍になる』とある。本經や別錄に列記したところもやはり良藥としてあるのだが、

後世では何故かこれを用ゐることを知らない。

附方

舊一。

【疳蝕蝕口】及び下部の疳腫には、飛廉蒿を灰に焼いて搗き篩

(二) 漿水、大觀ニヨ
ル

ひ、二錢匕を患部へ著ける。痛んでも忍ぶがよし。若し痛まぬものならば疳ではないのだ。馬尾の太さほどの下部の蟲が、相纏あひこはつて無數に出るものである。十日で蝕瘡は癒え、二十日で平常の健康に復する。(千金翼方)

(一) 苧 麻 (別録下品)

和名 からむし、又、まか
學名 Boehmeria nivea, Hook. et Arn.
科名 いらくさ科(苧麻科)

釋名

時珍曰く、苧麻ちんまは紵ちんとも書く。積紵(うみを)にするものだから紵といふのだ。凡そ麻絲は、細いものを經せといひ、粗きものを紵ちんといふ。

陶弘景曰く、苧ちんとは今の績苧麻のことだ。麻の字は苧に従ひ麻に従ふ。麻は派と發音する。屋下の麻まを形容したものだ。苧は掩と發音する。

集解

頌曰く、苧麻は、舊本には産出する地方の州郡を記載してないが、今は閩、蜀、江浙地方に多くあつて、皮を剥ぎ、績つむいで布に織り得るものだ。苗は高さ七八尺、葉は楮葉のやうで叉さがなく、表面は青く背面が白くして短毛がある。夏、秋の間に細穂の青花を開く。根は黄白で輕虚だ。二月、八月採收する。按ずるに、

(一) 牧野云フ、此苧麻ノ中ニハ多分所謂「ラミー」(Ricea or Ramie) モ一緒ニナツテ居ル事ト思フガ之レハ其一變種デア
ル、苧麻ハ洋人ハ China-grass ト稱スル。

（一）荆揚トハ湖北、湖南以東長江沿流一帶ヲ指ス。

陸機の草木疏に『苧は一科に數十莖生え、舊根が土中に在つて、春になると自から生える。故に種を蒔いて栽培する必要はない。』（二）荆、揚地方では一年に三回刈取り、處處の園圃で栽培するものは一年に二回刈取る。刈つて竹で剝げば、その表面の厚い部分が自から脱去して、内部の筋のやうな部分だけが残る。それを煮て布に積み績ぐ材料とする』とある。現に江浙、閩中ではやはりその通りにしてゐる。

宗奭曰く、苧は苧麻のやうなもので、花は白楊のやうで長く穂になり、一朶毎に凡そ數十穂あつて青白色だ。



〔麻 苧〕

時珍曰く、苧とは家苧のことだ。

また山苧といふがある。それは野生の苧のことだ。また紫苧といふは葉の表面の紫なもの、白苧といふは葉の表面が青いもので、いづれも裏面の白いものだ。これは刮り洗つて煮て食へる、凶作の饑饉を救ふ食糧となるもので、味の甘美なものだ。子の色は茶褐色で、九月採收して二月に蒔き付ける。また舊根

からも自から生えるものだ。

根 氣味

【甘し、寒にして毒なし】 權曰く、甘し、平なり。大明曰く、甘し、滑冷にして毒なし。

主治

【胎を安ずる。熱丹毒に貼る】(別錄) 【心膈の熱、漏胎下血、産前後の心煩、天行熱疾で大渴し大狂するもの、金石藥を服して心の熱するものを治す。毒箭、蛇蟲の咬傷を罨ふ】(大明) 【瀉芋汁は消渴を止める】(別錄)

發明

震亨曰く、芋根は、大いによく陰を補し、滯血を行るに効果があるが、醫方の藥としては、價も安くつゝ、ぬものとして一向に用ゐてゐないやうだ。

藏器曰く、芋の性は血を破るものだ。芋麻を産婦の枕に用ゐると血運が止まる。

産後の腹痛には芋を腹の上へ置けば止まる。又、蠶に咬まれて毒が肉に入つた場合には、芋汁を取つて飲む。今世間で、芋の子を蠶種に近ければ蠶が生れぬといふはこの關係からいふのである。

附方

舊四、新七。【痰哮喘嗽】

芋根を煨いて性を存して末にし、生豆腐に三五

錢をつけて食へば效がある。なほ瘡えぬときは、肥豬肉二三片につけて食ふ。甚だ

(三) 瀉芋汁ハ芋麻皮
ヲ浸漬シタル水。

(四) 大觀ニハ芋ノ字
ナシ。

（五）五淋ハ氣淋、血淋、石淋、膏淋、勞淋是ナリ。

妙である。（醫學正傳）【小便不通】聖惠方では、麻根、蛤粉かふん半兩を末にし、二錢づつを

空心に新汲水で服す。○摘玄方では、苧根を洗つて研り、絹布へのして少腹から陰

際まで貼れば須臾にして通ずる。【小便血淋けつりん】苧根の煎湯を頻りに服するが大いに

妙である。また諸淋を治す。（聖惠方）【五種ごしゆの淋疾】苧麻根二本を打ち碎き、水一

盃半で半盃に煎じて頓服する。直ちに通じて大いに妙である。（斗門方）【妊娠胎動】

突然膠にかうのやうな黄汁、或は小豆汁の如きものを下し、腹痛忍び難きには、苧根を黒

皮を去り、切つて二升、銀一斤、水九升を四升に煮取り、その水一升づつに酒半升

を入れて一升到煎じ、二回に分服する。ある方では銀を用ゐない。（梅師方）【肛門こうもんの

腫痛】生苧の根を搗き爛らしてそれに坐るがよし。（瀕湖集簡方）【脱肛だつこうの收まらぬも

の】苧根を搗き爛らし、湯に煎じて熏じ洗ふ。（聖惠方）【癰疽發背】まだ形を成さぬ

初期には、苧根を熟搗して上に傅け、晝夜數回易へれば腫が退いて瘡かさえる。（綱目本草）

【五色丹毒】苧根を煮た濃汁で一日三回づつ浴する。（外臺秘要）【雞、魚の骨哽こつこう】談

野翁試驗方では、苧麻根の搗汁を匙ですくつて上から灌ぐ。立ろに效がある。○醫

方大成では、野苧麻根を搗き碎いて、龍眼大の丸にし、魚骨をたてた時は魚湯で服

し、雞骨をたてた時は雞湯で服す。

葉 氣 味

根に同じ。

主 治

【金瘡、傷折の出血、瘀血】（時珍）

發 明

時珍曰く、苧麻葉は甚だ血を散ずるものだ。五月五日に採收し、石灰に和して搗いて團にし、晒し乾して貯へ、金瘡、折損の場合に、それを研末して傅ければ即時に血が止まり、且つ痂を付け易い。按ずるに、李仲南の永類方に『凡そ諸傷瘀血の散ぜぬには、五六月に野苧葉、蘇葉を取つて搗り爛らし、金瘡にはその上に傅け、瘀血が腹内に在るには、順流水で絞つてその汁を服す。直ちに通じて血は皆水に化す。それは生豬血に試みると明かな應驗がある。秋、冬は乾いた葉を用ゐるもよし』とある。

附 方

新三。

【驟然たる水瀉】晝夜止まずして死せんとするには、男、女に拘

はらず、五月五日に採つて陰乾した麻葉を末にし、二錢づつを冷水で調へて服す。

熱い物を食へば悶倒するから食つてはならぬ。ただ冷えた物のみを食はねばなら

ぬ。小兒には半錢を用ゐる。（楊子建護命方）【冷痢白凍】方は上に同じ。【蛇虺の咬傷】

青麻の嫩頭の搗汁と酒を等分に和して三盞を服し、その渣を傅ければ毒は瘻中から

出る。渣は水中に棄てても散らぬものだ。その渣を取つて傷處を見ると、竅のあるときは雄蛇に咬まれたもの、竅の無いときは雌蛇に咬まれたものである。針で傷處をつき破り、竅をあけて藥を傳ける。(摘玄方)

(二) 苘 麻

苘、音は頃(ケイ)である。(唐本草)

和名 いちび
學名 *Molition Avicennae, Gaertn.*
科名 あふひ科(錦葵科)

釋名

白麻

時珍曰く、苘(けい)の字は一に頃(けい)とも書き、また露(けい)とも書く。栽培するには、必ず連(れん)頃(けい)に種(たね)えるものだから頃(けい)といふのだ。

集解

恭曰く、苘、即ち蒺藜(けいり)であつて、今世間で皮を取つて布や繩(なは)にする。實は大麻子に似たものだ。九月、十月に採つて陰乾する。

頌曰く、處處にあるもので、北國地方では、これを栽培して布を績(つむ)ぎ繩(なは)に絢(た)ふ。

苗は高さ四五尺から六七尺、葉は苧(しよ)に似て薄く、花は黄色、實の殻は蜀葵のやうで中の子は黒色だ。

時珍曰く、苧麻とは現今いふ所の白麻のことだ。卑濕の場處に多く生え、一般に

(一) 牧野云フ、苧麻ハいちびアアルガ今一種國ニヨリいちびト稱スルモノガアアルノデ之レヲ混ゼヌヤウニセネバナラヌ、ソレハつなセト云フモノデ黃麻ノ漢名ガアル、學名ハ *Cochlospermum capslaris*, L. デシなのき科(田麻科)ニ屬スル一年草デアアル。
(二) 頃ハ四百畝ヲ云フ、廣キ畑ニ作ルヲ云フ。



〔麻 苘〕

栽培もする。葉は大きく、桐葉に似て圓くして尖がある。六七月に黄色の花を開く。實は半磨の形のやうで齒があり、嫩わかいうちは青く、老おろれば黒くなり、中の子は扁たく黒く、形狀は黃葵子のやうだ。

莖は輕虚で潔白である。北國地方では皮を取つて麻にし、莖には硫黄をつけて焙燈わいとう(つけぎ)に作る。火を引くこと甚だ速なものだ。子の嫩わかいうちは小兒がよく食ふ。

實 氣味

【苦し、平にして毒なし】

主治

【赤、白の冷、熱痢には、炒

つて研末して蜜湯で一錢を服す。癰腫ようしゅの頭なきには一箇を吞む】(蘇恭) 【眼翳、瘰肉ろうじくに主效があり、倒睫たうせつ、拳毛けんまうを起す】(時珍)

根 主治

【やはり痢を治す。古方に用ゐてある】(蘇頌)

附 方

新二。

【一切の眼疾】苘麻子一升を末にし、批開した獺豬肝ふんちようかんにつけて炙

熟し、幾度もその末が盡くるまでつけて炙き、それを更に末にし、一日三回、一字づつを陳米飲で服す。(聖濟總錄) 【目の翳膜】久しく癒えぬには、柳木で作つた磨り

白に鱗^{けいとう}質を入れて殻を去り、馬尾の篩で焦殻を去つて黃肉を取る。實十兩で四兩を得る。かくせねば殻が取れぬものだ。それを薄く切つた豬肝にまぶして慢火^{まんくわ}で炙熟し、末にし醋で和して梧子大の丸にし、三十丸つづを白湯で服す。ある方では、鱗質を袋に入れて蒸熟して暴し、末にして蜜で丸にし、溫水で服す。(聖濟總錄)

大 青 (別錄中品)

和名 まきばくおぎ
學名 *Cloroladron cyrtophyllum, Turcz.*
科名 くまのつら科(馬鞭草科)

釋 名

時珍曰く、莖も葉も皆深青色だから名けたものだ。

集 解

別錄に曰く、大青は三四月に莖を採つて陰乾する。弘景曰く、今は東方地方、及び二邊道に産する。莖は紫で長さ一尺ばかりのものだ。莖、葉いづれも用ゐる。

頤曰く、今は江東の州郡、及び(一)荆南、(二)眉、(三)蜀、(四)濠の諸州いづれにも有る。

春生えて莖は青紫色だ。石竹に似た苗、葉である。花は紅紫色で馬蓼^{ばれう}に似てゐるが、芫花^{げんけい}にも似てゐる。根は黃色だ。三月、四月に莖、葉を採つて陰乾して用ゐる。

(一)大觀ニ邊道ヲ近道ニ作ル。邊道、即チ國境附近ナリ。
(二)荆南トハ今ノ湖北省南部ノ地方ヲ指ス。
(三)眉州ハ山草類狗脊ノ註ヲ見ヨ。
(四)蜀州ハ宋ニ置キ晉源縣等ノ四縣ヲ領ス。今ノ四川省成都府ノ西、崇慶縣ソノ舊治ナリ。
(五)濠州ハ石部滑石ノ註ヲ見ヨ。大觀ニ濠ノ下ニ濠ノ字アリ。



〔青〕

時珍曰く、處處に有る。高さは二三尺、莖は圓く、葉の長さは三四寸で、

表面は青く背面が淡く、節に對ひ合つて生える。八月紅色の簇つた小花を開

き、青い椒實の顆ほどの實を結び、九

月には色が赤くなる。

莖葉

氣味

〔苦し、大寒にして毒なし〕權曰く、甘し。時珍曰く、甘く

微し鹹し、苦くはない。

主治

〔時氣、頭痛、大熱、口瘡〕別錄〔時行熱毒を除くに甚だ良し〕弘景

〔溫疫寒熱を治す〕甄權

〔熱毒風で心の煩悶するもの、渴疾で口の乾くもの、小兒

の身熱疾、風癰、及び金石藥の毒を治す。腫毒に塗擦する〕大明〔熱毒痢、黃疸、

喉痺、丹毒に主效がある〕時珍

發明

頌曰く、古方に、傷寒の黃汗、黃疸を治する大青湯といふがあり、又、傷寒で頭部、身體が強ばり、腰、脊の痛むを治する葛根湯の中にも大青を用ゐてあ

る。概して時疾に多く用ゐるものだ。

時珍曰く、大青は、氣は寒、味は微苦鹹であつて、能く心、胃の熱毒を解す。特に傷寒を治するだけのものではない。朱肱の活人書に、傷寒で赤斑を發して煩痛するを治する藥に、犀角大青湯、大青四物湯がある。故に、李象先の指掌賦にも『陽毒に罹れば狂斑し煩亂する。大青、升麻を以て困篤を回らすがよし』といったのだ。

【附方】

新五。

【喉風、喉痺】大青葉の搗汁を灌ぎ、反應があれば止める。(衛生

易簡方)

【小兒の口瘡】大青十八銖、黃連十二銖、水三升を一升到煮取り、一日二回

に服して瘡えるを度とする。(千金方)

【熱病下痢】衰弱して危篤なるには、大青湯――

大青四兩、甘草、赤石脂三兩、膠二兩、豉八合、水一斗を三升到煮取り、三回到

分服する。二劑に過ぎずして瘡える。(肘後方)

【熱病發斑】斑が赤色を呈して煩痛す

るには、大青四物湯――大青一兩、阿膠、甘草各二錢半、豉二合を三服に分け、一

服を水一盞半で一盞に煎じ、膠を入れて煮溶して服す。○又、犀角大青湯――大青

七錢半、犀角二錢半、梔子十箇、豉二撮を二服に分け、一服を水一盞半で八分に煎

じて温服する（南陽活人書）
 【肚皮の青黒】小兒が突然肚皮に青黒色を呈するは、血氣が營養を失つて風寒がそれに乘じた險惡な證候である。大青を末にして口中に納れ、酒で送下する（保幼大千方）

（二）小 青（宋 圖 經）

和名 未詳
 學名 未詳
 科名 未詳

（一）牧野云フ、本書ノ小青ハ私ハ其植物ヲ云フ事ガ出来ヌ。植物名實圖考ニ小青ノ名アル植物ニツアツテ、其一ツハやぶかうじ（*Ardisia Japonica*, Bl.）又其一ハ不明ノ樹デアルガ、此等ハ恐ラク本書ノ小青デハナイト思フ。其外小青ハ種ノ植物ノ名トナツテ居レドモ、此處ノ小青ハ其レ等ノモノデハナト考ヘテ、（一）福州ハ石部崗石類食鹽ノ註ヲ見ヨ。

集 解 頌曰く、小青は福州に生ずる。三月に花が咲く。彼の地では生えた月の中に葉を採つて用ゐる。

葉 氣 味

（缺）

主 治

【生で搗いて癰腫、瘡癤に傅ければ甚だ效がある】

（藥 類）

【血痢腹痛を治す。研つて汁を服すれば蛇毒を解す】（時珍）

附 方

新二。

【蛇虺の螫傷】

衛生易簡方では、小青一握を細研し、香白芷半兩



小 青

を入れて酒で調へて服す。手で患部を揉んで見て、黄水が出れば効果があつたのだ。
 摘玄方では、小青、大青、牛膝葉を共に

搗き、その汁を酒に和して服し、渣を忠部へ傳ける。【暑に中つた發昏】小青葉を井水に浸して泥を去つて控乾し、沙糖を入れて搗つて汁を急に灌ぎ込む。(壽域方)

胡盧巴 (宋嘉祐)

和名 ころは
學名 *Trigonotis foenum-graecum*, L.
科名 まめ科(莢科)

釋名 苦豆

集解

禹錫曰く、胡盧巴は廣州、并に黔州に産する。春苗が生え、夏子を結び、子は細い莢になる。秋季に入つて採收する。今一般に嶺南のものを多く用ゐてゐる。或は外國の蘿蔔の子だともいふが、果して然りや否や判然せぬ。

頤曰く。今は廣州から出る。或は、この種は南洋の諸外國から出るものだ。蓋しその國の蘆朮の子であつて、海外貿易商人がその種を持つて來て嶺外地方へ蒔いて見ると、生えることは生えたが、しかし外國から來るものほど精良なわけに行かなかつたといふことだ。現今の醫家は、元臟の虛冷を治するに必要な藥としてあるが、唐時代以前の方には用ゐてない。本草にも記載してなかつたところを見ると、

(一) 牧野云フ、南歐并ニ亞細亞ノ原産ノ一年草デ、濃臭ガアル。藥用トシテ處處ニ栽培セラルル、種名ノ *Foenun-graecum* ト希臘乾草ノ意デアアル。
(二) 黔州ハ石部丹砂ノ註ヲ見ヨ。

元臟ハ腎臟。

(四) 木村康(口ク、
(成分) ツリゴネリン
及脂肪油等 (W. T.
314)

(五) 膀胱氣ハ膀胱氣
痛ノ略ニシテ、痙攣
ヲ指スモノナラン。

(六) 大觀ニ熱ヲ熱ニ
作ル之ニ從フ。

近代に及んで發見されたものと見える。

修治

時珍曰く、凡そ藥に入れるには、淘淨して酒に一夜浸し、晒し乾し、蒸熟し、或は炒つて用ゐる。

氣味

【苦し、大溫にして毒なし】 呆曰く、純陽である。【主治】 【元臟

の虛冷の氣。附子、硫黃と配合すれば、腎虛の冷腹脹滿、顔色の青黒なるものを治す。懷香子、桃仁と配合すれば、膀胱の氣を治するに甚だ效がある。【冷氣痛、寒濕脚氣を治し、右腎を益し、丹田を暖める】 (時珍)



胡

盧

巴

發明

宗奭曰く、膀胱氣に此

れを用ゐるには、桃仁を麩で炒つたも

の等分と合せて末にし、その半は散に

し、その半は酒糊で和して梧子大の丸

にし、五七十九づつを空心に鹽酒で服

し、散の方は丸藥と互に時間を隔てて熱米湯で空心に服す。一日に各一二回づ

つ服す。

時珍曰く、胡盧巴ころはは右腎命門の藥であつて、元陽が不足して冷氣が潛伏するため、歸元の作用が不可能になつたものに適するものだ。宋の惠民和劑局方にある胡盧巴丸は、大人、小兒の小腸の奔豚、偏墜、及び小腹に卵のやうなものがあつて、上下に走痛して忍ぶべからざるものを治す。胡盧巴八錢、茴香六錢、巴戟はげきを心を去り、川烏頭を炮いて皮を去り各二錢、棟實れんじつを核を去つて四錢、吳茱萸五錢を用ゐ、いづれも炒つて末にし、酒糊で梧子大の丸にし、十五丸づつを服す。小兒は五丸を鹽酒で服す。太醫の薛己は『寒疝で陰囊腫痛の一患者に、五苓諸藥を服させて效がなかつたが、この藥を與へると平復した』といひ、又、張子和の儒門事親には『眼病で視力を失つた一患者は、苦豆、即ち胡盧巴を食ひたがり、頻頻と缺かさず食つたが、一箇年未滿にして、目中に蟲が歩いて背に入るやうな微痛を覺え、漸次に視力が明かになつて平癒した』とある。按ずるに、これ等の例もやはり命門を益する功果の現はれであつて、所謂の火の原を益して陰翳を消する關係である。

附方

新六。

【小腸の氣痛】胡盧巴を炒つて研末し、每服二錢を茴香酒で服

す。(直指方)

【腎臟の虛冷】腹脇ふくわき脹滿ふくらみするには、胡盧巴を炒つて二兩、熟附子、硫黃

各七錢五分を末にし、酒で煮た麴糊で梧桐子大の丸にし、鹽湯で三四十丸づつを服す。（聖濟總錄）【冷氣疝瘕】胡盧巴を酒に浸して晒し乾し、蕎麥を炒つて研つた麴と

各四兩、小茴香一兩を末にして酒糊で梧子大の丸にし、毎服五十丸を空心に鹽湯、或は鹽酒で服す。これを二箇月間繼續して、大便後に白膿が出れば病は根絶する。

（方廣心法附餘）【陰癰腫痛】偏墜、或は小腸疝氣、下元が虚冷して久しく癒えぬものに

主效ある沈香内消丸——沈香、木香各半兩、胡盧巴を酒に浸して炒り、小茴香を炒つて各二兩を末にし、酒糊で梧子大の丸にして五七十丸づつを鹽酒で服す。【氣

攻頭痛】胡盧巴を炒り、三稜を酒に浸し焙じて各半兩、乾薑を炮いて二錢半を末にし、薑湯、或は溫酒で二錢づつを服す。（濟生方）【寒濕脚氣】腿膝疼痛して歩行に力

なきには、胡盧巴を酒に一夜浸して焙じ、破故紙を香しく炒つて各四兩を末にし、

木瓜の頂端を切つて瓢を取り去つた中へその末藥を充滿し、先に切つた頂端で蓋をし、蓋の落ちぬやうに簍くしで止めて蒸し爛らし、搗いて梧子大の丸にし、毎服七十丸を空心に溫酒で服す。（楊氏家藏方）

(一) 牧野云フ、此種ハ我が邦ニハ野生ハ無イガ滿洲方面ニ在ッテハ極メテ普通ノ草デアル、往時支那カラ渡ッタモノ今邦内ノ諸處ニ見ラル、葉ガネズレテ居ルカラにちあやめノ名ガアル。

(二) 仲冬ハ陰曆十一月。

(三) 寛大觀ニナシト雖モ脱字ナリ依テ之ヲ加フ。

(一) 蠡 實 (本經中品)

和名 ねぢあやめ
學名 *Iris ensata*, Thunb. var. *chinensis*, Maxim.
科名 あやめ科(鳶尾科)

釋 名

荔實 別錄) 馬蘭子 唐本) 馬櫟子 圖經) 馬薤 禮記注) 馬蒂 爾雅) 鐵掃帚 救荒) 劇草 本經) 旱蒲 禮記) 豕首 本經) 三堅 弘景曰く、醫方の藥には用ゐない。俗間では識らないものだ。しかし天名精にもやはり豕首なる名稱がある。

恭曰く、これは馬蘭の子のことだ。月令に『仲冬、荔挺出す』とあつて、鄭玄の註に『荔は馬薤なり。通俗文には、一名馬蘭といひ、本草には、荔實といふ』とある。

頌曰く、馬蘭子と、北方では訛つて馬櫟子といふ。廣雅には『馬薤は荔なり』とあり、高誘は『荔挺出すとは、荔草が挺出(ぬきでる)することだ』といつてある。禮記の學者がそれを識らずして『荔挺』と讀み、又、馬薤とも書くが、いづれも誤だ。馬薤とはまた豚耳とも名けるもので、馬薤 薤のことだ。

（四）江字正字通ニ據ル。

（五）河東ハ山草類廿草ノ註ヲ見ヨ。

（六）鼎州ハ山草類石蒜ノ註ヲ見ヨ。澧州

ハ石部石鍾乳ノ註ヲ見ヨ。汴ハ芳草類薺

黃ノ汴部ノ註參照。

時珍曰く、爾雅に『莽は音瓶。馬帚なり』とあつて、これは荔草のことだ。そのものが馬の刷毛を作る材料となるからかく謂つたもので、現に江南や江北地方で鐵掃帚と呼ぶものがそれである。

集解

別錄に曰く、薺實は（五）河東の川谷に生ずる。五月實を採つて陰乾する。頌曰く、今は陝西の諸郡、及び（六）鼎、澧州にもあり、汴の附近に就中多い。葉は



〔實 薺〕
——蘭 馬——

薺に似て長く厚く、三月紫碧色の花を開き、五月實を結ぶ。實は麻子ほどの角子となつて、赤色で稜がある。根は細長く、全體に黃色だ。世人はそれを採つて刷毛に作る。三月花を、五月實を採つて陰乾して用ゐる。許慎の説文に『荔は蒲に似て小さく、根は刷毛に

なる』とあり、高誘は『河北の平澤に率ねこれを生ずる』といつてある。河東では、よく庭園や階砌などに多く種ゑて、旱蒲と呼んでゐるが、實は馬薺なのだ。

時珍曰く、蠶草は荒野中に生じ、地に就いて叢生する。一本が二三十葉になり、苗の高さは三四尺、葉の叢中から莖が抽出で花を開き實を結ぶ。

正誤

宗奭曰く、蠶實に就いて、陶隱居は『醫方の薬には用ゐない。俗間では識らないものだ』といつてある。本草に注した諸家の説は合致しない。若し果してこれが馬蘭だとすれば、日華子本草の説は當を得ない。更にまた『蔬菜にして食へる』とあるが、一體馬蘭の葉は土中から出た時から硬く、また無味なものだ。牛馬さへ食はぬ。人間の食へやうわけがあらうか。此には、蠶實を馬蘭に當てることは敢てしない。更に博識な人の研究に俟つ。

時珍曰く、別録には、蠶實を蠶實とも名けてあるのから見ると、蠶と書いたのは荔の字の訛なのだ。張揖の廣雅に『荔、また馬蘭と名ける』とある。その説は已に明だ。又按ずるに、周憲王の救荒本草に『その嫩苗は味苦い。よく煮熟し、水を換へ浸して苦味を去り、油、鹽で味を付ければ食へる』とある。これで見れば、馬蘭もやはり食料となるわけだ。寇氏は、ただ陶氏の説のみに據つて疑を挿んだが、それは研究が徹底しない。薬には陶氏の識らぬものが多いのだ。今その誤を正して

置く。

實 修 治 時珍曰く、凡そ藥用には炒つて用ゐる。疝を治するには醋を拌ぜて炒る。

氣 味 【甘し、平にして毒なし】保昇曰く、寒なり。頤曰く、山間の住民はこれを服して『大溫にして甚だ奇效がある』といふ。

主 治 【皮膚の寒熱、胃中の熱氣、風寒濕痺。筋骨を堅くし、食慾を進ませ、久しく服すれば身を軽くする】（本經） 【心の煩滿を止め、大、小便を利し、臍膚を長じ、肥大ならしめる】（別錄） 【金瘡血の内流、癰腫を療ずるに效がある】（蘇恭） 【婦人の血氣煩悶、産後の血運、并に經水不止、崩中帶下。一切の瘡癰を消し、鼻衄、吐血を止め、小腸を通じ、酒毒を消し、黃病を治し、葶の毒を殺す。蛇蟲の咬傷に傅ける】（大明） 【小腹の疝痛、腹内の冷積、水痢諸病を治す】（時珍）

附 方 舊二、新六。 【諸冷極病】醫療の治し難きものには、馬蘭子九升を洗淨し、一日三回、空腹に一合づつを酒で服す。（千金方） 【寒疝諸疾】寒疝で食事不能のもの、及び腹内一切の諸病に用ゐ、食物を消化し、肌を肥えしめる。馬蘭子一升を

用ゐ。毎日一把を取つて麴を拌ぜ、煮て吞む。一升を服し盡せば癒える。(姚僧坦集驗方) 【喉痺腫痛】衛生易簡方では、蠶質一合、升麻五分、水一升を三合に煎じて蜜少量を入れ、よく攪きまぜて少しづつ吞み込む。大いに效驗がある。○聖惠方では、馬蘭子二升、升麻一兩を末にし、蜜で丸にして水で一錢を服す。○またある方では、馬蘭子八錢、牛蒡子六錢を末にし、空心に方寸匕を溫水で服す。【水痢のあらゆる病】張文仲備急方では、馬蘭子、六月六日の麴かを熬つて各等分を末にし、空心に方寸匕を米飲で服す。もし六月六日の麴がなければ普通の麴でもよし、また牛骨灰でもよし。○又ある方では、馬蘭子、乾薑、黃連各等分を散にし、二方寸匕を熟湯で服す。藥が腹に入れば直ちに痢を斷止し、冷、熱いづれも治す。嘗て用ゐて神效を擧げた。輕視してはならない。豬肉、冷水を忌む。【腸風下血】疔瘡こつちふそがあつて破れたものは治せぬ。馬蘭子一斤を研り破り、夏は三日、冬は七日間酒に浸して晒し乾かし、何首烏半斤、雄黃、雌黃各四兩を末にし、先に藥を浸した酒で作つた糊で梧子大の丸にし、一日三回、三十丸づつを溫酒で服すれば效が現はれる。(普濟方)

花 薑 及び根 葉

主治

【白蟲を去る】(本經)

【喉痺を療ず。多く服すれば

澹泄する】(判錄)【癰疽惡瘡に主效がある】(時珍)

發明

頌曰く、蠡草は花も實も藥に入れる。列仙傳に『寇先生は宋の人で、好んで荔を栽培し、その葩と實を食つた』とあるがそれである。

時珍曰く、按ずるに、葉水東の日記に『北方の農民は、胸、腹の飽脹を患ふ時は馬棘花を取つて涼水に搗つて服す。數回通じが付いて平癒する』とある。これに據つて見ると、多く服すれば泄するの説は事實であつて、蠡實が馬蘭であることも更に疑ひない。

附方

舊三、新六。【睡死して寤めぬもの】蠡實根一握を杵き爛らし、水で絞つ

て汁を少しづつ徐ろに灌ぐ。(外臺祕要) 【喉痺口噤】馬蘭花二兩、蔓荊子一兩を末に

し、溫水で一錢を服す。【喉痺腫痛】喘息して死せんとするには、外臺祕要では、

馬蘭根、葉二兩、水一升半を一盞に煮取り、少しづつ飲めば立ちに癒える。○聖

恵方では、根の搗汁三合、蜜一合を慢火で熬り、一日五七回、徐徐に點ける。ある

方では、單に汁を飲み、口噤するものには灌ぎ下す。生の物がないときは刷毛を煎

じてその汁を用ゐる。【沙石熱淋】馬蘭花七箇を燒き、古筆頭十四箇を燒き、粟米

(七)大觀ニ飲チ喫ニ
作ル。

一合を炒つて末にし、一日二回、三錢づつを酒で服す。これを通神散と名ける。【小便不通】馬蘭花を炒り、茴香うゐきやうを炒り、葶藶ていれきを炒つて末にし、二錢づつを酒で服す。

【十便真方】一切の癰疽おんしゅ發背惡瘡。鐵掃帚を松毛、牛膝と共に水で煎じて服す。〔乾

坤生意〕【顏面の癰癧はんえん】鐵掃帚の葉、并に子の自然に地上に落ちたものを湯に煎じ、

數回頻りに洗へば自消する。〔壽域神方〕【面皰めんほう、鼻皰びさ】馬蘭子の花を杵いて傳けるが

佳し。〔肘後方〕

附錄 必似勒（拾遺）藏器曰く、辛し、溫にして毒なし。冷氣れき胸閉で消せ

ぬもの、心腹脹滿に主效がある。崑崙こんろんに生ずるもので、その形狀は馬蘭子に似てゐる。

惡實（別錄中品）

和名 こばう
學名 *Artium Lappula*, L.
科名 きく科（菊科）

釋名

鼠粘（別錄） 牛蒡（別錄） 大力子（綱目） 葶翁菜（綱目） 便牽牛（綱

目） 蝙蝠刺 時珍曰く、その實の形狀が悪くして、刺鉤しこうが多いものだから呼んだ名

（ハ）胸、大觀ニ胃ニ
作ル。消下ニ食字
アリ。

（一）牧野云フ、此ニ
惡實ノ下ニ其植物ノ
名稱ヲ入レタガ實ハ
此惡實ハ其頭狀花ヲ
指シタモノデ俗ニ言
ヘバこばうのみデア
ル、本品ニハ又別ニ
Lappula officinalis,
ALL.ノ學名モアル。

(三) 魯山、次ノ蘇恭
説ノ如ク當時ハ鄧州
ノ管ドニ屬ス。河南
省汝州府ニ今尚ホ魯
山縣アリ。

稱だ。根も葉も皆食料になり、一般には牛菜と呼び、方術家では、隱語で大力と呼び、賤俗の間では便牽牛べんけんぎゅうといひ、河南地方では夜叉頭やしゃとうと呼ぶ。

頤曰く、實の殻に刺が多く、鼠がその上を走ると忽ち粘り付いて脱れなくなる。それで鼠粘子そねんしと謂ふので、やはり羊負來などと同じ名稱だ。

集解 別錄に曰く、惡實は(三)魯山の平澤に生ずる。

恭曰く、魯山は鄧州とうしゅうの東北に在る。この草は、葉が大きくて芋の葉ほどあり、子

殻は栗の形狀に似たもので、實は細長く、荒蔚きうぶのやうだ。

頤曰く、惡實、即ち牛蒡の子だ。處

處にある。葉は芋の葉ほどの大さで長く、實は葡萄の核に似て褐色だ。外殻は栗のいがに似て小さく、指頭ほどの



〔實 惡〕
——蒡 牛——

もので刺が多い。根は極めて大なるものがあつて、菜にして食へば健康を益する。秋後に子を探つて藥に入れる。

(一) 灼ハ字書ニ音灼
 漬水ノ聲トアリ、灼
 洵ハ水ヲ以テ洗滌ス
 ルコト。
 (二) 脯ハ乾シタル食
 物。
 (三) 楓楸ハ楓樹ノ果
 實。

(四) 黧、説文ニ淺青
 黑色也トアリ。

(五) 木村(康)曰ク、
 歐米ニ於テモ民間藥
 トシテ根ヲ淨血、利
 尿ノ效アリトシ利尿
 劑トシテ或ハ梅毒及
 慢性水銀中毒ニ、又
 毛髮發生促進ニ、又
 松子ヲ加ヘ喀血及肺
 潰瘍ヲ治スルトシテ
 内用セリ、又根ヲ細
 挫シテ骨折痛ニ巻包
 スル時ハ治ス可ク藥
 ハ陳久創傷ニ貼シテ

昨珍曰く、牛蒡は、古代には、肥えた土地に子を蒔いて栽培し、苗を剪取つて(一)
 洵洵して蔬にし、根を取つて煮て曝して(二)脯にしたもので、甚だ健康に益あるもの
 だといつてある。今も世間ではやはり稀に食ふ。三月苗が生え、莖が生え立つて高
 さ三四尺になり、四月淡紫色の叢を成した花を開き、(三)楓楸のやうで小さい實を結
 ぶ。夢上に無數の細刺が簇がり付いて、一棘に數十顆の子がある。根は、太いもの
 は臂ほどになり、長きものは一尺に近く、その色は(四)灰黧色だ。七月子を探り、
 十月根を探る。

子 修 治

穀曰く、凡そ用ゐるには、揀り淨めて酒を拌せて蒸し、白霜が重
 出するを待つて布で拭ひ去り、焙乾して粉に擣いて用ゐる。

氣 味

【辛し、平にして毒なし】藏器曰く、苦し。元素曰く、辛し、溫な
 り。陽中の陰であり升である。杲曰く、辛し、平なり。陽であり降である。

主 治

【目を明かにし、中を補し、風傷を除く】(別錄) 【風毒腫、諸瘻】(藏器)
 【研末し、酒に浸して毎日二三盞を服すれば、諸風を除き、丹石の毒を去り、腰、
 脚を利す。又、熟し揉んで食前に三箇を吞めば、諸種の結節、筋骨煩熱の毒を散す】

可ナリト。

成分ハイメリン（四五％）脂肪油等ヲ含有ス。

U. S. D. 1458.

A. T. P. 62 (1890)

152; 69 (1897) 416.

(七) 大觀ニ研ナ末ニ作ル。

(八) 風水ハ身軀浮腫
シ骨節疼痛アルモノ。

(九) 大觀ニハニ作ル

（竇權）「一箇を吞めば癰疽に頭が出る」（蘇恭）「炒り（モ）研つて煎じて飲めば小便を通

利する」（孟詵）「肺を潤ほし、氣を散じ、咽喉（もつめ）を利し、皮膚の風を去り、十二經を通

ず」（元素）「斑疹の毒を消す」（時珍）

發 明

呆曰く、鼠粘子の應用に四種ある。風濕癰疹、咽喉風熱を治し、諸腫、瘡瘍の毒を散じ、凝滯腰膝の氣を利するがそれである。

附 方

舊五、新十一。

【風水身腫】裂けるほど腫れたるには、鼠粘子二兩を炒

つて研末し、一日三回、溫水で二錢づつを服す。（聖惠方）【風熱浮腫】咽喉が閉塞す

る。牛蒡子一合を半生半熟にして末にし、熱酒で一寸匕を服す。（經驗方）【痰厥頭痛】

牛蒡子を炒り、旋覆花と等分を末にし、一日二回、一錢づつを臘茶清で服す。（聖惠

方）【腫に連る頭痛】鼠粘子、石膏等分を末にし、茶清で調へて服す。（醫方摘要）【咽

膈不利】風雍涎唾（せきたん）を疏通する。牛蒡子を微し炒り、荊芥穗と各一兩、炙甘草半兩を

末にし、食後に湯で二錢を服し、緩やかに效を取る。（寇氏本草衍義）【懸癰喉痛】風熱

が上部を犯し搏つものだ。惠實（けいじつ）を炒り、甘草を生で等分を水で煎じて含嚥する。こ

れを啓關散と名ける（普濟方）【喉痺腫痛】牛蒡子六分、馬蘭子（ばらんし）六分を散にし、一

（二）大觀ニ外臺祕要
ニ作ル。

（二）幼ハ初ノ誤、氏
ハ世ノ誤。

（二）水蠱ハ水鼓ト通
ズ、腹大變ノ如キヲ
云フ。

日二回、空心に方寸匕を溫水で服し、同時に牛蒡子三兩、鹽二兩を研りまぜて炒熱し、包んで喉の外部を熨す。（廣濟方）
 【咽喉痘疹】牛蒡子二錢、桔梗一錢半、粉甘草節七分を水で煎じて服す。（痘疹要訣）
 【風熱癰疹】牛蒡子を炒り、浮萍と等分を用ゐ、薄荷湯で二錢を服す。一日二回。（幼虞氏古今錄驗）
 【風齩牙痛】鼠粘子を炒つて水で煎じ、含嗽してその水を吐く。（延年方）
 【小兒の痘瘡】適痘が發生せんとすると氣分惡く、壯熱し、狂躁し、咽喉壅塞し、大便祕澀するもの、小兒の咽喉が腫れて利せぬものに用ゐる。大便の通利するものは服んではならぬ。牛蒡子を炒つて一錢二分、荊芥穗二分、甘草節四分、水一盞を共に七分に煎じて溫服する。已に發出したのも服むがよし。必勝散と名ける。（和劑局方）
 【婦人の吹乳】鼠粘二錢、麝香少量を溫酒で少しづつ吞み下す（袖珍方）
 【便癰腫痛】鼠粘子二錢を炒つて研末し、蜜一匙、朴硝一匙を入れて空心に溫酒で服す（袖珍方）
 【蛇、蝎、蠱毒】大力子の煮汁を服す。（衛生易簡方）
 【水蠱の腹大】惡實を微し炒つて一兩を末にし、麪糊で梧子大の丸にして十丸づつを米飲で服す。（張文仲方）
 【歷節腫痛】風熱が攻めて手指が赤く腫れ、麻木し、甚しきは肩背、兩膝を攻め、暑熱に遇へば大便が祕塞する。牛

莠子三兩、新豆豉しんづしを炒り、羌活と各一兩を末にし、毎服二錢を白湯で服す。(本事方)

根 莖

【氣 味】

【苦し、寒にして毒なし】 權曰く、甘し、平なり。藏器曰く、根は蒸熟し暴乾して用ゐねばならぬ。さなくば吐き氣を催ほすものだ。

主 治

【傷寒寒熱で汗の出るもの、中風で顔の腫れるもの、消渴で中が熱し、水を欲するもの。久しく服すれば、身體を軽くし、衰老を防ぐ】(別錄) 【根は牙齒の痛み、勞瘡らうそう、諸風で脚の緩弱なるもの、風毒、癰疽、疥癩、傷肺、肺壅、疝瘕はんが、冷氣積血に主效がある】(蘇恭) 【根を酒に浸して服すれば、風、及び惡瘡を去る。葉に和し搗き碎いて杖瘡、金瘡に傅ける。永く風を畏れない】(藏器) 【顔面の煩悶、四肢の不健に主效があり、十二經脈を通じ、五臓の惡氣を洗ふ。菜にして常に食へば身體を軽くする】(甄權) 【根を切り、豆、麪を拌せて飯にして食へば、脹壅を消し、莖、葉の煮汁を浴湯にすれば、皮間の習習として蟲が歩くやうに覺ゆるを去る。鹽花を入れ生で搗いて一切の腫毒に搗る】(孟詵)

發 明

頤曰く、根は肺にして食ふが甚だ良し。莖、葉は煮汁で酒を釀して服するがよし。冬季に根を採り、蒸し暴して藥に入れる。劉禹錫の傳信方に「暴中風

（二）荆ハ牡荆。

（二）四一頓ハ一人分。

（二）五大觀ニ令ヲ尉ニ作ル。

を療するに、緊つて細い牛蒡根を風に當てぬやうにして採り、竹刀、或は（二）荆刀で土を刮り去つて生布で拭き淨め、搗いて絞汁一大升を取り、好き蜜四大合を和し、温めて二回に分服する。汗が出て瘥える。この方は岳鄂の鄭中丞から傳授したもので、鄭氏は曾て熱肉を（二）四一頓食つて暴風に中つたとき、潁陽の（二）五令であつた外甥の盧氏が此の方を知つてゐて、それを服せると即時に瘥えた』とある。

附方

舊五、新十六。

【時氣の餘熱】退かずして煩燥し、發渴し、四肢に力無く、飲食不能なるには、牛蒡根の搗汁一小盞を服するが有效である。（聖惠方）

【天行時疾】生牛蒡根の搗汁五合を空腹に二回に分服し、服し終つてから桑葉一把を取つて黄に炙り、水一升で五合に煮て頓服し、汗を取る。葉がなければ枝を用ゐる。（孫

真人食忌）

【熱攻心煩】恍惚たるには、牛蒡根の搗汁一升を食後二回に分服する。（孫

心鏡）

【傷寒の搖搦】發汗後完全に覆はなかつたために、腰、背、手、足に搖搦を起し

たるには、牛蒡根散が主效がある。牛蒡根十條、麻黃、牛膝、天南星各六錢を剉み、盆の中で研細して好酒一升と共に研り、新布で汁を絞り取り、一箇の地坑を掘つて中を炭火半秤で赤く焼き、掃き淨めてその中に藥汁を傾け入れ、再び黒色に燒いて

取出して乳鉢で細研し、一日三回、一錢づつを溫酒で服す。(朱監活人書) 【一切の風

疾】十年、二十年の永き病には、牛蒡根一升、生地黃、枸杞子、牛膝各三升を袋に

入れて無灰酒三升の中へ浸し、意のままにそれを飲む。(外臺秘要方) 【老人の中風】口、

目が動かず、煩悶し、不安なるには、牛蒡根を切つて一升を皮を去り、晒し乾して

杵いて麪にし、白米四合を淘り淨めた中に和して餗飪にし、豉汁に入れて煮て葱、

椒、五味を加へて空心に食ふ。常服すれば極めて效がある。(壽親養老書) 【老人の風

濕】久痺、筋攣、骨痛にこれを服すれば、腎を壯にし、皮毛を潤ほし、氣力を益す、

牛蒡根一升を切り、生地黃一升を切り、大豆二升を炒り、これを絹袋に入れて一斗

の酒に五六日間浸し、一日二回、性に任せて空心に二三盞を溫服する。(集驗方) 【頭

部、面部の卒然の腫れ】熱毒風氣の内攻で、或は手、足に連つて赤腫し、少し觸れ

ても痛むものである。牛蒡子の根、一名蝙蝠刺を洗淨して研り爛らし、酒で煎じて

膏にし、絹にのして腫處に貼り、一二匙を熱酒で服す。腫が消し、痛が減ずる。(斗

門方) 【頭風の掣痛】禁へ難きには、磨膏にして用ゐるが主效がある。牛蒡の莖、葉を

搗いて濃汁二升を取り、無灰酒一升、鹽花一匙頭を入れて、塘火で膏に煎稠し、痛

を塘火で埋み火。

(七)白屑ハ白癬屑ノ
コト、和名フケ。

處へ摩擦する。風毒は白から散ずる。摩擦する時は、極力熱くなるやうにして效を取る。冬季には莖、葉の代りに根を用ゐる。(簍中方)【頭風(ニ)白屑(ハ)】牛蒡葉の搗汁を熬稠して塗り、一夜明けて皂莢水(モウケツスイ)で洗ひ去る。(聖惠方)【喉中の熱腫】鼠粘根一升、水五升を一升到煎じて三回に分服する。(延年方)【小兒の咽腫】牛蒡根の搗汁を少しづつ嚙む。(普濟方)【熱毒牙痛】熱毒風が頭部、面部を攻め、齒齦(コギン)が腫痛して忍び難きには、牛蒡根一斤の搗汁に鹽花一錢を入れ、銀器中で熬膏して齒齦下に塗る。重きものも三回以内で瘥える。(聖惠方)【項下の癭疾(オウシツ)】鼠粘子根一升、水三升を一升半に煮取り、三回に分服する。或は末を蜜で丸にして常服する。(救急方)【耳の突然の腫痛】牛蒡根を切つて絞つた汁二升を銀鍋で熬膏(オウコウ)して塗る。(聖濟總錄)【小便不通】臍腹急痛するには、牛蒡葉汁、生地黃汁各二合をよく和して蜜二合を入れ、一合づつに水半盞を入れて煎じて三五沸し、滑石末一錢を調へて服す。(聖濟總錄)【癰子腫毒】鼠粘子葉を貼る。(千金方)【石瘻の出膿】堅く實して寒熱するには、鼠粘子葉を末にし、雞子白に和して封ずる。(外臺秘要)【諸瘡腫毒】牛蒡根三本を洗つて煮爛し、それを搗いた汁に米を入れ、粥を煮て一椀を食ふが甚だ良し。(普濟方)【積年の惡瘡】反花

瘡漏瘡の瘡えぬには、牛蒡根を臘月の豬脂と搗きまぜて日毎に封する〔千金方〕
 『月經不通』結して癥塊ちゆうくわいとなり、腹、肋が脹大して死せんとするには、牛蒡根二斤を剉
 んで三回蒸し、生絹の袋に盛つて酒二斗の中に五日間浸し、毎食前に一盞づつ溫服
 する〔普濟方〕

（二）葉 耳（本經中品）

和名 なつもの
 學名 Xanthium Strumarium, L.
 科名 きく科（菊科）

（一）牧野云フ、其植物上ノ形態上カラ觀テ葉耳ハ實ニきく科中デ異彩ヲ放ツタモノデアリ、其花部ノ缺憾ハ普通ノきく科品トハ大ニ趣チ異ニシテ居ル。

（一）葉、大觀ニ葉ニ律りつ。

釋名 胡葉 本經 常思（弘景） 蒼耳 爾雅 卷耳 詩經 爵耳 詩疏 猪

耳（綱目） 耳璫 詩疏 地葵（本經） 薺 音は施（シ）である。羊負來（弘景） 道人

頭（圖經） 進賢榮 記事珠 唱起草（綱目） 野茄（綱目） 縑絲草 頌曰く、詩人は

これを卷耳けんじといひ、爾雅にこれを蒼耳そうじといひ、廣雅にこれを葉耳はしといふ。いづれも

實に對する命名だ。陸機の詩疏に『その實は宛あたかも婦人の耳璫のやうなものだ。現に

或は耳璫草とも謂ふ』といひ、鄭康成は『これは白胡はくこ菜さいのことで、幽州地方で爵

耳と呼ぶものだ』といひ、博物志には『洛中のある者が羊を驅つて蜀へ往つて來た

とき、刺の多い胡荽子が羊の毛に粘り付いたまま中國まで來たことがある。それで羊負來と名けたのだ』とある。俗に道人頭とも呼ぶ。

弘景曰く、江北の鄙賤の者共は 皆これを常思菜と謂つて食ふ。葉で麥を覆ふて黄衣を作る。醫方に用ゐることは甚だ稀だ。

時珍曰く、その葉の形が菜麻のやうでもあり、茄のやうでもあるところから、菜耳とか野茄とかいふ諸名がある。その味が滑して葵のやうだから、地葵と名けて地膚と同じ名を呼ばれる。詩人の思夫賦に卷耳の章があるので、それに因んで常思菜といふ。張揖の廣雅には常菜とあるが、やはり意味は通じる。

集解

別錄に曰く、菜耳は安陸の川谷、及び大安の田野に生ずる。實を熟した時に採收する。

(四) 安陸ハ春秋ノ鄭國ノ地ナリ。漢ニ縣ヲ置ク、今ノ湖北省安陸縣ノ地ニ故城在リ。
(五) 大觀ニ大安チ六安ニ作ル、從フベシ。六安ハ今ノ安徽省六安縣ノ地ナリ。
(六) 茹ハ菜ニ同シ。

頌曰く、今は處處にある。陸氏の詩疏に『葉は青白くして胡荽に似てゐる。花は白い。莖は細くして蔓生する。煮て茹にすれば食物にもなるが、滑かで味が少い。四月中にさながら婦人の耳瑠のやうな子になる』とあり。郭璞は『形は鼠耳のやうだ。叢生して盤のやうになる』といひ、今あるものは皆これに類してゐるが、しか

し蔓生にはなつてゐない。

時珍曰く、按ずるに、周憲王の救荒本草に『蒼耳は、葉は青白くして粘糊菜の葉に類し、秋季中に桑椹さうじのやうで短小な刺の多い實を結ぶ。嫩苗を煮熟し水に浸して淘たうり拌ぜれば食物にもなり、飢を救ふ糧になる。子は、炒つて皮を去り、麪に研つて焼餅せうへいにして食へる。また熬油は點



〔耳 葉〕
—— 蒼

燈用にもなる』とある。

實 修 治

大明曰く、薬に入れるには、炒熟し、搗いて刺を去つて用ゐ、或は酒を拌せて蒸して用ゐる。

氣 味

【甘し、温にして小毒あり】別錄に曰く、苦し。權曰く、甘し、毒なし。恭曰く、猪肉、馬肉、米泔を忌む。犯せば人體に害がある。

主 治

【風頭寒痛、風濕周痺、四肢の拘攣痛、惡肉、死肌、膝痛。久しく服すれば氣を益す】（藏器）【肝熱を治し、目を明かにする】（甄權）【一切の風氣を治す】（別錄）

（セ）木村（康）曰く、成分ハ澱糖體キサン トツルマリシ（一・二七％）サツカローゼ（三・三二％）キサントスツルミン（樹脂樣物質）等ヲ含有ス。Zander: J. pharm. Z. Russ. 20 (1881) 661. Ber. Chem. Ges. 14 (1881) 2587. W. J. 767. 藥誌六六（明）（二〇）三（八）

（八）藏器ハ本經ノ誤但此諸症中臍痛ハ別錄ニ屬ス。

（凡）大觀ニ疥瘡ヲ疥癬ニ作ル。

し、髓を填充し、腰、脚を暖め、瘰癧、（凡）疥瘡、及び癰瘻を治す【大明】【香しく炒り、酒に浸して服すれば風を去り、補益する】（時珍）

附方

舊三、新四。

【久瘡の瘻をぬもの】蒼耳の子、或は根、莖でもよし、焙じて研末し、酒糊で梧子大の丸にし、一日二回、酒で三十九づつを服す。生の搗汁を

服するもよし。（朱氏集驗方）【大腹水腫】小便の利せぬには、蒼耳子灰、葶藶末等分を一日二回、二錢づつ水で服す。（千金方）【風濕痺痺】一切の風氣には、蒼耳子三兩を二〇〇炒つて末にし、水一升半で七合に煎じ、滓を去つて呷ふ。（食醫心鏡）【牙齒の痛

二〇〇炒、大觀ニ搗ニ作ル。

腫】蒼耳子五升、水一斗を五升到煮取り、熱して含む。冷えれば吐き去つて後にまた含む。一劑を過ごさずして瘥える。莖、葉もよし。或は鹽少量を入れる。（孫真人千金翼）【鼻淵で涕を流すもの】蒼耳子、即ち（けんし）維絲草子（さうし）を炒つて研末し、一二錢づつを

白湯に點て服す。（證治要訣）【眼の昏暗】葉耳實一升を末にし、白米半升と粥にして日毎に食ふ。（普濟方）【酒を嗜んで已まぬもの】（二〇〇）毡（てふ）の中の蒼耳子七箇を灰に焼き、酒に入れて飲めば嗜まなくなる。（陳藏器本草）

二〇〇毡、大觀ニ搗ニ作ル。

莖葉

修治

毀曰く、凡そこれを採取したならば、心を去り、黃精を竹刀

で細かに切り拌ぜ、午前十時から午後十時まで蒸して黄精を出し去り、陰乾して用ゐる。

氣味

【苦く辛し、微寒にして小毒あり】恭曰く、猪肉、馬肉、米泔を忌む。

硃砂たうしゃを伏す

主治

【溪毒】（別錄）【中風、傷寒の頭痛】（孟詵）

【大風、癩癧、頭風、濕痺、

（一）大觀ニ癰ヲ瘍ニ作ル。

（二）大觀ニ成汁ヲ或癰汁ノ三字ニ作ル。

（三）氣字大觀ニ據テ之ヲ加フ。

（四）大觀ニハ酒字ナシ。

（五）藥ハ葉ノ誤ナルベシ。

發明

時珍曰く、蒼耳の（二六）藥は、久しく服すれば風熱を去るに有效だ。猪肉、

毒の骨髓に在るもの、腰、膝の風毒には、夏季に採つて曝し、末にして水で一二ヒを服す。冬季には酒で服す。或は丸にし、一日三回、二三十丸づつを服す。滿百日繼續すれば、病は（二）癰疥のやうになつて外部へ現はれ、（三）汁になつて出る。或は斑が入り交つて癰のやうに重り合ひ、皮が浮き上り、その皮が落ちると臍膚（四）が美しく凝脂のやうになる。また睡りを少くし、諸毒（五）を除き、蟲疳、濕蘞（六）を殺す。久しく服すれば（七）氣を益し、耳、目を聰明にし、身を輕くし、志を強くする。【蘇恭】葉を揉み、舌下へ置いて涎を出せば、目黄で睡を好む病を去る。灰に燒き、臘猪脂（八）に和して丁腫を封ずれば根を出す。【（九）酒で煮て服すれば狂犬の咬毒（一〇）に主效がある】（藏器）

二七 參丹ハ丹毒ノ如キモノ。

及び風邪を最も忌む。犯せば全身に赤丹を發生するものだ。按ずるに、蘇枕良方に「莖耳の根、苗、葉、實を、いづれも洗ひ淨めて陰乾し、灰に焼いて湯で濃汁を取り、それを二箇續きに泥で作つた竈で煉り、一方の竈で煉りながら、その灰汁が耗つたとき傍の釜の中の熱灰湯を移して益すやうにする。かくて一晝夜火を絶たずに搔き廻し、やがて生ずる霜を取つて乾いた養瓶の中に取つて貯へ、毎日朝、夕二錢づつを酒で服す。補煖し、風を去り、顔色の衰ひを防ぎ、就中皮膚の風を治し、皮膚を滑かに清淨ならしめる。入浴毎に少量を浴湯に入れるが尤も佳し。宜州の州學昌從諫は、これを十餘年繼續して服したが、七八十歳に及んでも顔色紅潤、身體輕健だつた。皆この藥の力だ」とある。斗門方には「婦人の血風が腦を攻めて頭旋し、悶絶し、忽ち絶息して打ち倒れ、人事不省となるには、喝起草の嫩心を陰乾し、末にして酒で一大錢を服すれば、その功力に偉大な效驗がある。この物は善く頂門から腦に連つて功力を及ぼすものだ」とある。蓋し喝起草とは蒼耳のことだ。

附方

舊十二、新十六。

【萬應膏】一切の癰疽、發背、無頭惡瘡、腫毒、疔癰、

一切の風痒、腫毒、杖毒、牙疼、喉痺を治す。五月五日に蒼耳の根、葉數擔を採り、

（二）大觀ニ如麻豆粒
ニ作ル。

洗淨し晒らして萎えてから細かに剉み、五箇の大鍋に水を入れて煮爛し、篩で濾過して粗滓を去り、布絹で再び濾してまた淨めた鍋に入れ、始めは武火で煎じたぎらせ、漸次に文火で熬稠して攪き廻しつづつ膏にし、新罐へ入れ封じて貯へる。それを患部へ敷貼すれば直ちに癒える。牙疼には牙の上に敷き、喉痺には舌の上に敷いて、或は二三回嚥み溶かせば效がある。毎日酒で一匙を服するが極めて有效だ。（集簡方）

【一切の風毒】并に三蟲を殺し、腸痔を治し、能く食慾を進める。胃が脹滿し、心悶し、發熱する病にはこれを服するがよい。五月五日の正午に地の際から刈取つた葦耳葉あしじふを洗ひ暴して搗き篩ひ、晝二回、夜三回、方寸匕づつを酒、或は漿水で服す。吐逆を覺える場合は蜜で丸にして服す。その分量は方寸匕の量を用ゐる。風の輕きものは一日に二回服す。若し身體に粟を生じ、或は二八麻豆まづほどのものが出るならば、それは風毒が出るのである。針で刺し潰して黄汁を去れば止む。七月七日、九月九日に採つたものを用ゐるもよし。【一切の風氣】蒼耳の嫩葉一石を切り、麥蘖あきたち五升に和して塊にし、蒿艾かうがいの中に二十日間罨おこみて麴こにし、米一升で飯を炊き、冷暖を加減してその麴三升を入れて醸し、二七日間封じ熟し、それを空心に暖服すれば神驗がある。

此の酒を封ずるには、布を二重にかければよし、密封し過ぎてはならぬ。密にすれば溢れ出るものだ。馬肉、猪肉を忌む。(孟詵食療本草)【諸風の頭運】蒼耳葉を晒し乾して末にし、一日三回、一錢づつを酒で調へて服す。吐くやうならば蜜で梧子大の丸にして二十九づつ服す。十日で全く快癒する。(楊氏經驗方)【血風腦運】方は發明の項にある。【手、足の毒攻】腫れて斷れるほど痛むには、蒼耳の搗汁に漬け、并に滓を傳ければ立ろに效がある。春は心を用ゐ、冬は子を用ゐる。(千金翼)【突然水毒に中りたるもの】初期には頭、日が微痛し、惡寒し、骨節が強急し、日中は醒めて夕刻劇くなり、手、足逆冷し、三日を経過すれば蟲が下部を蝕し、六七日經過すれば膿潰して五臟まで蝕ひ入り、遂には死に至るものである。常思草を搗き、汁を絞つて一二升を服し、并に綿にしめしてその下部を導く。(肘後方)【毒蛇、溪毒】沙虱、射工等の螫傷で、口嚙し、眼黒く、手、足が強直し、毒が腹に内攻すれば塊と成る。手當を猶豫すれば治療の方法がない。蒼耳の嫩苗一握の汁を取り、酒に和して温めて灌ぎ込み、滓を傷處に厚く傳ける。(勝金方)【疫病の豫防】五月五日正午に蒼耳の嫩葉を多く採つて陰乾して貯藏し、時に應じてそれを末にして冷水で二錢を服し、或

（九）大觀錢下ヒノ一
字アリ。

（二〇）大觀ニ百一方ナ
引ク。

は水で煎じて一家舉つて皆服す。能く邪惡を辟ける。（千金方）
【風癢癰疹】ふうさういんしん 身痒止まぬには、蒼耳の莖、葉、子等分を末にし、二（九）錢づつを豆淋酒で調へて服す。（聖惠方）
【顔面の黒斑】蒼耳葉を焙じて末にし、食後に一錢づつを米飲で調へて服す。一箇月で癒える。（摘玄方）
【赤、白汗斑】蒼耳の嫩葉尖こんふせんと青鹽を搗り爛らし、一日五七回塗擦して五六箇月間經てば效がある。（摘玄方）
【大風痼疾】神珍方では、嫩蒼耳、荷葉等分を末にし、一日二回、二錢づつを溫酒で服す。○乾坤生意では、蒼耳の葉を末にし、大楓子油だいふうしゆで和して梧子大の丸にし、一日二回、三四十丸づつを茶湯で服す。○又ある方では、五月五日、或は六月六日の五更に露を帶びた蒼耳草を採り、搗汁を熬つて錠子にして半斤を取り、その藥一錠を、鱧魚れいぎょ一尾を剖開して肝腸を去らずにそのまゝ入れて絲で縫ひ合はせ、酒二盃で煮熟して喫はす。魚を用ゐること三五尾以内で癒える。一百日の間鹽を忌む。【突然に生じた惡瘡】蒼耳、桃皮とうひを屑にして瘡中に納れる（二〇）。
【反花惡瘡】肉が飯粒のやうになつて破れて出血し、破れるに隨つて續出するには、蒼耳葉の搗汁三合を服し、并に一日二回塗る（聖濟總錄）
【一切の丁腫】ていしゆ 洗う曰く、危困せる者には、蒼耳の、根、葉を搗き、童尿に和して汁

(三) 纏喉風ハ實布の
利亞。

を絞り、一日三回、一升づつを冷服すれば根を抜く。甚だ效驗がある。○養生方では、蒼耳の根、苗の焼灰を醋に和して沈澱させて塗り、乾けば再び換へる。十回以内で根を抜き出す。○邵真人方では、蒼耳根三兩半、烏梅肉五箇、葱根を鬚のまま三本、酒二鍾を一鍾に煎じ、熱服して汗を取る。【齒風動痛】蒼耳一握を漿水で煮て鹽を入れて含嗽する。(外臺秘要) 【(三) 纏喉風病】蒼耳根一把、老薑一塊を汁に研り、酒を入れて服す。(聖濟總錄) 【赤目で瘡を生じたるもの】痛むには、道人頭末二兩、乳香一錢を用ゐ、一錢づつを烟に焼いて鼻から嚙ふ。(聖濟總錄) 【鼻衄の止まぬもの】蒼耳の莖、葉の搗汁一小盞を服す。(聖惠方) 【五痔下血】五月五日に採つた蒼耳の莖葉を末にし、水で方寸匕を服すれば甚だ效がある。(千金翼) 【赤、白下痢】蒼耳草を多少に拘はらず洗淨し、水で煮爛して渣を去り、蜜を入れて武火で熬膏し、一二匙づつを白湯で服す。(醫方摘玄) 【産後の諸病】蒼耳葉を搗いて汁を絞り、一日三四回、半中盞づつを溫服する。(聖惠方) 【誤つて銅錢を呑んだとき】蒼耳頭一把を水一升到十餘度浸してその水を飲めば癒える。(肘后方) 【花蜘蛛の毒】その咬毒は毒蛇と異らない。野繭絲、即ち道人頭の搗汁一盞を服し、同時に渣を傳ける。(摘玄方)

花 主 治 【白癩頑癢】（時珍）

（一）牧野云フ、此草ハ極メテ普通ニ我邦ニモ山野ニ見ラルモノデアル。

天 名 精 （本經上品）

和 名 やぶたげ、
學 名 *Carpesium abrotanoides*, L.
科 名 きく科、菊科

校 正

時珍曰く、蘇恭、沈括二氏の説に據つて、唐本の鶴虱、開寶の地菰、別錄有名未用の室松を併せ入る。

釋 名

天蔓菁（別錄） 天門精（別錄） 地菰（唐本） 室松（別錄） 室は地に同

じ。玉門精（別錄） 麥句薑（本經） 蟾蜍蘭（別錄） 罌蓂藍（本經） 蚬蚬草（綱目）

豕首（本經） 兔顧（別錄） 活鹿草（異苑） 劉愷草 愷の發音は胡革の反（カク）であ

る。皺面草（綱目） 母豬芥（綱目） 實を鶴虱と名け、根を杜牛膝と名ける。

恭曰く、天名精、即ち活鹿草であつて、別錄には一名天蔓菁といひ、南方地方で

は地菰と呼ぶが、それは葉が蔓菁、菰菜に類似してゐるからの名稱だ。その味が甘

く辛いところから薑の字を付けた名稱がある。形狀が藍のやうで罌蓂藍がその下に好

んで住むものだから罌蓂藍と名け、香氣が蘭に似てゐるところからまた蟾蜍蘭とも

（二）豕豕ハブタ。

（一）木書食字ナシ。

名ける。

時珍曰く、天名精といふは天蔓青の訛であつて、その臭氣が（三）豕豕のやうだから豕首、豕顛などの名稱がある。昔は活鹿草といつたものだ、その氣が臊いところから、俗間で狐狸臊と轉訛していふがこのものだ。爾雅には『茹藘は豕首なり』とあり、郭璞の注に『江東では猪首と呼ぶ、これを和せて蠶蛹を熬乾せば（四）食へるものだ』とある。

藏器曰く、郭璞が、爾雅の蓬麥に註して『卽ち麥句薑だ』といつたは誤りだ。陶隱居は鉤樟の條に註して『狼牙に似て氣の辛く臭い一種の草がある。名稱は地松といふものだが、世間では劉曄草と呼んでゐる。金瘡に主效がある』といつてある。

（一）青州、宋ニハ今ノ山東省ノ益都、臨淄、壽光、臨朐、博興、樂安、宋ノ千葉ノ六縣ニ統べ、益都ニ治ス。

按ずるに、異苑には『宋の元嘉年間、（四）青州の劉曄が一頭の麋を射止め、五藏を剖いてこの草で塞いで置くと、麋は蹶然として起き上つた。曄が不思議に思つてその草を抜き取ると、麋は再び打ち倒れる。三回試みて三回共同様だつたので、曄は密にこの草に關することを記録して栽培し、折傷の治療に實驗して見ると、なかなか效驗があつた。そこで一般に劉曄草と呼ぶやうになつたのだ』とある。活鹿なる名

稱もあるのだから、正にこの麝の挿話と合致する。陶氏、蘇氏の俱に言ふ地菰なるものは必ず別箇の二物ではないと思ふ。

正誤

弘景曰く、天名精、即ち今の薺きかんのことだ。また薺首ともいふ。夏季に酢汁すじゅうを服すれば熱病を除く。味は至つて苦い。甘いともいふがそれは誤りらしい。

恭曰く、薺首は苦くして臭い。名精は辛くして香しい。全然似も付かぬものだ。

禹錫曰く、蘇恭は『天名精は南方で地菰ぢこもと名けるものだ』といひ、陳藏器はその本草で諸説の混亂を解決したが、やはり天名精を地菰としてある。開寶



〔地菰天名精〕

本草に、地菰の一箇條を重複記載したのは當を缺くものだ。編輯體制上削除すべきものである。

時珍曰く、按ずるに、沈括の筆談に『世間では天名精といふものを知らぬ。それ

(五) 木村(康)曰ク、
村山義胤一植研四
(昭三)一九五ニ説ア
リ。

(六) 平原ハ漢ニ郡ヲ
置ク。戰國ノ趙ノ邑
ナリ。今ノ山東省舊
武定、濟南府ノ西部、
北ハ樂陵ヨリ南ハ長
清ノ諸縣ニ至ル。今
ノ平原縣ニ治ス。
(七) 大觀ニ蔓ヲ燕ニ
作ル。

(八) 又、燕ヲ蔓ニ作
ル。
(九) 山南ハ瀟廬ノ註
ヲ見ヨ。

で妄みだりに地菰くわげんを火炊くわげんだなどと誤認したのだ。本草には、また鶴虱かくしの一條を掲げてあつて、全體がすべて混亂して了つたが、實は地菰、即ち天名精で、その葉は菰、又は蔓菁に似てゐるところから右の二名稱があるのであつて、鶴虱とはその草の實であることを知らぬのだ』とある。又、別錄の有名未用の部にある塞松は、即ちこの地菰のことで、やはり誤つて掲載したものだ。茲にはいづれもその誤を正して一箇條に併載する。

(五) 集 解

別錄に曰く、天名精は平原の川澤に生ずる。五月採收する。

保昇ほせい曰く、地菰のことであつて、小品方には天てん蔓菁とも天てん蕒ぶせいともいつてある。葉は山南地方の菰菜に似たもので、夏、秋の間に條が抽き出る。頗る薄荷に似たもので、花は紫白色だ。味は辛くして香しい。

志し曰く、地菰は所在いづれにもあるものだ。人家や路傍の日陰の土地に生える。高さ二三寸、葉は菰の葉に似て小さい。又曰く、鶴虱は波斯はしに産するものが勝れてゐる。今は上黨にもあるが、その功力藥勢は波斯のものより薄弱だ。

恭こう曰く、鶴虱は西戎せいじふに生ずる。子は蓬蒿子に似て細かい。莖、葉と合せ用ゐる。

(一〇) 衡湖ハ今ノ湖南省衡陽縣附近湖水沿流ノ地方ヲ指ス。

(一一) 巴ハ漢ノ巴郡ノ地、即チ今ノ四川省ノ東部、保寧、順慶、鄭部、雲陽、夔州、太平、南江等ノ地ヲ包ス。
(一二) 負蠶ハ コキムシ

顔曰く、天名精は江湖地方には何處にでもある。形狀は韓保昇の説明の通りだ。

又曰く、鶴虱は江淮^(一〇) 衡湖地方いづれにもある。春苗が生え、葉は皺み、紫蘇に似て大きく、尖が長くて光らない。莖は高さ二尺ばかりのものである。七月に菊に似た黄白の花を開き、八月實を結ぶ。子は極めて尖細で、乾けば黄黒色になる。南方地方ではその葉を火炊と呼んでゐるが、按ずるに、火炊は獮豸^{きわん}のことであつて、花實はよく似てゐるが別種の植物だ。雞へ用ゐてはならない。

時珍曰く、天名精は、嫩苗は綠色で皺葉^{すうたふ}の荳芥に似たものである。微し狐臭があるが、洵り浸して煮ればやはり食物になる。成長すれば莖が立ち、小さい野菊の花のやうな小さい黄色の花を開いて實を結ぶ。實は同蒿子^{ごうかうし}ほどでやはりよく似てゐる。

人の衣服に粘著するものだ。狐臭が尤も甚しいが、炒熟^{せうじゆく}すれば香しくなる。故に諸家いづれも辛くして香しいといつたのだ。これを食ふといふは、やはり^(一一) 巴地方^はで負蠶^{ふさ}を食ひ、南方地方で山柰を食ふと同じやうなわけだ。根は白色で短く、牛膝のやうだ。この物は甚だ珍しくないものだが、唐本草には『鶴虱^{くわくしつ}は西戎に産する』とあり、宋の本草には『波斯から出る』とある。如何にも不可解のやうにも見え

るが、蓋し當時は一般にこの物を藥用にする知識がなく、ただ西戎や波斯地方で始めて藥功が発見されてゐた。且つその土地が藥艸としての發育に適してゐたから斯く言はれたものだ。やはり苜蓿モウモクも『西域から出る』とあるが、何ぞ知らん中國では馬の飼糧に使つてゐるといふやうなわけだ。詳細は獐蕒シヤウリョウの條を見よ。

葉

根も同じ。

氣味

【甘し、寒にして毒なし】別錄に曰く、室松は辛し、

毒なし。時珍曰く、微し辛く甘し、小毒あり、生の汁は吐かせる。之才曰く、垣衣、地黃が使となる。

主治

【瘀血オウケツ、血癥ケツシヤク、死せんとするほどの下血。尿血を止め

る。久しく服すれば身體を軽くし、老衰を防ぐ】本經【小蟲を除き、痺を去り、胸中の結熱を除き、煩渴を止め、水を逐ひ、大いに吐き、下す】別錄【血を破り、膿ウミを生じ、鼻衄ビジュを止め、三蟲を殺し、諸毒腫を除く。丁瘡、癰瘡、金瘡内射、身體の癢かゆきもの、癰瘡の止まぬものは、これを擦りつけば立ちに已む】唐本【地松は金瘡の止血に主效がある。惡蟲、蛇の螫毒セキドクを解するには揉んで傳ける】開寶【痰を吐し、瘡を止め、牙痛、口緊、喉痺を治す】時珍【室松は眩、痺に主效がある】別錄有名未用

發明

時珍曰く、天名精とは根と苗とを併せての稱呼だ。地松、室松とはい

（三）猪瘟病ハ顔面羅
斯即チ丹毒ノ一種。

（四）乳蛾ハ喉痺扁桃
腺炎。

（五）喉嚨ハ咽嚨ニ同
シ。

（六）刀鐮人ハ理髮師
ヲ指スナラン。

づれも苗、葉をいひ、鶴虱とはその子を言ふ。功力は概して痰を吐し、血を止め、
蟲を殺し、毒を解するに在る。故に搗つた汁を服すればよく痰瘧を止め、含漱すれ
ば牙疼を止め、揉んで蛇咬に傳け、また（三）猪瘟病の治療に用ゐるのである。按ずる
に、孫天仁の集效方に『凡そ男、女の（四）乳蛾、（五）喉嚨腫痛、及び小兒の慢驚風で
牙關緊急し、人事不省なるには、鶴虱草、一名皺面草、一名母猪芥、一名杜牛膝の
根を取つて洗淨し、搗き爛して好酒を入れ、その汁を絞つて灌げば良久して甦る、
また同時に渣を項下に傳ける。或は醋で調へて搽るも妙だ』とある。朱端章の集驗
方には『余が櫟に應じて淮西の幕府に出仕したとき、牙疼で大いに困つてゐたが、
ある（六）刀鐮人が、草藥一捻を湯に漬け、少時して手でその湯をつけて痛處に搥いて
くれたので、直ちに痛が鎮まつた。それ以來その方を得て人の病を治してやつたが、
なかなか效驗があつた。その草藥といふのは皺面の地菰であつて、世間では地菰と
訛つてゐるが、沈存中の筆談に、特に地菰を説明して、その子を鶴虱と名けるとあ
る。正にこのものだ』とある。錢季誠の方には『鶴虱一箇を取つて齒の中に入れて
置く』とある。高監の方には『鶴虱を米醋で煎じて口を漱ぐ、或は防風、鶴虱を水

で煎じて含漱し、またその草を研つて痛處を塞ぐ。いづれも有効だ」とある。

附方

舊二、新九

【男女の吐血】皺面草、即ち地菰を晒して末にし、一二回、一二錢づつを茅花を泡けた湯で調へて服す。(衛生易簡) 【咽喉腫塞】傷寒溫要で

は、痰涎壅滯で喉が腫れ、水も通らぬには、地菰、一名鶴虱草を根、葉を連ねて搗

き、その汁を鶯飼で掃き入れる。痰を去るに最も妙だ。○聖濟總錄では、杜牛膝、

鼓搥草を共に搗いてその汁を灌ぐ、通らぬときは鼻から灌ぐ。吐して妙效がある。

○又ある方では、土牛膝を、春、夏は莖を、秋、冬は根を一把、青礬半兩を共に

研つて患部へ點ける。膿血、痰沫を吐かせて癒える。【纏喉風腫】蚬蚘草、即

ち皺面草を細研し、生蜜で和して彈子大の丸にし、一二九づつを嚙めば癒える。乾

いたものを末にして蜜で丸にしてもよし。これを救生丸と名ける。(經效濟世方) 【諸骨

哽咽】地菰、馬鞭草各一握を根を去り、白梅肉一箇、白礬一錢と搗いて彈子大の丸

にし、綿で裹んで含嚥する。骨は自から軟かになつて下る。(普濟方) 【風毒癰癰】

赤く腫れる。地菰を搗いて傅け、乾けば傅け換へる。(聖惠方) 【疔瘡腫毒】鶴虱草、

浮酒糟を共に搗いて傅ければ立るに效がある。(孫氏集效方) 【發背の初期】地菰の杵

(一七) 鼓搥草ハ牛膝ノ一名。

(一八) 纏喉風ハデブテリヤニ似タルモノ。

(一九) 風毒ハ囊狀膿腫、移轉膿腫ノ類。

(二二)大觀ニ辛ヲ平ニ
作ル。

汁一升を一日二回服し、瘡えれば止める。(傷寒類要) 【惡瘡腫毒】地菰の搗汁を一日

三四回服す。(外臺秘要) 【惡蛇の咬傷】地菰を搗いて傅ける。(易簡方)

鶴虱(唐本草)

氣味

【苦く(三〇)辛し、小毒あり】大明曰く、涼にして毒な

し。主治

【虻、蛭蟲には、散にして肥肉の臙汁で方寸匕を服す。また丸、散に

も入れて用ゐる】(唐本) 【蟲の心痛には、淡醋で半匕を和して服すれば立るに瘥える】

(開寶) 【五臟の蟲を殺し、瘡を止める。惡瘡に傅ける】(大明)

發明

頌曰く、鶴虱は殺蟲方中の最要藥である。初虞世の古今錄驗方に『虻

咬の心痛を療ずるには、鶴虱十兩を搗き篩つて蜜で梧子大の丸にし、蜜湯で空心に

四五十丸を吞む。酒、肉を忌む。韋雲は心痛を患つて十年間瘥えなかつたが、これ

を雜方中から取合はせて服して癒えた』とある。李絳兵部手集方でも、小兒の虻蟲

が心腹を嚙んで痛むを治するに、やはり鶴虱のみを研末して肥豬肉汁で飲下す。五

歲の小兒は一回に二分を服す。それで蟲が出て直ちに痛が止まるとしてある。

附方

新一。【大腸より蟲の出る病】その蟲が斷れず、斷れてもまた生じ、歩行、

坐居に困難なるには、鶴虱末を水で調へて半兩を服すれば自から癒える。(怪疾奇方)

(一) 猪 蕨

音は猪(キ) (唐本)

和名 めなもみ
學名 *Isodon rubescens* Mukino.
科名 きく科(菊科)

校正

唐本の猪膏母を併せ入る。

釋名

希仙(綱目) 火炊草(唐本) 猪膏母(唐本) 虎膏(唐本) 狗膏(唐本)

粘糊菜(救荒) 時珍曰く、韻書に、楚の地方では猪ちゅうを呼んで猪ちゅうといひ、草の氣味の辛毒なるを蕨たんといふとある。この草は臭氣が猪のやうで味が蕨たん整するものだから猪蕨といふのだ。猪膏、虎膏、狗膏といふも、いづれもその臭氣の似た點、及び虎、狗の咬傷に治效がある點から名けたものだ。火炊とあるは虎蕨と書くが正しいので、俗音の訛あやつたものだ。近來は一般にまた猪蕨を訛あやつて希仙といふ。救荒本草には『嫩苗を煮熟し浸して苦味を去り、油、鹽で味を付けて食ふ。故に俗に粘糊菜ねんこさいといふ』とある。

集解

恭曰く、猪蕨は、田野の農民は皆これを食ふ。一名火炊といひ、葉は酸漿に似て狭く長く、花は黄白色だ。三月、四月に苗、葉を採つて暴乾する。又

(一) 牧野云フ、めなもみニ三品ガアツテ普通ニめなもみトイフモノハ猪蕨ニ當リ其學名ハ下ニ記スル通りデアル。之レニ似テ毛少ナク全草ヤヤ小形ナ品ヲこめなもみト稱スル。めなもみト同シク普通ニ野外ニ生ズル、學名ヲ *S. rubescens*, Mukino. ト稱スル。今一種我邦ノ西南地方ニ産スルモノガアツテ琉球、臺灣ニ分布スル、印度邊ニアルモノモ之レト同シデアル、之レチつくしめなもみト呼ビ學名ハ *S. chinensis*, L. デアル。

(二) 楚ハ石部石炭ノ註ヲ見ヨ。

(三) 大觀ニ食ヲ識ニ作ル。

(同)大觀ニ菊字下ニ
秋末ノ二字アリ。

曰く、豬膏母は平澤、下濕の地に生ずる。所在いづれにもあるもので、一名虎膏、一名狗膏といふ。葉は蒼耳に似て莖が圓く毛がある。

頤曰く、豬養は處處にある。春苗が生え、葉は芥葉に似て狭く長く、文が粗い。

莖は高さ二三尺ある。秋初に菊のやうな花を開き、頗る鶴虱に似た實を結ぶ。夏葉を採つて暴乾して用ゐる。

藏器曰く、豬膏草は葉が荏に似て毛がある。保昇曰く、豬膏葉は蒼耳に似て兩枝相對し、

莖、葉俱に毛があつて黄白色だ。五月、六月に苗を採つて日光で乾かす。

時珍曰く、按ずるに、蘇恭の唐本草には、豬養は醃漿に似たもの、豬膏母は蒼耳に似たものとして二種に區別してあるが、成訥の豬養丸を進むる表には『この藥は本草の記述と異ふ。多く肥沃の地に生ずるもので、高さ三尺ばかり、葉は相對してゐる』とあり、張詠の豬養丸の表には『この草は金稜、銀線、素莖、紫葉、節に對して生える。蜀では火軟と呼ぶ。莖、葉は頗る蒼耳と同じものだ』とあり、沈括の



〔養 菊〕

筆談には『一般人は妄に地菰を誤認して火欬くわげとしてゐるが、火欬を單服する法といふがあつて、それを見ると、その用ゐてあるものは地菰である。火欬を用うべきものではない。火欬といふは本草に豬膏母と名けてあるその物だ。後世の人は本草の記述は重複してあるといふことを識らぬのだ』とある。按ずるに、この數説は各異つて居る。今一般に風痺に多く豬黃丸きねぐわんを用ゐてゐるが、果して何れに依據してよいものか問題だ。

時珍が嘗て諸草を蒐集して研究した結果に依れば、豬膏草は莖が青白くして直稜があり、また斑點がある。葉は蒼耳に似て微し長く、地菰ぢこもに似て稍薄い。葉は節に對して生え、莖、葉いづれも細毛がある。肥沃の地に生えたものは一株から數十の枝が分れてゐる。八九月に深黄色の小さい花を開き、中に同蒿子どうかうしのやうな長い子があり、外萼に細刺があつて人に粘るものだ。地菰は莖は青く、圓くして稜もなく、斑もなく、毛もなく、葉は皺しわみ、荊芥に似てやはり節に對して生えない。これに由つて觀れば、成、張二氏の所説と相合致するもののやうである。現に河南の陳州ちんしゅうでは豬黃を採つて方物に充してゐるが、そのものの形狀もやはり豬膏草だ。かやう

（今）陳州ハ隋ニ置ケ
今ノ河南省淮陽縣ノ
ノ舊治ナリ。

な次第だから、沈氏の所謂る猪豨が猪膏母であることはその説に於て疑ない。蘇恭の所謂る酸漿に似たものといふは、龍葵（ろうき）のことで猪豨ではない。蓋し誤認である。ただ沈氏が『世間で單服する火炊は地菰のことだから、猪膏母（ちようこうも）を用うべきものでない』といふは、成氏、張氏の説と相反してゐるやうに思はれる。

今按ずるに、猪豨、猪膏母の條には、いづれも風を治するの説がない。ただ本經の地菰の條に『痺を去り、熱を除く。久しく服すれば身體を輕くし、老衰を防ぐ』なる言葉があつて見れば、風を治するには地菰を用うべきもののやうでもあるが、しかし、成、張二氏が天子に上つた方に虚謬（きよみう）を述べる筈はなからうと思ふ。或はこの二草共に治風の功力があるものかとも思はれるが、ところが現に服用する猪膏母といふ猪豨には、やはり往往效驗があつて、その場合地菰といつて服することはないのである、猪豨の猪膏母であることは十分疑ふ餘地がない。

(六) 木村(康)曰ク、
成分ハ苦味質ダサル
チン(W. P. 767)

猪豨 (六) 氣味

『苦し、寒にして小毒あり。又曰く、猪膏母は辛く苦し、平にして毒なし』。蘇恭曰く。小毒あり。蘇恭が『猪膏は毒なし』といふは誤だ。

主治

『猪豨は、熱盛煩満（ねつしやうはんまん）で食事不能なるには、生の搗汁三合を服す。多けれ

ば吐かせる。又曰く、豬膏母は、金瘡に主效があり、痛を止め、血を斷ち、肉を生じ、諸惡瘡を除き、浮腫を消す。搗いて患部を封じ、湯にして漬け、散にして傅ける、いづれも良し【蘇恭】「久瘡痰癰に主效があつて、搗汁を服して吐かす。搗いて虎傷、狗咬、蜘蛛咬、蠍咬、蠅咬、蜈蚣咬に傅ける【蘇恭】「肝、腎の風氣で四肢が麻痺し、骨痛、膝弱のもの、風濕諸瘡を治す【時珍】

發明

頌曰く、蜀地方で行はれる鬚蚤の單服法は、五月五日、六月六日、九月九日に葉を採り、根、莖、花、實を去つて洗淨して暴乾し、甌中に入れて層層に酒と蜜を酒いで蒸してまた暴す。此の如く九回繰り返せば、氣味が極めて香美になる。それを熬り搗き篩つて末にし、蜜で丸にして服するのである。かくすれば、甚だ元氣を益し、肝、腎、風氣の四肢麻痺、骨間の冷、腰、膝無力を治し、またよく大腸の氣を行らすといふことだ。諸州の報告書の説明は、いづれも『性寒にして小毒あり』とあつて唐本と同様だが、ただ文州、及び高郵州のものだけ『性熱にして毒なし。これを服すれば補益し、五臟を安じ、毛髮を生じ、兼て風濕瘡、肌肉の頑痺、婦人の久冷に主效がある。これを用ゐるには、粗莖を取去つて枝、葉、花、

(七)大觀ニ冷疹ニ作ル。

(八)文州ハ今ノ甘肅省文縣ノ地ナリ。高郵ハ今ノ江蘇省高郵縣ノ酒軍治ナリ。

實を蒸し乾して用ゐるがよし』とあつて、兩説同一でない。これは葉のみ單用すれ

ば寒にして毒ありだが、枝、花、實を併用すれば熱にして毒なしといふことになるのではあるまいか。それとも産地の關係で不同が生じたわけであらうか。

時珍曰く、生の搗汁を服すれば吐かせるものだ。故に小毒ありといふのである。

九蒸九暴すれば人體を補し、痺を去るものだ。故に毒なしといふのである。生のものは性寒、熟すれば性溫なるものだ。熱といふは誤である。

慎微曰く、按ずるに、江陵府節度使成誨が豨薺丸の方を造むる表の略に云く、

臣、弟ニ（五）誨トイフモノアリ。年（一〇）二十一。風ニ中ツテ枕ニ伏スコト五年。

（九）天觀ニ訴ニ作ル。
（一〇）大觀ニ二サ三ニ作ル。

（一）草、大觀ニ藥ニ作ル。

百醫癰エズ。道人鍾針ナルモノアリ、因テ此ノ患ヲ觀テ曰ク、豨薺丸ヲ餌スベシ、必ズ愈エン。其ノ（一）草多ク沃壤ニ生ズ、高サ三尺許リ、節葉相對ス。當ニ

夏五月以來之ヲ收ムベシ。毎ニ地ヲ去ルコト五寸ニシテ剪刈シ、溫水ヲ以テ泥

土ヲ洗ヒ去リ、葉、及ビ枝頭ヲ摘ミ、凡ソ九蒸九暴ス。必ズシモ太（二）大（三）燥セザレ。

但（四）ダ以ツテ（五）足（六）ルヲ取ツテ度ト爲ス。仍テ熬リ、搗キ、末ト爲シ、煉蜜ニテ丸ニスルコト梧子大ノ如クシ、空心ニ溫酒、或ハ米飲ニテ下スコト二三十九、服

（二）大觀ニ足ヲ蒸ニ作ル。

シテ二千丸ニ至ル、所患愈加ルモ憂慮スルコトヲ得ザレ。是レ藥攻ノ力ナリ。
服シテ四千丸ニ至ツテ必ラズ復スルコトヲ得ン。五千丸ニ至ツテ當ニ丁壯ニ復
スベシト。臣、法ニ依ツテ修合シ、誦ヲシテ之ヲ服セシム。果シテ其ノ言ノ如
シ。服後須ク飯三五匙ヲ喫シテ之ヲ壓スベシ。五月五日ニ采ルモノ佳ナリ。勅
ヲ奉ジ、醫院ニ宣付シテ詳録ス。

又、益州の地方長官張詠が彌薑丸を進むる表の略に曰く、

(一四)大觀ニ含チ食ニ
作ル。

(一四)換チ食物本草ニ
ハ條延ノ二字ニ作
ル。

切ニ以ルニ、石ヲ餐シ水ヲ飲ムハ充腸ノ饌ト作ス可シ。松ヲ餌ヒ栢ヲ
ムハ亦救病ノ功ヲ成ス。是ノ以ニ、飢ヲ療ズル者ハ羞珍ニ在ラズ。病ヲ愈ス者
ハ何ゾ異術ヲ煩サン。倘シ濟時ノ藥ヲ獲バ、輒チ鄙物ノ形ヲ陳ヌ。管窺ヲ恥デ
ズ、輒チ天聽ヲ干ス。臣、龍興觀ヲ換ユルニ因テ一碑ヲ掘得タリ。内ニ氣ヲ
修養スルノ術、竝ニ藥方二件ヲ説ク。方ニ依リ、人ヲ差シテ訪問シ采覓スルニ、
其ノ草頗ル異アリ。金稜、銀線、素莖、紫萋、節ニ對シテ生ズ。蜀ニハ火欬ト
號ス。莖葉頗ル蒼耳ニ同ジ。高キニ登リ險ヲ歷ルヲ費サズ、毎ニ常ニ求ムルコ
ト少シテ獲ルコト多シ。急ニ采ルモ難キニ非ズ、廣ク收ムルコト甚ダ易シ。倘

〔五〕大觀ニ清ヲ輕ニ
作ル。
〔六〕大觀ニ鬚鬢ニ作
ル。

〔七〕食物本草今ノ次
ニ謹脩ノ二字アリ。
〔八〕差ハ擇ノ意。

シ勤メテ久服スレバ、旋テ神功ヲ見ハス。誰カ知ラン、至賤ノ中、乃チ殊常ノ
效アラントハ。臣自ラ喫シ、百服ニ至テ眼目〔五〕清明ナリ。即チ千服ニ至テ〔六〕
髭鬚烏黑、筋力輕健、效驗多端ナリ。臣ガ本州ニ都押衙羅守一ナルモノアリ、
曾テ中風ニ因ツテ馬ヨリ墜チ、音ヲ失シテ語ラズ。臣十服ヲ與フ、其ノ病立ロ
ニ瘥ユ。又、和尚智嚴ナルモノ、年七十ニシテ忽チ偏風ヲ患ヒ、口眼喎斜シ、
時時ニ涎ヲ吐ク。臣十服ヲ與フ、亦便チ瘥ルコトヲ得タリ。〔七〕今一百劑ヲ合ス、
職貢史元ヲ〔八〕差シテ奏進ス。

附方

新五。

【風寒泄瀉】火欬丸——風氣が腸胃に行つて泄瀉するを治す。火

欬草を末にして醋糊で梧子大の丸にし、三十丸づつを白湯で服す。〔聖濟總錄〕【癰疽

腫毒】一切の惡瘡には、獐蜋草の端午に採つたもの一兩、乳香一兩、白礬を燒いて

半兩を末にし、二錢づつを熱酒で調へて服す。毒重きものは續けざまに三服を服す。

發汗して妙效がある。〔乾坤秘鑑〕【發背丁瘡】獐蜋草、五葉草、即ち五爪龍、野紅花

即ち小薊、大蒜等分を搗爛し、熱酒一盞を入れて汁を絞つて服す。發汗して立るに

效がある。〔乾坤生忌〕【丁瘡腫毒】端午に採つて日光で乾した獐蜋草を末にし、半兩

づつを熱酒で調へて服す。發汗して直ちに癒える。極めて效驗あるものだ。(集簡方)
【反胃吐食】火^{くわい}欒草^{せんそう}を焙じて末にし、蜜で梧子大の丸にし、五十丸づつを沸湯で服す。(百一選方)

附 錄

(九) 類鼻 (別錄) 有名未用に曰く、味酸し、溫にして毒なし。痿痺^{みび}に主

(九) 類鼻
(和名)(學名)(科名) 共ニ未詳。

效がある。耕地の中や高地に生えるもので、葉は天名精のやうで美しい。根を五月に採る。時珍曰く、これは豬膏草に似たものだ。古代と現代とは名稱の異ふ場合もあるのだから、此に附記して置く。

(一〇) 羊屎柴
(和名)(學名)(科名) 共ニ未詳。

(一〇) 羊屎柴 時珍曰く、按ずるに、乾坤生意に『一名牛屎柴^{ぎゅうしさい}。山野中に生えるもので、葉は鶴虱に類し、四月白花を開く、その葉は癰疽發背に主效がある。搗いて傅けるのだ。冬季は根を用ゐる。この物は魚を毒殺し得るものだ』とある。

(一) 箬 (綱 目)

和名 おほちまきざと(新稱)
學名 *Sasa tessellata*, Makino et Shibata.
科名 禾本科(禾木科)

(一) 牧野云フ、此さは片山直人著ノ日本竹譜ニ箬竹ニ充テテ出テ居ルモノデア^ル、我ちまさざさヨリハ葉が闊大デア^ル、從來我邦ノ學者が爲セシ様ニ之レチちまさざさ、くまさざさ、ねまがりだけトスルノハ非デア^ル。

釋 名

箬 箬と同じ。葦葉 時珍曰く、箬は竹の若くして弱いものだから命

(一) 疎遼ハマバラニ
トホイコト。

(二) 鞆ハ草履。

(三) 龍弱ハ竹藎。

けた名稱だ。生えた状態が(一)疎遼だからまた遼といふ。

集解

時珍曰く、箬は南方の平澤に生ずる。その根と莖とは皆小竹に似てゐるが、節籜と葉とは皆蘆荻に似てゐる。葉の表面は青く、背面は淡く、柔だが靱い。新舊相交つて四季を通じて常に青い。南方では葉を取つて笠に作り、また茶、鹽の包装や米、糶を包むに用ゐ、婦人



〔葉〕 〔莖〕

は(二)鞆の底などに敷く。

葉

氣味

【甘し、寒にして毒なし】

主治

【男女の吐血、衄血、嘔血、

喀血、下血、いづれも焼いて性を存して溫湯で一錢匕を服す。又、小便を通じ、肺氣、喉痺を利し、癰腫を消す】(時珍)

附方

新十二。

【一切の眼疾】

龍弱を灰に焼いて取つた淋汁で洗ふ。久しく

試みれば自から效がある。(經驗方)

【咽喉閉痛】

葦葉、燈心草の燒灰等分を吹くが

(五) 簍ハ籠チ云フ。

(六) 轉脬ハ小便閉。
 (七) 吹奶ハ乳房炎。
 (八) 活幼心法ニ、痘
 瘡初見一二日細小四
 五日漸大頂平至六七
 日脚漸潤頂愈平陷其
 色金白色名曰倒靨。

甚だ妙である。(集簡方) 【突然耳が痛むもの】或は紅腫内服するには、霜を経た青箬の外に露れて將に朽ちんとするものを取り、焼いて性を存し、末にして耳中に傅け入れれば疹が直ちに止む。(揚起簡便方) 【肺壅の鼻衄】箬葉の焼灰、白麴各三錢を研りませ、二錢を井華水で服す。(聖濟總錄) 【月經不止】箬葉灰、蠶紙灰等分を末にし、二錢づつを米飲で服す。(聖濟總錄) 【腸風便血】茶ちや簍ろうの内の箬葉を焼いて性を存し、三匙づつを空心に糯米湯で服す。或は麝香少量を入れる。(王璵百一選方) 【男女の血淋】また五淋を治す。多年用ゐた酒瓶頭の箬葉——三五年乃至十年のもの尤も佳し——七箇を焼いて性を存して麝香少量を入れ、一日三回、陳米飲で服す。ある患者は二服で癒えた。福建では夏期の酒を煮るのでこの物が多くある。(百一選) 【尿白く注ぐが如きもの】小腹氣痛する。茶籠の内の箬葉を焼いて性を存し、麝香少量を入れて米飲で服す。(經驗方) 【小便澀滯】通ぜぬには、乾箬葉一兩の焼灰と滑石半兩とを末にし、米飲で二錢づつを服す。(普濟方) 【男女の轉脬】方は上に同じ。【吹奶乳癰】五月五日に糶を包んだ箬の焼灰二錢を酒で服すれば散る。累りに用ゐて效力がある。(濟急仙方) 【痘瘡倒靨】箬葉灰一錢、麝香少量を酒で服す。(張德恭痘疹

蘆

(別錄下品)

和名 あし、又、よし
學名 *Phragmites communis*, Trin.
科名 禾本科(禾本科)

校正

拾遺の江中采出蘆を併せ入る。

釋名

葦 音は偉(キ)である。蔞 音は加(カ)である。花を蓬蘽と名ける。

(唐本) 筭を蘘と名ける。蘘、音は拳(ケン) 時珍曰く、按ずるに、毛長の詩疏に『葦の初めて生えたばかりのものを葭といひ、まだ秀でぬものを蘆といひ、長成したものを葦といふ。葦は偉大を意味し、蘆は色の蘆黒を意味し、葭は嘉美を意味する』とある。

集解

恭曰く、蘆根は下濕の地に生ずる。莖、葉は竹に似て、花は荻花のやうなものだ。花を蓬蘽と名ける。二月、八月に根を採り、日光で乾して用ゐる。

頤曰く、今は所在にある。下濕の地、川の土堤や澤の中に生えるもので、その状態はすべて竹に似て、葉が莖を抱いて生え、枝がない。花は白い穂になつて茅花の

(一) 牧野云フ、蘆ハ極メテ普通ノ品デ何レニモ多ク之レヲ見ル、之レニ能ク肖タモノデつるよしトモぢしはりトモ云フモノガアルガ、之レハ其地下莖ガ地面上チ走リ蘆ノ地中チ走ルニ反スルノテ直クニ見分ケラルル、此品ノ學名 Phragmites prostratus, Makino. (Ph. japonica, Steud.) デアル、又同屬ノせいこのよしハ一名うどののよしハふしたけ (Arundo Donax, L.) ノヤウニ大クナルモノデ Ph. Karsten, Trin. ノ學名ヲ有スルモノデアル。

(一) 大觀ニ芳ナ葦ニ
作ル。
(二) 大觀ニ萌ノ下ニ
筍ノ字アリ。

(三) 大觀ニハ者ノ次
ニ謂之葦蘆ノ四字アリ。

やうだ。根も竹の根のやうだが節がまばらだ。その根を水底から取るのである。味は甘く辛い。水上に露出したもの、水中に浮んだものはいづれも用ゐるに堪へない。按ずるに、郭璞注爾雅に據れば、葭、即ち蘆である。葦、即ち蘆の成長したもの、葵藿は葦に似て小さく、中が實したもので、江東では烏蘆と呼ぶ。蘆の音は丘（キウ）である。或はこれを適（テキ）といふ。即ち荻である。秋季に入つて堅く成熟したものは即ち萑といふ。萑は音桓（クワン）である。葦は萑に似て細く長く、高さ數尺になる。江東ではこれを廉（けん）といふ。その花は皆三芳と名ける。芳の音は調（テウ）である。その萌は皆蘆と名け、竹筍のやうに食物となし得るものだといふ。右の説の通りとすれば、蘆、葦は通じて一物であつて、所謂葦とは現に籬に作るもの、葵（たん）は現に薪にするもの、ことだが、一般人は葦と葵、蘆と葦との區別がはつきりしてゐない。又、北方では葦と蘆を二物とし、水邊、下濕の地に生えるものを皆葦といひ、細くして太さ指ほどもないもので、庭園の池畔などに植ゑるものを皆蘆といつて、その幹のやや太くして深碧色の（者）者はやはり得難いものとしてある。右の通りとすれば、蘆と葦とはいづれでもよいわけになる。

時珍曰く、蘆には數種ある。その長さ一丈ばかり、中が空で皮が薄く色の白いものは葭かであり、蘆ろであり、葦わである。葦よりも短く小さく、中が空で皮が厚く色の

青蒼なるものは菹そであり、藨ろうであ

り、荻くわいであり、菴くわんである。その最

【蘆】

も短小で中の實せるものは葦であ

り、廉である。いづれも芽生えか

ら老成までの經過に随つて名稱を

付したもので、身はいづれも竹の

やう、葉はいづれも長くして箬葉

のやうだ。その根を藥用に入れた

結果は、性、味いづれも同じである。このもののまだ葉が解け蘆がらぬものは、古

代には紫籜しなと謂つたものだ。

穀曰く、蘆根は必ず逆水に生えたものか、黄な泡ちりのある處に生えた肥厚のものを

用ゐるやうにするがよい。鬚、節、竝に赤黄色の皮を去つて用ゐる。



【荻】

根 氣味

【甘し、寒にして毒なし】

主治

【消渴客熱、小便利を止める】

(別錄)

【反胃、嘔逆で食物の通らぬもの、胃中の熱、傷寒の内熱を療するに彌いよいよよし】

【蘇恭】大熱を解し、胃を開き、嘔おう嘔くわの止とめぬを治す【甄權】寒熱時疾の煩悶、

瀉痢、^五人渴、孕婦の心熱【大明】

筍 氣味

【小し苦し、冷にして毒なし】

○[○] 寧原曰く、巴豆を忌む。

主治

【脇間の客熱に渴を止め、小便を利し、河豚、及び諸魚蟹の毒を解す】[○] 寧原【諸肉の毒を解す】時珍

發明

時珍曰く、按ずるに、雷公炮炙論の序に『食を益し、觴しやうを加ふるには、

須すらく蘆、朴を煎ずべし』とあり、注に『逆水の蘆根、并に厚朴の二味等分を湯に

煎じて服す』とある。蓋し蘆根の甘は能く胃を益し、寒は能く火を降すからである。

附方

舊六、新六。

【骨蒸肺痿】食事不能なるには、蘇遊の蘆根飲が主效があ

る。蘆根、麥門冬、地骨皮、生薑各十兩、橘皮、茯苓各五兩、水二斗を八升に煮取

り、滓を去つて五回に分服する。發汗して瘥える。[○] 外臺秘要

【勞復、食復】死せんとするには、いづれも蘆根を煮た濃汁を飲む。[○] 肘后方

【嘔おう嘔くわの止とめぬもの】厥逆す

（五）人ハ火ノ誤ナル
ベシ。

（六）大觀ニ千金ヲ肘
後方ニ作ル。

るには、蘆根三斤を切り、水で煮て濃汁を飲む。頻しきりに二升を飲めば必ず效がある。

童尿で煮れば三升まで服せぬ内に癒える。（肘後方）【五噎吐逆】心膈氣滯し、煩悶し、

食物の通らぬには、蘆根五兩を剉み、水三大盞で二盞に煮取り、滓しを去つて溫服す

る。（金匱玉函方）【反胃上氣】蘆根、茅根各二兩、水四升を二升に煮て分服する。（千金

方）【霍亂煩悶】蘆根三錢、麥門冬一錢を水で煎じて服す。（千金方）【霍亂脹痛】蘆

根一升、生薑しやうきやう一升、橘皮五兩、水八升を三升に煎じて分服する。（太平聖惠方）【狗肉

の毒を食つたとき】心下が堅く、或は腹脹し、口乾き、突然發熱して妄語するには、

蘆根の煮汁を服す。（梅師方）【馬肉の中毒】方は上に同じ。（聖惠）【鱻鯪魚こういぎよの毒】方は

上に同じ。（六）千金）【蟹の中毒】方は上に同じ。（千金）【藥箭の毒に中つたとき】方は

上に同じ。（千金）

莖葉

氣味

【甘し、寒にして毒なし】

主治

【霍亂嘔逆、肺癰煩熱。

癰疽には、灰に焼いて淋汁を取り、膏に煎じて用ゐる。惡肉を蝕しよくし、黑子を去る】

（時珍）【瘰癧はんは金瘡を治し、肉を生じ、癰はんを滅する】（徐之才）○【江中から採り出した

蘆は夫婦を和同せしめる。これを用ゐるには法がある】（藏器）

發明

時珍曰く、古方では、藥を煎じるに多く勞水、及び陳蘆火を用ゐたが、それは水が強からず、火が盛ならざる點を取るのである。蘆は中が空虚なものだから、能く心肺に入つて上焦の虛熱を治するものだ。

附方

新六。

【霍亂煩渴】腹脹するには、蘆葉一握を水で煎じて服す。○又あ

る方では、蘆葉五錢、糯米二錢半、竹茹一錢を水で煎じ、薑汁、蜜各半合と合煎して兩沸し、時時に呷すふ（聖惠方）

【吐血の止まぬもの】蘆荻の外皮を白くならぬやうに灰に焼いて末にし、蚌粉少量を入れて研りまぜ、一二錢を麥門冬湯で服す。三服で一人を救ひ得る。（聖惠方）

【肺癰欬嗽】煩滿し、微熱し、心胸甲錯かふさくするには、葦莖湯——葦莖を切つて二升、水二斗を五升の汁に煮取り、桃仁五十箇、薏苡仁よぎい、瓜瓣各半升を入れて二升到煮て服す。膿血を吐出して癒えるものだ。（張仲景金匱玉函方）

【發背の潰爛】陳蘆葉を末にし、患部を葱椒湯で洗淨してから傅けるが神效がある。（乾坤秘經）

【癰疽の惡肉】白炭灰、白荻灰等分を膏に煎じて塗る。盡く惡肉を蝕して肉を生ずる。膏を貼れば黒子も取れる。この藥はただ十日間だけは保存し得るが、久しく經過すれば效力がなくなる。（葛洪肘後方）

【小兒の禿瘡】瘡を鹽湯で洗淨して蒲

葦灰を傳ける。(聖濟總錄)

蓬蘽

氣味

【甘し、寒にして毒なし】

主治

【霍亂には、水で煮た濃汁

を服するが大いに效驗がある】(蘇恭) 【煮汁を服すれば魚蟹の中毒を解す】(蘇頌) 【焼灰を鼻に吹けば衄血を止める。また崩中の藥にも入れる】(時珍)

附方

新二。

【乾霍亂病】心腹脹痛するには、蘆蓬茸一把を水で煮た濃汁二

升を頓服する。(小品方)

【諸般の血病】水蘆花、紅花、槐花、白雞冠花、茅花等分を

水二鍾で一鍾に煎じて服す。(萬表續善堂方)

(一) 甘蕉

(別錄下品)

和名 ばなな

學名 Musa paradisica, L. var. sapientum, Kunthz.

科名 ばせう科(芭蕉科)

釋名

芭蕉(衍義)

天真(史記注)

芭蕉

時珍曰く、按ずるに、陸佃の埤雅

(一) 牧野云フ、甘蕉ハタダ一ノ品ヲ指シタノデハナク幾品(多分一種中ノ異品)カノ總稱デアル、ソミテ皆甘味ノ實ガ生キノデソレ故甘蕉ト云フモノデアル、其申ノ主語ハばなな(M. paradisica, L. var. sapientum, Kunthz.)デアラウト思

に『蕉は葉が落ちないもので、一葉舒れば一葉焦れるものだ。故に蕉といふ。俗に乾いた物を巴と謂ふ。巴といふはやはり蕉の意味だ』とある。稽聖賦には『竹は實を布いて根枯れ、蕉は花を舒べて株槁』とある。芭蕉といふは芭蕉の發音の轉訛

ノカウ先ヅ其學名チ
之ニ配シテオク、又
三尺ばな(Cat. Cey
yankin, Tamb.)ト
稱スルモノモ南支那
ノ産デアアル、我邦ノ
ばせうハ甘蔗ノ異名
ノ芭蕉ニ基イテ其名
が出タモノダが、然
シ我がばせうハ支那
ノ芭蕉ト同品デハナ
クタダ芭蕉ノ名ヲ冒
シタモノデアアル、然
シ其植物ノ原產地ハ
無論支那テアルト思
フカ今日支那ノ「ふ
ろら」ノ書ニハ其學
名ナル *Al. Busjoo*、
Busjoo、ガ舉ゲテナイ
ノハドウシタモノ歟
或ハ尙ホ探檢ガ不充
分デ其支那カラノ標
品ガ學者ノ手ニ入ラ
ヌカラカモ知レナイ
西洋ノ學者ハばせう
(Al. Busjoo, Siboo)
ノ產地ヲ我日本ト號

だ。蜀地方ではこれを天苴といふ。曹叔雅の異物志には『芭蕉の結實は皮が火のやうに赤く、その肉は蜜のやうに甜い。四五箇で十分満腹するものだ。』しかしして滋味は常に牙齒の間に在る。故に甘蔗と名けるのだ』とある。

【集解】弘景曰く、甘蔗は、もと廣州に産したものだ。今は江東地方いづれ

にも有つて、根、葉に相異はないが、ただその子は食ふに堪へない。

恭曰く、甘蔗は、嶺南に産するものは子が大きく、味が甘い。北方地方のものは花だけあつて實がない。

頌曰く、現に二廣、閩中、川蜀の者は花があり、閩、廣のものは實が極めて甘美で食し得る。他の地方にも多いが、花の咲くものはやはり少い。近來は中州で盛んに植ゑてゐる。いづれも芭蕉だ。種類はやはり多いもので、子のあるものは甘蔗と名ける。卷いた心の中から幹が抽き出て花が咲き、花が初めて出たばかりには、大きな夢が倒に菌苔を垂れたやうで十數層になり、層層が皆瓣で、大きくなるに随つて花は瓣中から外部へ現はれ、極めて繁盛する。火炬のやうに紅なものをば紅蕉といひ、蠟の色のやうに白いものをば水蕉といふ。その花が象牙に類すると

(一) 大觀ニハ江東ナ
郡下東陽ノ四字ニ作
ル。

(二) 廣ハ廣東、廣
西、閩中ハ福建、川
蜀ハ四川。

(三) 花ノ字大觀ニヨ
ル。

(四) 中州トハ河南省
ノ地ヲ指ス。

(五) 大觀ニ名甘蔗ノ
次ニ葉大抵與芭蕉相
類但其ノ十字アリ。

(六) 芭蕉ハ蓮花ノツ
ボミ。

(七) 大觀ニハ黃綠ノ
次ニ從下說葉花心但
向上生常如蓮穢然未
嘗見其花心而面視之
亦ノ二十六字アリ。

(八) 無葉云云ニ據續ス。

(九) 轂ハコシキ、車
輪ノ中央ニアリテ軸
其中ヲ貫キ轆車外ニ
集マル所。

(一〇) 一箇ハ花が一ツ
開キ了ルコト。

だ。眺めたところ樹株のやうで、太いものは一抱へに餘るほどあり、葉は長さ一丈ばかり、廣さ一尺から二尺ほどあり、莖は虚軟で芋のやうだが、皆幾重にもの皮に裹られてゐる。根も芋の魁のやうで色青く、大なるものは草轂ほどある。花は莖の末端に著いて大いさ酒盃ほどあり、形狀、色彩は蓮のやうだ。子は各、房になり、その實は花に隨つて成長し、花は一箇毎に各、六箇の子があつて、前後相次いで生ずるので、子が同時に出るのではなく、花も同時に落ちない。蕉の子には凡そ三種類あつて、いづれもまだ熟せぬうちは苦く澀いが、熟すれば甜くして脆く、葡萄の味のやうだ。食へば飢を凌げる。一種は、子の大さ拇指ほど、長さ六七寸、形は鋭く、羊角に似て兩兩相抱くものだ、これを羊角蕉といふ。皮を剥けば黃白色で、味が最も甘美だ。一種は、子の太さ雞卵ほど、牛乳に類したところのあるものだ。これを牛乳蕉といふ。味は微し劣る。一種は、子の太さ蓮子ほど、長さ四五寸、形が正方なもので、味は最も微弱だ。いづれも蜜で貯へて菓子として用ゐられる」とある。又、顧珩の海槎錄には「海南地方の芭蕉は、毎年花を開いて實を結ぶ。二種類あつて、一種は板蕉といひ、大きくて味が淡い。一種は佛手蕉といひ、小さくて味

(一) 南中ハ南方地方ニ於テノ意、今ノ廣東省以南ヲ指ス。

(二) 牧野云フ、美人蕉ハひめばせう即チ *Shoei Tugsoop* s. *Leum* (*Al. cochino*, *Andl.*) ヲ花ニ賞スル品デアル、南支那ノ原産ナリ。我ガ九州ガハ諸處ニ伴アレテ居ル。(三) 本書ニ時ニ時ニ二字ニ作ル。(四) 藥瓶トハ瓶ノ長、大瓶形ノ細キモノ、ふちニ形ノモノ。

が甘い。二種を通じて蕉子と呼んでゐる。花があつて實のない江南地方のものやうではない』とある。又、范成大の虞衡志には『(一) 南中の芭蕉に數種ある。その極めて大なるものは、冬を凌いで凋しぼえず、中から長さ數尺の一本の莖が突出て、節毎に花が著き、花がち榧ちせると葉の根に實がある。その皮を去つて肉を取ると、軟爛で綠柿のやうな味で、極めて甘く冷い。四季何時でも實がある。その地の人民は「客熱を去るものだ」といひ、小兒に與へて食はせ、蕉子と呼び、又、牛蕉子とも呼ぶ。梅汁に漬つけて曝し、扁ひたく壓して置くと、味が甘く酸くなり、微し霜がかかる。これを芭蕉乾といふ。一種は雞蕉子といひ、牛蕉よりは小さく、これも四季を通じて實がある。一種は牙蕉子といひ、雞蕉よりもまた小さい。尤も香しく嫩やわらかで甘美なものだ。これだけは秋の初めに子を結ぶ。一種は紅蕉といひ、葉は瘦せて蘆あやぐか荳まめのやう、花の色は正紅で榴花のやうなもので、日毎に一兩葉を開き、其端に一點鮮綠なところがあつて、愛すべきものだ。春開き始めて秋になつて盡さるのだが、盡さる頃のものでもやはり芳いしい。俗に(三) 美人蕉と呼んでゐる。一種は膽瓶蕉といひ、根が土から出た(四) 時は飽くまで肥えてゐて、その形狀が(五) 膽瓶のやうなものなの

〔近〕阿魯ハ南洋群島中ノ一、ニューギニアノ西南八十哩ニアリ。一、阿盧ニ作ル。

〔名〕木村(康)曰ク、

ばなな果實ノ糖分大部分ハ蔗糖、僅少部分ハ轉化糖ヨリナリベクトレゼ、有機酸、脂肪、纖維素、蛋白質等ヲ含有ス。又果皮ハ灰分ニ富ミ植物液汁ハ色素、タンニン、沒食子酸等ヲ含ム。芭蕉ハ琥珀酸ヲ含ミ僅ニタンニン質及ビ糖類等ヲ伴フ、アスバラギン、ロイチン或ハチロシンノ如キモノハ含マズ、エンチームハオキシダーゼ及ビペルオキシダーゼナリ。

(W. P. 107)

だ』とある。又、費信の星槎勝覽には『南番(ミナモト)阿魯(アロ)の諸國には米穀がない。ただ芭蕉や椰子(ヤシ)を栽培し、その實を取つて食糧に充てる』とある。

〔名〕

氣味

【甘し、大寒にして毒なし】

恭曰く、性は冷である。健康に益は

ない。多く食べれば冷氣を動ずる。

主 治

【生で食べれば、渴を止め、肺を潤ほす。

蒸熱し晒し裂き舂いて仁を取つて食べれば、血脈を通じ、骨髓を填てる】(孟詵)

【生で

食べれば、血を破り、金瘡を合せ、酒毒を解す。乾いたものは、熾熱(きれつ)、煩渴を解す】

〔吳瑞〕小兒の客熱を除き、丹石の毒を壓す】(時珍)

根

氣味

【甘し、大寒にして毒なし】

恭曰く、寒なり。頤曰く、甘蕉と芭

蕉とは性が同じだ。主 治

【癰腫、結熱】(別錄)

【搗き爛らして腫に傅ければ熱

毒を去る。搗汁を服すれば産後の血脹悶を治す】(蘇恭) 【黃疸(わうだん)に主效がある】(孟詵)

【天行熱狂の煩悶、消渴、癰毒を患ふもの、并に金石の發動で躁熱し、口の乾くを

治す。いづれも汁を絞つて服す。また頭風、遊風を治す】(大明)

附 方

舊四、新六。

【發背で死せんとするもの】芭蕉根を搗き爛らして塗る。

〔肘後方〕

【一切の腫毒】方は上に同じ。【赤遊風瘡(せきゆうふうそう)】方は上に同じ。【風熱頭痛】方

は上に同じ。【風蟲牙痛】芭蕉の自然汁一碗を煎じ、熱して含嗽する。(普濟方) 【天

行熱狂】芭蕉根の搗汁たうじゆを飲む。(日華子本草) 【消渴飲水】骨節の煩熱するには、生芭蕉

根の搗汁一二合づつを時に飲む。(聖惠方) 【血淋澀痛】芭蕉根、旱蓮草各等分を水で

煎じ、一日二回服す。(聖惠方) 【産後の血脹】芭蕉根を搗いて汁を絞り、二三合を溫

服する。【瘡口の合はぬもの】芭蕉根の汁を取つて抹するがよし。(直指方)

薰油 竹筒を皮の中へ挿入さうにふして油を取り、それを瓶に盛つて置く。【氣味】甘

し、冷にして毒なし。【主治】【頭風の熱。煩渴を止め、また湯火傷を治す。頭

を梳くしけづれば、婦人の髪かみの落ちるを止め、長く黒くする】(大明) 【暗風癰病で涎が作り、

運悶うんもんして倒れんとするには、これを飲んで吐く。極めて奇效がある】(蘇頌)

附方 新一。【小兒の截驚】芭蕉汁、薄荷汁を煎しまぜて頭、頂に塗り、(七)額しん

門だけを塗らずに置き、四肢に塗つて手、足の心だけを塗らずに置く。甚だ效があ

る。(鄧筆華雜興)

葉 【主治】【腫毒の初發。研末を生薑汁に和して塗る】(時珍) 聖惠方にある。

附方 新一。【(二八)岐毒の初期】芭蕉葉あざを熨斗あぶらの中で焼いて性を存し、輕粉、

(二)岐毒ハ股間ノ腫
痛スルモノ、便毒ナ
リ。

(七)額門ハ頂門ニ同
シ、額ノヒヨムケ。

麻油を入れて調へて塗る。一日三回試みれば、或は消し、或は破れ、皆痕がなくなる。(仁齊直指方)

花 主治

【心痺痛。焼いて性を存して研り、鹽湯に點て二錢を服す】(日華)

藁

荷 (別錄中品)

和名 めうが(?)
學名 Zingiber Mioga, Irso. (?)
科名 しゅうが科(薑科)

校正

薬部より移して此に入れ、有名未用の藁草をこの一條に併記する。

釋名

覆菹(別錄)

藁草(別錄)

藁菹

藁の音は博(フ、ハク)である。

藁菹

(説文) 藁草

(一) 牧野云フ、藁荷ヲ從來ノ學者ハめウガニ充テテ居ルガソレハ多分正シイ説ノヤウニモ考ヘル、然シ私ハ支那ニめウガナ産スルトイフ證チ得ナイカラ今斷言ノ出来ヌ事ヲ遺憾トスル、植物名實圖考卷ノ三ニ藁荷トシテ圖セルモノハうばゆりノ一種デコレハ名實ガ異ツテ居ルト思フ。

弘景曰く、本草では白いものを藁荷としてあるが、今は一般に赤いものを藁荷といひ、白いものを覆菹といつてある。蓋し食ふには赤いものがよく、薬に入れるには白いものを良しとする。葉は同一種のものだ。

時珍曰く、覆菹を、許氏の説文には藁菹と書き、司馬相如の上林賦には藁菹と書

(一) 淮南ハ淮河以南
長江トノ中間ノ地ナ
リ。
(二) 荆襄ハ今ノ湖北
省ノ地ナリ。
(三) 江湖ハ今ノ江西、
湖南兩省ノ地ナリ。

いてあつて、芭蕉と音が相近い。離騷の大招には『醴豚、苦狗、膾菹、蓴』とあり、王逸の注に『蓴、音は博(ハク)蓴荷なり。本草に見ゆ』とあるが、今の本草にこの名が無い。脱漏がやはり多いのだ。

集解

別錄に曰く、蓴草は淮南の山谷に生ずる。

頌曰く、蓴荷は(一)荆襄、(二)江湖の地方で多く栽培するが、北地にもある。春初に甘蕉に似た葉が生え、根は薑牙に似て肥えてゐる。その葉は冬枯れる。根は蓴にもなるものだ。その性は陰を好むもので、



蓴

荷

木の下へ生えたものは就中發育がよい。潘岳の閑居賦に『蓴荷は陰に依り、時藿は陽に向ふ』とあるはその意味だ。宗懐の荆楚歲時記には『仲冬に鹽で蓴荷を貯へて冬の食料の備とする。また蠶を防ぐ材料になる』

とあり、史游の急就篇には『蓴荷は冬日藏める』とあつて、その起源は遠いものだ。

〔五〕梅果ハ梅醋ノ漬物。

大體右の通りだが、赤、白の二種あつて、白いものは薬に入れ、赤いものは食料にし、また〔五〕梅果を作るに多く用ゐる。

宗奭曰く、蘘荷は八九月頃に漬けて貯へれば、冬期に蔬、果を作る備になる。治病用には白いものに限る。

〔六〕古今注ニハ『蘘荷、似藟莖面白。藟莖色紫。花生根中』トアリ。又、『葉似薑』トアツテ、時珍ノ引用文ト少異アリ。

時珍曰く、蘘荷の圖經に『江湖地方で多く栽培する』とあるが、現に實地を調べて見たが一向識つてゐるものがなかつた。ただ、楊慎の丹鉛錄に『急就章の註に、蘘荷、即ち今の甘露だ』とある。これを本草に就いて考究するに、形も性も相同じい』とある。甘露とは即ち芭蕉のことだ。崔豹の〔六〕古今注には『蘘荷は芭蕉に似て色が白い。その子、花は根の中に生える。花がまだ腐らぬうちに食ふがよい。久しくすれば消爛れるものだ。根は薑に似たもので、陰翳の地に適し、日蔭に依つて生える』とある。又、按ずるに、王旻の山居錄には『蘘荷は樹蔭の下がよく、二月に種ゑる。一度種ゑると永く生えるものだから、耘り鋤く必要がなく、ただ糞を加へるだけでよいものだ。八月初にその苗を踏み枯らして置けば根が滋る。九月初にその傍生の根を取つて茹にし、また醬で貯藏するもよし。十月中に糠で根の下を覆ふて置け

ば。冬を過ごしても凍死せぬ』とある。

修治

穀曰く、凡そこれを用ゐる場合に、革牛草を用ゐてはならぬ。眞に相似てゐるが、革牛草は腥く澀い。凡そ使ふには、白蘘荷を用ゐ、銅刀で粗皮一重を刮り去り、細かに切つて砂盆に入れ、膏のやうに研つて自然汁を取り、鍊つて煎にし、新器に攤して冷し、乾いた膠のやうな状態にして刮り取つて用ゐる。

根氣味

【辛し、溫にして小毒あり】思邈曰く、辛し、微溫にして瀉る、毒なし。

主治

(七)大觀ニ蟲ニ作リ
又蛇毒ヲ辟蛇ニ作
ル。

【中蠱、及び瘡。搗汁を服す】(別錄) 【溪毒、沙蟲、蛇毒】(弘景)

【諸惡瘡。根の心は、目に稻、麥の芒が入つて出でぬに主效があつて、汁を目に注

藁草

氣味

【苦く甘し、寒にして毒なし】大明曰く、平なり。

主治

【溫瘧、寒熱、酸嘶、邪氣。不祥を避ける】(別錄)

發明

弘景曰く、中蠱の者は、藁荷の汁を服し、竝にその葉に臥せば、蠱主の姓名を呼ぶものだ。多食すれば藥力を損じ、又、脚がきかなくなる。人家では、蛇を辟けるとしてこれを種ゑる。

(八)蠱主ハ蠱ヲ使フ
者。

頤曰く、按ずるに、干寶の搜神記に「外姉夫の蔣士先しやうしけんが發病して下血したとき、それは中蠱だといふので、家人が密かにその病床の下へ藁荷を入れて置くと、士先は突然笑ひ出して「自分を蠱したものは張小小だ」といつた。そこで小小を取、押へやうとすると、小小は逃亡して了つた。これから蠱を解する藥に多く用ゐるが、往往效驗がある」とある。周禮に「庶氏は嘉草を以て蠱毒を除く」とあり、宗慄は『嘉草、即ち藁荷のことだ』といふ。陳藏器が「藁荷、茜根さいこんは最も蠱に主效が有る」といふはこれをいつたのだ。

時珍曰く、別錄の菜部に藁荷とあるは根をいつたのだ。草部に藁草とあるは葉をいつたのだ。主治はやはり頗る相近い。本書には合併して一條とした。

附方

舊八、新一。

【突然の蠱毒】雞肝のやうな血を晝夜間斷なく下し、臟腑が

腐敗して死を待つばかりのものには、藁荷の葉を密かに患者の寢臺の下へ置き、本人に知らせぬやうにする。必ず蠱主の姓名を呼ぶものだ。(梅師方) 【喉中に物があるやうに覺えるもの】吞吐しても出でず、腹脹し、羸瘦るゐさうするには、白藁荷根の搗汁を服す。蠱は立ろに出る。(梅師方) 【喉舌の瘡爛】酒で漬けた藁荷根の汁で半日含漱がんとくし、

(一)牧野云フ、支那
マ麻黄ト云フモノハ
必ズシモ一種ニ限ラ
ズ幾種カノ品種ヲ呼
ンデ居ルノダト思フ
ガ、其邊ノ事ガ徹底
的ニ尙吾人ノ間ニ不
明デアルカラ此ニハ
下ノ學名ノモノヲ以
テ姑ク其主品トシテ
示ス、我日本へ來テ
今日作ラレテ居ルモ

瘥えれば止める。(外臺祕要方) 【吐血、痔血】東に向つて生えた藁荷根一把を擣き、そ

の汁三升を服す。(肘後方) 【婦人の腰痛】方は上に同じ。 【月經の澀滯】藁荷根を細

かに切つて水で煎し、二升を空心に酒を入れて和して服す。(經驗方) 【風冷失聲】咽

喉の利せぬには、藁荷根二兩の擣汁を絞り、酒一大盞を入れて和勻し、少しづつ服

して瘥を取る。(肘後方) 【傷寒時氣】溫病の初期で、頭痛し、壯熱し、脈盛なるには、

生藁荷根、葉を合せ擣いて汁を絞り、三四升を服す。(肘後) 【雜物の目に入つたとき】

白藁荷根の心を取つて擣き、汁を絞つて目中に滴らす。立ろに出る。(普濟方)

(二) 麻 黄 (本經中品)

和名 まわう
學名 Ephedra sinica, Steudel.
科名 まわう科(麻黄科)

釋 名

龍沙(本經) 卑相(別錄) 卑鹽(別錄) 時珍曰く、これ等諸名の意味

は一向に解らぬ。或は、その味が麻し、その色が黄なるを表したのでといふが、果

して然りや否やは^{つまびらか}審でない。張揖の廣雅には『龍沙とは麻黄のこと、狗骨とは麻

黄の根のことだ』とあるが、何を根據にかかる區別をしたものか判らない。

ノハ即チ此品デアアル
ソシテ我邦ニハ野生
ハナイ、昔ハいぬど
くニ (*Platanus cele-
ngium, Walp.*) ナ
麻黄ト誤認シタコト
ガアツタ。


木村(康)曰ク、まわ
うニハ從來 *Q. wil-*
gevis, Rich. var.
helvetica Ho k. et
Thompson ト云フ學
名ヲ充テタルモ、元
來此學名ハ *Holken*
Thompson 兩氏が印
度ニ於テ採集セル麻
黄屬ノ一種ニ附シタ
ル名稱ニシテ、從來
此學名ヲ漫然ト支那
產麻黄ニモ用キタリ
麻黄屬ノ大家 *Went-*
Pelt 氏ニヨレバ支那ヨ
リ生薬トシテ輸出ス
ル麻黄ハ未ダ曾テ記
載サレタル事ナキ新
種ニ屬シ、同氏ハ假
名之ヲ *E. stricta*
Stamps ノ學名ヲ以
テ呼ブベシトナス、

集解

別錄に曰く、麻黄は晉地、及び河東に生ずる。立秋に莖を採り、陰乾して青くする。弘景曰く、今は青州、彭城、滎陽、中牟の産が勝れたもので、色が青く、沫が多い。蜀中にもあるが好くない。

恭曰く、鄭州の鹿臺、及び關中の沙苑の河邊、沙洲の上に最も多く、同州の沙苑の地がやはり多い。青、徐州のものは一向に用をなさぬ。

禹錫曰く、按ずるに、段成式の酉陽雜俎に「麻黄は莖の頭端に花を開く。花は小さく黄色で叢生する。子は覆盆子のやうで食へるものだ」とある。



〔黄 麻〕

頤曰く、今は汴京の附近に多くあるが、滎陽、中牟のものが勝れてゐる。春苗が生え、夏五月になれば長さ一尺ほどになり、梢上に黄花が咲き、實を結ぶ。實は百合瓣のやうで小さく、また皂莢子に似たものだ。味は甜く、微し麻黄の氣があり、外皮が紅く、裏に仁がある。子は黒く、根は紫赤色だ。俗説に、この物には雌、雄

其他 *H. equianum*, *Burke*. モ亦生藥中ニ混在ス。原産地ニ於テハ前者ヲ草本麻黃後者ヲ木本麻黃ト稱シテ區別ス。歐洲ニ自生シ *Decker* 氏ガブソイドエフエドリシヲ輸出シタル麻黃ハ *E. valeriæ*, *Tiehl.* (= *E. hevedii*, *C. A. Meyer*) ナ *H. Hooker*, *Tenison*. 爾氏ガ嘗テ印度ニ於テ採集セルモノト後ニ *Stamper* 氏 *H. intermedia*, *Seidenf.* et *C. A. Meyer* var. *thuidia* *Sampl.* ト號メタリ。文獻 — *O. Slumpf.* *Kew Bull.* (1927) 183. *O. Turw. Ill.* *Ann. Pharm. Ass. G.* 16 (1927) 135. (一) 管地ハ永部井泉水ノ註、金部鑛ノ奉、管ノ註參照。河東ハ山草類甘草ノ註ヲ見ヨ。 (二) 青州ハ石部雲母ノ註ヲ見ヨ。彭城

の二種あつて、雌は三月、四月の内に花を開き、六月子を結ぶ。雄は花がなく、子を結ばないといふ。立秋後になつて莖を採收して陰乾する。

時珍曰く、その根は皮の色が黄赤で、長いものは一尺近くもある。

附 録

雲花子

時珍曰く、按ずるに、葛洪肘後方に、馬疥はひを治する雲花草といふがあつて、その説明に『形狀は麻黄のやうで、中が堅く實したものだ』とある。

莖 修 治

弘景曰く、これを用ゐるには、節根を折り去り、水で煮て十餘沸するのだが、その時竹片で上に浮ぶ沫を掠すくめ去る。沫は煩を起さしめ、根節は能く汗を止めるものだからだ。

氣 味

【苦し、溫にして毒なし】別錄に曰く、微溫なり。普曰く、神農、雷公は苦し、毒なしといひ、扁鵲へんじやくは酸しといひ、李當之は平なりといふ。權曰く、甘し、平なり。元素曰く、性は溫、味は苦くして甘く辛い。氣味共に薄く軽く清く、浮であり陽であり、升である。手の太陰の藥であつて、足の太陽の經に入り、兼て手の少陰、陽明に走る。

ハ石部石膏ノ註ヲ見
ヨ。蒙陽ハ石部滑石
ノ註ヲ見ヨ。中牟ハ
石部附錄諸石紫石華
ノ註ヲ見ヨ。

〔考〕鄭州ハ中牟ノ西
今ノ河南省鄭縣ノ地
ナリ。鹿臺ハ古殷ノ
都朝歌ノ著財處ナリ
シトイフ。今ノ河南
省淇縣ノ地ナリ。

〔註〕關中、一本ニ關
中トアリ、或ハ關中
トスレバ、次ニ復タ
同州沙苑ト稱シタル
ハ怪ムベシ。同州亦
關中ノ地ナリ。

〔考〕同州沙苑、同州
ハ石部凝水石ノ註ヲ
見ヨ。沙苑ハ今ノ陝
西省大荔縣南渭、洛
二水ノ間ニ在リ。山
草類防風ノ註參照。
〔考〕徐州ハ芳草類藹
車香ノ註ヲ見ヨ。

〔考〕雲花子

〔和名〕無し〔學名〕

〔科名〕共に未詳。

〔考〕木村〔康〕曰ク、
生藥麻黃ハ麻黃根ト

時珍曰く、麻黃は微苦にして辛く、性は熱であつて輕揚する。僧繼洪は『中牟の麻黃のある土地は冬季にも雪が積らぬ。それは内から陽を泄らすがためだ。故に過量に用ゐれば眞氣を洩らす』といつてある。これに由つて觀れば、性の熱なることが判る。麻黃を服して自汗の止まぬときは、冷水で頭髮を浸してから〔搗法を用ゐれば直ちに止まる。凡そ麻黃の藥を服したときは、一日間風に當らぬやうにせねばならぬ。さうせぬと病がまた發るものだ。凡そこれを用ゐるには、必ず黃芩を佐とすれば赤眼になる虞がない。』

之才曰く、厚朴、白薇が使となる。辛夷、石膏を惡む。

主治

〔中風、傷寒、頭痛、溫瘧には、表を發し、汗を出す。邪熱の氣を去り、欬逆上氣を止め、寒熱を除き、癥堅、積聚を破る〕〔本經〕『五臟の邪氣（二）緩急風の脅痛（一）字乳の餘疾。好んで唾するを止め、腠理を通じ、膿を解し、邪惡の氣を洩し、赤、黑斑毒を消す。多く服してはならぬ。人體を虛せしめる〕〔別錄〕『身體外部の毒風癰痺で皮肉不仁なるを治し、壯熱溫疫、山嵐瘴氣に主效がある〕〔甄權〕『九竅を通じ、血脈を調へ、毛孔、皮膚を開く〕〔大明〕『營中の寒邪を去り、衛中の

稱スル木本部ヲ除キタル地上莖ノ部分ナリ。

(成分) 麻黃ハアルカロイド〇・三%ヲ含有シ、主成分ハエフエドリンニシテ傍ラ少量ノブソイドエフエドリン、ノルブソイドエフエドリンヲ含有ス、歐洲產麻黃ハエフエドリンヲ含有セズシテ其立體異性體ナルブソイドエフエドリンノミヲ含有ストナサレタルモ、近年獨逸メルグ製藥工場ニ於テ歐洲產麻黃ヨリモエフエドリンヲ製造シ、其際ブソイドエフエドリンハ極メテ少量ニ調生スルニ過ギズトイフ。

麻黃ノ水製エキスを約十六%ノ灰分ヲ含有シ、其内カリウム鹽類最多量ナリ(灰分中カリウム二九・七%カルシウム一〇・〇%)

風熱を洩す【元素】『赤目腫痛、水腫、風腫、産後の血滯を散ず』(時珍)

發明

弘景曰く、麻黃は傷寒を療じ、賸を解する第一の藥である。

頤曰く、張仲景の傷寒を治するものに、麻黃湯、及び葛根湯、大、小青龍湯があつて、いづれも麻黃を用ゐてある。(二四)肺痿上氣を治するものに、射干麻黃湯、厚朴麻黃湯があつて、いづれも大方だ。

杲曰く、『輕は實を去るもので、麻黃、葛根の屬をいふ』とあつて、(二五)六淫、有餘の邪が陽分、皮毛の間に客として遊寓すれば、腠理が閉拒して營、衛、氣、血が行はなくなる。故にこれを實といふのであつて、右の二藥は輕、清の標準的なものだからその實を去り得るのだ。麻黃は微苦にしてその形態は中が空だ。陰中の陽であつて、足の太陽、寒水の經に入る。その經は背に循つて下行するもので、本來寒なところへまた更に外寒を受けたのだから、汗を發して皮毛の氣分の寒邪を去り、それに依つて表の實を泄すべきものである。しかし若し過度に發すれば、發汗過多のために亡陽するものだ。故に飲食、勞倦、及び雜病で自汗し、表の虛する病證の場合には、これを用ゐれば元氣を脱する。絶対に禁ぜねばならぬ。

(藥理) 鹽酸エフニドリンノ水溶液ハ膀胱作用ヲ有シ、一〇％溶液ヲ點眼スル時ハ四〇―六〇分後ニ散瞳シ五―二〇時間持續ス、此作用ハアトロヒント異リ交感神經ノ刺戟ニヨルモノノ如シ、其ノ他一般生理的作用中著シキモノハ血壓ノ上昇發汗等ノ現象ニシテ、生理作用概シテアドレナリンニ類似スルハ兩者ノ化學的構造ノ近似セルニヨルナルベシ、鎮咳藥トシテ特ニ喘息ニ著效ヲ奏スルハ氣管支筋ヲ弛緩セシムルニヨルモノノ如シ。

好古曰く、麻黄は衛の實を治する藥、桂枝は衛の虚を治する藥である。この二物は太陽の證に對する藥ではあるが、その實は營、衛の藥なのであつて、心は營が血となる働を主るものであり、肺は衛が氣となる働を主るものだから、麻黄は手の太陽、肺の劑、桂枝は手の少陰、心の劑である。傷寒、傷風の欬嗽に麻黄、桂枝を用ゐるは、即ち湯液の原則だ。

時珍曰く、麻黄は肺の經に對する專藥である。故に肺の病を治すのに多くこれを用ゐ、張仲景は、傷寒の汗無きを治するに麻黄を用ゐ、汗有るを治するに桂枝を用ゐてある。歷代明醫の解釋は、いづれも記述の文字上から體會するだけで、その對症上の精微な關係に至つては未だ研究されてゐなかつた。時珍は、これに就いて潛心研究の結果、それ等既往の人人の見解と同じからぬ一の徹底的見解に到達し得たやうに思ふのである。

余の見解に據れば、津液は汗であり、汗、即ち血であつて、營に在つては血といひ、衛に在つては汗といふのである。そもそも寒が營を傷へば、營血は内に滯つて外に衛に通ずることが不能になり、ために衛氣は閉固して津液が順調に行らなくなる。

呼吸頻數増大ス末梢
血管ニ對シテハ擴張
作用ヲ有ス。

(文獻)長井長義——

藥誌一二〇(明二五)

一〇九、一二一(同上)

一八一、一二七(同上)

八二三、一三〇(同上)

一一八六、一三九(同上)

上)九、一七、

R. E. Read and C.

T. Feng: Chinese

Jour. Physiol. 1

(1927) 235.

S. Smith: J. Chem.

Soc. (1928) 51.

S. Smith: J. Chem.

Soc. (1927) 2056.

Merk's Periclo 13

(1893)

藥誌五五六(昭、三)

六四三、五五〇(昭、

二)一〇六六。

最井長義、金尾清造

——藥誌五五九(昭、

三、八四五。

河野孝——藥誌五六

故に汗無く、發熱して寒を憎むのだ。また風が衛を傷へば、衛氣は外に泄れて内に營を護ることが不能になり、ために營氣は虛弱して津液が強固でなくなる。故に汗が有り、發熱して風を惡むのだ。

かやうな次第で、風、寒の邪はいづれも皮毛から入るが、皮毛は肺の合であつて、肺は衛氣の身體全部を統轄する働を主るものだ。天の象である。さればその證は太陽に屬するとはいひ、事實は肺が邪氣を受けるのであつて、時に兼ねて顔面に赤色を呈し、怫鬱し、欬嗽し、痰喘があつて胸滿する等の諸證は肺の病に相違ない。蓋し皮毛が外に閉づれば邪熱が内攻する。そこで肺の氣が鬱するのだ。故に麻黃、甘草と共に桂枝を用ゐ、營分にある邪を引き出して肌表に達せしめ、杏仁を佐として肺を泄し、氣を利する。また發汗後に大熱なくして喘するものには石膏を加へるのだ。朱肱の活人書に『夏至後には石膏、知母を加へる』とあるも同じ理由で、いづれも肺の火を泄する藥なのだ。かやうなわけで、麻黃湯なるものは太陽、發汗の重劑ではあるが、事實は肺の經の火鬱を發散する藥なのである。

また腠理が密ならぬときは、津液が外に泄れて肺氣が自ら虛する。『虛するときは

一(昭、三)一〇九六。
三浦謹之助——Bot-
lin, Klin. Woch. 31
(1887) 707.

Olom. and Schmidt:
J. Exp. Pharmacol.
34 (1924) 33.

久保田清光——治療
及處方四二六・一二
藤井美知男——滿
賢、四(大・一四)五
六。

二〇〇證治準繩ニハ以
根節煎湯止之トア
リ。

二二木村(康)曰ク、
麻黄ハ漢藥トシテ重
要ナルモノナレドモ
其鹽酸エフエドリ
ンノ原料トシテ用キ
ラレ、又新藥フスト
ール(大阪黒田藥品商
會)ハ麻黄ト桔梗ト
チ主原料トシテ他藥
ヲ配伍セルモノニシ
テ祛痰鎮咳劑ナリ。
二二緩風ハ脚氣、緩

その母を補ふ』とある通り、それには桂枝と共に甘草を用ゐて、外には風の邪を散じて表を救ひ、内には肝、木を抑制して脾を保護し、佐としては芍薬を用ゐて、木を泄して脾を強固にする。東を泄するは結果に於て西を補ふことになるのだ。使としては薑、棗を用ゐて、脾の津液を行らして營、衛を調和せしめる。また下して後微喘するには、厚朴、杏仁を加へて肺の氣を利し、發汗後に脈の洗滌なるには、人參を加へて肺の氣を益す。朱肱が、黄芩を加へて陽且湯といつたのは、肺熱を瀉するが目的であつた。これ等はいづれも脾と肺との藥なのである。かやうなわけで、桂枝なるものは太陽、解肌げきの輕劑ではあるが、事實は脾を調節し肺を救ふの藥なのである。以上は千古未發の祕旨として余は茲に公表する。

又、少陰の病で發熱し、脈の沈なるに對しては、麻黄附子細辛湯、麻黄附子甘草湯がある。少陰と太陽とは表裏をなすもので、趙嗣眞の所謂孰附を麻黄に配するは、補中に發するところあらしめるのだ。ある二〇〇錦衣は、夏季に徹夜して酒を飲んだために、水泄を發して數日續いて止まず、飲食物は悉く不消化のまゝ排出した。分利、消導、升揚の諸藥を服すると、反つて劇しくなる。時珍が診ると、脈は浮にして緩で

急風ハ脚氣ノ急ナル
モノカ未詳。

(三)字乳ハ生育チ云
フ、餘疾ハ産後ノ病
氣ノコトサラン。

(四)金陵木肺痿ニ作
ル。

(五)六淫ハ風、熱、
濕、寒、燥、火ノ過度
ナルチ云フ。

(六)合ハ外廊ノ意。

(七)生理上天ニ比ス
ベキモノデアアル。

(八)明時代ニ衛官チ
錦衣ト稱ス。

あつた。大腸は下努して痔血さへ出てゐる。これは肉を食ひ、生物、冷物、茶、水な
どを難多に過食したために、陽氣が抑遏されて下に在り、木盛土衰の状態となつた
ので。素問に所謂『久風飧泄と成る』の状態だ。原則として升、揚の方法を講ずべ
きものである。そこで小續命湯を投じたところ、その一服で癒えたのであつた。
昔、仲景が、傷寒で六七日を經過し、大いに下して後、脈が沈遲し、手、足厥逆し、
咽喉利せず、唾に膿血を出し、泄利止まざるを治するに、麻黃湯を用ゐてその肝、肺
を平調にし、兼ねて外發せしめた方法は、やはり同一理論であつた。神にして之を
明むとはかかる類をいふのである。

附方

舊五、新七。

【天行熱病】初期一二日には、麻黃一大兩を節を去り、水四

升で煮て沫を去り、二升を取つて滓を去り、米一匙、及び鼓を入れて稀粥にし、豫

め湯浴してその粥を食ひ、寢具を厚く被て汗を取れば癒える。(孟詵必用方) 【傷寒雪

煎】麻黃十斤を節を去り、杏仁四升を皮を去つて熬り、大黃一斤十二兩の三藥を用

ゐ、先づ雪水五碩四斗に麻黃を漬けて東向きの竈の釜に納れ、三晝夜後に大黃を入
れて攪き勻ぜ、桑薪で二碩までに煮て滓を去り、杏仁を入れて共に六七斗までに煮て

（九）大觀ニ傷寒類要
ニ作ル。

滓を絞り去り、銅器に移し、更に雪水三斗を入れて二斗四升までに合煎する。かくて藥に出來上つたものを彈子大の丸にし、病者に施す場合は、沸騰した白湯五合にその一九を研つて服ませる。立ろに汗が出るものだ。なほ瘧えぬときは更に一九を再服する、藥を貯藏するには氣の洩れぬやうに封ぜねばならぬ（千金方）『傷寒黃疸』表熱するには、麻黃醇酒湯が主效がある。麻黃一把を節を去つて綿に裹み、美き酒五升で半升に煮取り、頓服して少し汗を取る。春季には水で煮る（二九）（千金方）『裏水黃腫』張仲景は『全身、顔面が黃腫し、脈が沈し、小便利せぬには、甘草麻黃湯が主效がある。麻黃四兩、水五升を煮て沫を去り、甘草二兩を入れて三升に煮取り、一升づつを服して寢具を重ねて汗を出す。發汗せぬときは再服する。風、寒を慎まねばならぬ』といつてある。○千金方には『氣急を患つて久しく瘥えず、水病に變じて腰以下の腫れるものがある。それには此の藥で汗を發するがよし』とある。『水腫で脈の沈するもの』少陰に屬する。その脈の浮なるは氣虛である。脈るものは皆氣であつて水ではない。麻黃附子湯で汗を出す。麻黃三兩、水七升を煮て沫を去り、甘草二兩、附子を炮いて一枚を入れて二升半に煮取り、一日三回、八分づつを服し

(二〇)戸咽ハ咽喉ニ瘡
ナ生ジテ痛痒スルモ
ノ。

(二一)仙源縣ハ宋ニ置
ク、今ノ山東省曲阜
縣治ナリ。

て汗を取る。(張仲景金匱要略) 【風痺冷痛】麻黄を根を去つて五兩、桂心二兩を末にし、

酒二升で慢火で餲たうのやうに熬り、一匙づつを熱酒で調へて服す。汗の出るを度とす
る。風を避ける。(聖惠方) 【小兒の慢脾】風である。吐、泄の後に起るものだ。長さ

五寸の麻黄十箇を節を去り、指の面ほどの白朮二塊、全蠍二箇を生薄荷葉で包んで
煨わいいて末にし、二歳以下は一字、三歳以上は半錢を薄荷湯で服す。(聖惠方) (二〇)戸咽痛

痺ひ】語聲の出ぬには、麻黄を青布で裏み、箇の中で烟に焼いて熏ずる。(聖惠方) 【産

後の腹痛】及び下血の盡きぬには、麻黄を節を去つて末にし、一日二三回、方寸匕

づつを服す。血が下り盡きて止まる。(子母秘錄) 【心下悸病】半夏麻黄丸——半夏、

麻黄等分を末にし、煉蜜で小豆大の丸にし、一日三回、三丸づつを飲で服す。(金匱

要略) 【痘瘡の倒靨】寇宗奭曰く、鄧州の麻黄を節を去つて半兩に蜜一匙を入れて

共に炒り、良久して水半升で煎じ、數沸して沫を去り、再び煎じて三分の一を減じて

滓を去り、熱に乗じて一服し、風に當らぬやうにする。その瘡は再び出るものだ。あ

る法では、無灰酒で煎じるが、その效更に速だ。(二二)仙源縣の筆工李用之の子が斑瘡

を病み、風、寒のために倒靨たうせんとなつて苦しんだが、この藥一服で直ちに出た。神の如

（二二）一秤ハ十五斤。

（二三）陰人ハ女子及ビ去勢セル男子ヲ云フ。

きものであつた。【中風諸病】麻黄（二二）一秤を根を去り、王相日、乙卯の日に東流水三石三斗を取つて、清淨な鍋にその水五七斗とその麻黄を入れ、先づ五沸煮て沫を掠め去り、漸次に水を添へ盡して三五斗までに煮て麻黄を漉し去り、よく澄み切つてから滓を漉し去つて清んだものを取り、再び一斗までに熬つて再び澄し再び漉し、その汁を再び一升半までに熬つて密封して貯藏する。それで一二年は保存し得るものだ。それを一二匙づつ熱湯で溶かして服し、汗を取るのである。熬る時には必ず間斷なく攪き廻して底に若かぬやうにせねばならぬ。底に著けば藥が焦げて了ふ恐があるからだ。同時に雞、犬、陰人に見られることを忌む。これは劉守眞の祕方である。（宣明方）

根節

氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【汗を止める。夏季には粉

に雜せて撲つ】（弘景）

發明

權曰く、麻黄の根節で汗を止めるには、故竹扇を杵いた末と共に撲つ。

又、牡蠣粉、粟粉、并に麻黄根等分を末にして生絹の袋に盛つて貯へ、盜汗の出るときそれを撲つて手で摩擦する。時珍曰く、麻黄は發汗の氣が速で禦ぎ難いほどの

(二) 癰疽、瘰癧、陰性ノソ
リカヘリ病、卒中腦
貧血ノ類。

ものだが、根節は汗を止める効力が影の如く響の如きものだ。かやうに物の理の妙は測り知られぬものである。自汗には、風濕、傷風、風溫、氣虛、血虛、脾虛、陰虛、胃熱、痰飲、中暑、亡陽、(三) 柔癰等種種の病證はあるが、いづれもその證に隨つてこれを加へ用ゐるがよいのである。當歸六黃湯に麻黃根を加へれば、盜汗を治するに尤も速だ。蓋しその性が能く全身の肌表に行るものだから、能く諸藥を導いて外に衛分に達し、腠理を固めるのである。本草では、撲つ方法だけは知つてゐるが、服餌する功力の尤も良好なるをば知らなかつた。

附 方

新八。

『盜汗、陰汗』麻黃根、牡蠣粉を末にして撲つ。『盜汗の止まぬ

もの』麻黃根、椒目等分を末にし、一錢づつを無灰酒で服し、外用としては、麻黃根、故蒲扇(二)を末にして撲つ。(奇效良方)『小兒の盜汗』麻黃根三分、故蒲扇灰一分を

末にし、一日三回、乳で三分づつを服し、乾薑三分と共に末にして三分を撲つ。(古今錄驗)『諸虛の自汗』夜間就寢中甚しきものは、久しく續けば枯瘦するものだ。黃

芪、麻黃根各一兩を、牡蠣を米泔で浸洗して舂いたものと散にし、小麥百粒を水二盞で煎じたもので五錢づつを服す。(和劑局方)『虛汗の度なきもの』麻黃根、黃芪等

(二) 飛麪カドシコ。

分を末にし、^(三)飛麪糊で梧子大の丸にし、浮麥湯で百丸づつを服す。汗止むを度とする。(談禁翁試驗方)『産後の虚汗』黄芩、當歸各一兩、麻黄根二兩を用ゐ、一兩づつを湯に煎じて服す。『陰囊濕瘡』腎に勞熱があるためだ。麻黄根、石硫黄各一兩、米粉一合を末にして傳ける。(千金方)『内外障翳』麻黄根一兩、當歸身一錢を共に黒く炒り、麝香少量を入れて末にし、頻りに鼻から嚙ふ。これは南京相國寺東黒孩兒の方である。(普濟)

木 賊 (宋嘉祐)

和名 とくさ
學名 *Equisetum hyemale*, L.
科名 とくさ科(木賊科)

釋名

時珍曰く、この草は節があつて表面が糙澀なものだ。木骨の細工に用ゐる、木を磋^そき擦れば粗い理が取れて滑になる。それで木の賊といふわけだ。

集解

禹錫曰く、木賊は秦^{しん}、隴^{ろう}、華^{くわ}、咸^{かん}諸郡の水に近い土地に出る。苗は長さ一尺ばかり、叢生するものだ。毎根一幹で、花も葉もなく、一寸位づつに節があつて色は青い。冬を凌^{しの}いで凋^{しお}まない。四月に採收する。

(一) 牧野云フ、木賊ハ廣ク歐洲、北亞弗利加、北亞細亞、北米ノ諸地ニ分布シテ居ル種デ我邦ニモ北日本ニハ山地ニ野生スル、又能ク庭陰ニ栽セラレテ居ル。
(二) 秦州、隴州ハ山草類胡黃連ノ秦隴ノ註參照。華州ハ石部花乳石ノ註、咸州ハ石部齒石類光明鹽ノ註ヲ見ヨ。

及び綜心草（そうしんそう）に似て中が空だ。節があつて麻黄の莖に似てゐるが、やや粗く、枝も花もない。



〔木〕 〔賊〕

頤曰く、所在の水に近い土地にある。

採收に一定の時期はない。現に甚だ多く用ゐられてゐる。

時珍曰く、叢叢皆直上に伸び、長いものは二三尺ある。形状は鳧苴（ふし）の苗、

莖（き） 氣味

【甘く微し苦し、毒なし】

時珍曰く、温である。

主治

【目疾

に用ゐて翳膜（えいまく）を退け、積塊を消し、肝、膽を益し、腸風を療じ、痢を止め、また婦人の月水の斷えぬもの、崩中赤白を止める（嘉祐）。【膿を解し、涙を止め、血を止め、風濕、疝痛、大腸脱肛を去る】（時珍）

發明

禹錫曰く、木賊は、牛角腮（ぎうかくさい）、麝香と配合すれば休息久痢を治し、禹餘糧（うよるぎやう）、當歸、芍藥と配合すれば崩中赤白を治し、槐蛾（かいご）、桑耳と配合すれば腸風下血を治し、槐子、枳實（きじつ）と配合すれば痔疾出血を治す。

（三）木村（康）曰く、とくさハ多量ノ無水砒酸ヲ含有ス。邦藥植（昭、四再版）三六（一）。又歐洲産とくさハ脂肪油、樹脂、樹脂ヲ含ム（U, S, D, 1313, A, T, I, 58 (1986) 117.

震亨曰く、木賊は、節を去つて烘いたものは汗を發する。至つて簡易なものだが、本草では曾て言及してない。

時珍曰く、木賊は、氣は溫、味は微し甘く苦し、中が空で軽い。陽中の陰であつて升であり浮である。麻黄と形を同じくし性も同じものだ。故にやはり能く汗を發し、肌を解し、火鬱、風濕を升散し、眼目の諸血痰を治す。

附方

舊三、新九。

【目昏多淚】

木賊を節を去り、蒼朮を泔に浸し、各一兩を末

にして二錢づつ茶で調へて服す。或は蜜で丸にしてもよし。【急喉痺塞】木賊を牛

糞の火で焼いて性を存し、一錢づつを冷水で服す。血が出て平安になる。(聖惠方)

【舌硬出血】木賊を水で煎じて漱げば止まる。(聖惠方) 【血痢の止まぬもの】木賊五

錢を水で煎じ、一日一回溫服する。(聖惠方) 【瀉血の止まぬもの】方は上に同じ。一

日二回服す。(廣利方) 【腸痔下血】多年止まぬには、木賊、枳殼各二兩、乾薑一兩、

大黃、二錢半、いづれも銚で黒く炒つて性を存し、末にして二錢づつを粟米飲で服

す。甚だ效がある。(蘇頌圖經本草) 【大腸脫肛】木賊を焼いて性を存して末にし、それ

を摻つて揉み込めば止まる。あるひは龍骨を加へる。(三因方) 【婦人の血崩】血氣痛

の忍び難きもの、年久しく、或は目淺くして瘡えぬには、雷氏の木賊散が主效がある。木賊一兩、香附子一兩、朴消半兩を末にし、三錢づつを、黒色のものを下すには酒一盞で煎じ、紅赤色のものを下すには水一盞で煎じ、一日二回 滓と共に服す。臍下の痛むには、乳香、沒藥、當歸各一錢を加へて共に煎じる。生物、冷物、硬物、猪、魚、油膩、酒麪を忌む。(醫聖元戎) 【月水不斷】木賊を炒つて三錢、水一盞を七分に煎じ、一日一回温服する。(聖惠方) 【胎動不安】木賊を節を去つて川芎と等分を末にし、三錢づつを水一盞に金銀一錢を入れて煎じたもので服す。(聖濟總錄) 【小腸疝氣】木賊を細かに剉み、微し炒つて末にし、二錢を沸湯に點て、緩やかに服して效を取る。ある方では、熱酒を用ゐて服す。(寇氏本草衍義) 【誤つて銅錢を吞みたるもの】木賊を末にし、雞子白で一錢を調へて服す。(聖惠方)

附 錄

問前 藏器曰く、味苦し、平にして毒なし。主效は結氣、痞痛、上氣、氣急、煮汁を服す。伊洛の洲渚の間に生ずる。苗は木賊のやうで、節と節とが相接したものだ。一名接續草といふ。

伊洛ハ今ノ河南
省ノ伊水、洛水ノ流
域地方也。

石龍芻 (本經上品)

和名 米 詳
學名 *Juncus sp.* (P)
科名 あ 科 (燈心草科 X (a))

(一) 牧野云フ、釋名、集解ノ文章ヲ按ズルニ何カの類ノ一品デアルト思フ、野生モアレバ栽培モシテ居ル草デアアルガ今遽カニソレガ明メ難イ、然シコレハ本草綱目啓蒙ニ充テテアルヤウニ我が墨ノ材料ニスルコヒゲデハ無イト思フ。

(二) 縉雲縣ハ唐ニ置ク。今ノ浙江省處州府縉雲縣ノ地ナリ。
(三) 處州ハ古ノ縉雲郡ノ地ナリ。土部白堊器ノ註參照。仙臺山、未詳。

釋名

龍鬚 (本經)

龍修 (山海經)

龍華 (別錄)

龍珠 (本經)

懸莞 (別錄)

草續斷 (本經)

縉雲草 (綱目)

方賓 (別錄)

西王母簪

時珍曰く、

草を刈つて、

め束ねたものを芻さうといふ。この草は水石の間に生ずるもので、刈り束ねて馬の飼糧にするところから龍芻りこうさうといったのだ。述異記に『周の穆王きよくわうは東海の島中で八頭の駿

馬を飼養した。そこには龍芻と名ける草がある』とあるはこの草のことだ。故に古

語に『一束の龍芻が化して龍駒りこうことなつた』などといひ、孟子に、芻豢さうくわんとある言葉の

意味はやはり是から出たものだ。龍鬚、王母簪わうもさんは形の形容である。(一) 縉雲しんうんは縣名で、

今は(三) 處州の管内に屬する。その地の仙都山せんとうざんにこの草が生えるところから名稱とな

つたのだ。崔豹さいほうの古今注に『傳說に、黃帝が龍に乗つて天に上る時、群臣がその龍

の鬚に取り著いた。その際鬚が地に墜ちて草になつて生えたのが龍鬚と名ける草だ

といふ』とある。これはでたらめだ。江東に、席を織る材料で西王母席といふ草が

(四) 梁州ハ石部特生
舉石ノ註ヲ見ヨ。

(五) 東陽ハ今ノ浙江
省金華縣ノ地ナリ。

(六) 汾州ハ石部石膏
ノ註ヲ見ヨ。


(七) 沁州ハ山草類黃
耆ノ註ヲ見ヨ。

(八) 石州ハ北周二置
キ、明ニ永寧州ニ改
ム、今ノ山西省離石
縣ノ地ナリ。

(九) 經ハ字彙ニ音延
冠上前後垂覆。

集解

あるが、まさか西王母が虎に乗つて墮した鬚といふわけではあるまい。
別錄に曰く、石龍芻は(四)梁州の山谷、濕地に生ずる。五月、七月に莖
を採つて暴乾する。九節で珠の多いものが良し。



〔草 鬚 龍〕

弘景曰く、莖は青く、細くして相連り、實
は赤い。今は近道の水石の處に出る。(五)東陽
で龍鬚といふ席を作るものに似てゐるが、た
だ節が多いだけである。

藏器曰く、今は(六)汾州、(七)沁州、(八)石州に
産し、また處處にある。

保昇曰く、叢生するもので、莖は(九)經のや
うだ。所在にある。俗に龍鬚草と名けて席に作れるものだ。八月、九月に根を採つ
て暴乾する。

時珍曰く、龍鬚は叢生するもので、形は粽心草、及び鳧芷の苗のやうで直上に伸
びる。夏季に莖端に小さい穂の花を開き、細かい實を結ぶ。いづれも枝葉がない。

(二) 白井曰ク、蘭ノ類ニひらぬ一名はまゐ一名れぢゐト云フモノガアルガ、此ハ莖中ニ節ノヤウナモノガ多クテ此ニ當ルヤウニ思ハル、此ハ甚ダ丈夫ナ物テ草履ノ如キ物ヲ作ルニ適スル。

(一) 牧野云フ、本草綱目啓蒙ニ本品ヲ禾本科ノ一種たつのひげニ充テアレド誤リデアル、コレハゐノ類ノ一品トスル方が中ツテ居ルト考ヘルソシテ之レヲ *lanceus*

現に吳地方では、多く栽培して席を織つてゐる。他の地には自然に生えるものは少い。本經には、明かに『龍芻、一名龍鬚』とある。然るに陶弘景が『龍芻は龍鬚に似てただ二節が多い』といひ、二種別物のやうにいつたのは誤だ。

莖 氣 味

『苦し、微寒にして毒なし』別錄に曰く、微温なり。

主 治

『心腹の邪氣、小便不利、淋閉、風濕、鬼疰、惡毒、久しく服すれば虛癰を補し、身を輕くし、耳目を聰明にし、天年を延べる』本經。『内虛不足、痞滿で身體に潤澤無きを補し、汗を出し、莖中の熱痛を除き、蝨蟲腫、食物の不消化を療ず』別錄。

敗席

主 治

『淋、及び小便の俄かに不通となりたるには、飽くまで敗れて垢のある一尺四方のものの煮汁を服す』(藏器)

(二) 龍 常 草 (別錄有名未用)

和名 未詳
學名 *lanceus* sp.
科名 お科(燈心草科)

釋 名

粽心草

時珍曰く、俚俗に、五月採つて角黍の心を繫ぎ、粽心草と呼ぶものがそれである。

setchuenensis, Benth.
var. effusoides, Hutch.
ニ充テタ人がアルが或ハソレガ本當カモ知レナイト想ハレル。

(一) 牧野云フ、燈心草ハヤハリ支那デモ我邦ト同ジク一面燈心モ採ルガ一面又ハ腐チ織ルニ用キテ居ル、我邦デハ疊ニ造ルモノハ野生ノ粗イモノハ用キズニ田ニ

集 解

別錄に曰く、河水の近傍に生ずる。形狀は龍芻のやうで、冬も夏も生えてゐる。



〔草 常 龍〕

時珍曰く、按ずるに、爾雅に『蘄こは鼠莞そくわんなり』とあるを、鄭樵はこれを龍芻と解釋し、郭璞は『纖細な龍鬚に似たもので、席になる。蜀中に出るものが好い』といつてある。恐らくこの龍常草のことらしい。蓋しこれは龍鬚の小さいだけのものである。故にその功用もやはり相近いのだ。

莖

氣 味

【鹹し、溫にして毒なし】

主 治

【身を軽くし、陰氣を益し、痺、寒濕を療ず】(別錄)

(二) 燈 心 草 (宋 開 寶)

和 名 む、又、むぐさ
學 名 *Juncus effusus*, L. var. *decipiens*, Benth.
科 名 む 科 (燈心草科)

釋 名

虎鬚草 (綱目) 碧玉草 (綱目)

集 解

志曰く、燈心草とうしんそうは江南の澤地に生ずる 叢生するもので、莖は圓く細

栽培シタ細長ナ品ヲ
使用スル。

くして長く直いものだ。一般にこれで席を作る。

宗奭（そうせき）曰く、陝西（せんせい）にもある。蒸熟し乾してから開いて中心の白穢（はくじやう）を取り、燈に燃す

ものを熟草といふ。又、蒸さずに生で乾して剝ぎ取るものを生草といふ。薬に入れるには生草を用ゐるがよい。

時珍（しちん）曰く、これは龍鬚の類のものだ。ただ龍鬚は緊つて小さく、瓢（ひょう）が實してゐる

が、この草はやや粗く、瓢が虚して白い。吳


地方では、これを栽培して、瓢を取つて燈心

にし、草で席や蓑を織る。他の地には野生

のものは少い。外丹家（ぐわいたんか）ではこれで硫、砂を伏す。雷公炮炙論の序に『礪（たう）は赤鬚に遇へ

ば永く金鼎に留まる』とあり、その註に『赤

鬚はまた虎鬚草と呼ぶ。礪を煮るに能く火

を住（さ）めるものだ』とあるが、果してこの虎鬚をいつたものか否か判らない。

〔草 心 燈〕

莖及び根 修治

時珍（しちん）曰く、燈心は研り難いものだが、粳米粉漿で浸しつけ、

(1) 木村(康)曰ク、
 ゐノ鹽(燈心)ハ水分
 七・一五%脂肪六・五
 五%粗纖維三三・一
 六プロテイン一・七
 三%無窒素抽出物
 四二%灰分四・三
 二%及含水炭素キシ
 ラン、アラバン及ビ
 メチルベントザン等
 チ含有ス。大島—
 J. of Sapporo Agric.
 Collg. 3 (1906) 84.
 (2) 陰具ニ發スル疥
 瘡梅毒性ノモノ。

晒し乾かして研末し、水に入れて澄ませると燈心だけが浮き上る。それを晒し乾して用ゐるのだ。

氣味

【甘し、寒にして毒なし】元素曰く、辛く甘し、陽である。吳綬曰く、

淡し、平である。

主治

【五淋には、生で煮て服す。朽敗した席を煮て服するが更に良し】(問寶) 【肺を瀉し、陰癰の瀉して利せざるを治し、水を行り、水腫、癰閉を除く】(元素) 【急喉痺を治するに、灰に焼いて吹くが甚だ速かな效がある。乳の上へ塗つて小兒に飲ませれば夜啼を止める】(震亨) 【心火を降し、血を止め、氣を通じ、腫を散じ、渴を止める。灰に焼き、輕粉、麝香を入れて陰疳を治す】(時珍)

附方

舊一、新九。

【破傷の出血】燈心草を嚼み爛らして傅ければ立ろに止まる。(勝金方) 【衄血の止まぬもの】燈心一兩を末にして丹砂一錢を入れ、二錢づつを

米飲で服す。(聖濟總錄) 【喉風痺塞】瑞竹堂方では、燈心一握を陰陽瓦で焼いて性を

存し、炒鹽一匙を入れ、一捻づつを數回吹き入るれば立ろに癒える。○ある方では

燈心灰二錢、蓬砂末一錢を吹く。○ある方では、燈心、箸葉の焼灰等分を吹く。○

惠濟方では、燈心草、紅花の焼灰一錢を酒で服すれば直ちに消す。【痘瘡の煩喘】

小便不利なるには、燈心一把、鼈甲二兩、水一升半を六合に煎じ、二回に分服する。
(麗安常傷寒論)

【不眠症】夜間眠り難きには、燈草の煎湯を茶の代りに飲めば睡り得る。(集簡方)

【水道を通利する】白飛霞の自制天一丸——燈心十斤を米粉漿に浸し、つけて晒し乾かし、研末して水に入れ、澄まして米粉を去り、淨いたものを取つて晒し乾して二兩五錢、赤、白茯苓を皮を去つて共に五兩、滑石を水飛して五兩、猪苓二兩、澤瀉三兩を、人參一斤を切片して熬膏したもので和して龍眼大の丸にし、硃砂を衣にかけ、一丸づつを用ゐ病に随つて換引する。これは大體小兒の生理が上に向ひ、天一が水を生ずるの妙に本づくものである。諸病に水道通利を圖る捷徑の藥である。(韓氏醫通) 【濕熱黃疸】燈草根四兩、酒、水各半を瓶に入れ、半日煮て一夜露らして溫服する。(集玄方)

燈花燼

火部に記載してある。

本草綱目草部第十五卷終

本草綱目草部

第十六卷

本草綱目草部目錄第十六卷

草の五 陽草類下七十三種

地黃 本經

胡面莽を附す。

牛膝 本經

紫苑 本經

女菀 本經

麥門冬 本經

萱草 嘉祐

槌胡根 拾遺

淡竹葉 綱目

鴨跖草 嘉祐

即ち作葉菜。

冬葵 本經

蜀葵 嘉祐

芑葵 唐本

黃蜀葵 嘉祐

龍葵 唐本

龍珠 拾遺

酸漿 本經

即ち燈籠草。

蜀羊泉 本經

鹿蹄草 綱目

敗醬 本經

即ち苦菜。

迎春花 綱目

欸冬花 本經

鼠麴草 日華

即ち米麴、佛耳草。

決明 本經

地膚 本經

即ち落帚。

瞿麥 本經

王不留行 別錄

剪春羅 綱目

金盞草 綱目

葶藶 本經

車前 本經

狗舌草 唐本

馬鞭草 別錄

即ち龍牙。

蛇含 本經

女青 別錄

鼠尾草 別錄

狼把草 開寶

狗尾草 綱目

鱧腸 唐本 即旱蓮草。

連翹 木經

陸英 木經

蒴藋 別錄

水英 圖經

藍 木經

藍澱 綱目

青黛 問寶 雀翹を附す。

甘藍 拾遺

蓼 木經

水蓼 唐本

馬蓼 綱目

莊草 別錄

毛蓼 拾遺

海根 拾遺

火炭母草 圖經

三白草 唐本

蠶繭草 拾遺

蛇齒草 拾遺

虎杖 別錄

蒼草 拾遺

篇蓄 木經

蓋草 木經

蒺藜 木經

穀精草 問寶

海金沙 嘉祐

地楊梅 拾遺

水楊梅 綱目

地蜈蚣 綱目

半邊蓮 綱目

紫花地丁 綱目

鬼鍼草 拾遺

獨用將軍 唐本

留軍待を附す。

見腫消 圖經

攀倒甌 圖經

水甘草 圖經

右附方 舊一百七十一 新二百九十一

(一) 牧野云フ、地黄ハ必ズシモ唯一種ノミニ限定セラレタモノデハナイヤウデア
ルガ、今往時支那カラ我邦ニ傳ヘタモノ
ナ本品トシテ此コニ其學名ヲ舉ゲテ置ク
ガ、然シ此品ハ多分 Rehmannia glutinosa, Tihosch. ノ一變
種デハナイカト思ハ
レモ、我邦ニ渡來シ
居ル地黄ニ二品アツ
テ一ハ黃白色ノ花ヲ
開クモノ一ハ淡紫色
ノ花ノ咲クモノデ、
甲チ白矢ト呼ビ乙チ
赤矢ト呼ンテ居リ赤
矢ノ方が強壯ナ品デ
且普通品ニ屬スル、
今日デハ白矢品ハ殆
ンド我邦ニ盡キタト
思ハルガ、若シソ
レガ尙存スルナレバ
其種ヲ絶ヤサヌヤウ
ニ充分保護スベキデ

草の五 隰草類下七十三種

(一) 地黄 (本經上品)

和名 ぢわう、きなひめ(古名)
學名 Rehmannia litch, Maxim.
井に Var. purpurea, Makino.
科名 二つのほぐさ科(玄參科)

釋名

苺

音は戸(コ)である。苺

音は起(キ)である。地髓(本經)

大明曰

く、生のものを水に浸して試験して、浮くものは天黃と名け、半ば浮き半ば沈むものは人黃と名け、沈むものは地黄と名ける。薬に入れるには沈むものを佳しとし、半ば沈むものはこれに次ぐ。浮くものは用ゐるに堪へない。

時珍曰く、爾雅に『苺は地黄なり』とあつて、郭璞は『江東では苺と呼ぶ』とい

ひ、羅願は『苺は沈下するものが珍品であつて、價も高い。故に文字は下に從ふのだ』といふ。

集解

別錄に曰く、地黄は咸陽の川澤に生ずる。土地の黄なる處のものが佳い。二月、八月に根を採つて陰乾にする。弘景曰く、咸陽とは長安のことだ、

アル。

(一) 咸陽ハ秦ノ都ニシテ今ノ陝西省咸陽縣ノ東、涇水、渭水ノ合流點ニ近ク古ノ渭城ノ地アリ。即チ古ノ咸陽ノ地ナリ。秦四十郡ノ一、内史ノ治所ナリ。芳草類積弊草ノ註參照。

(二) 長安ハ水部溫湯ノ註チ見ヨ。

(三) 渭城ハ咸陽ノ註參照。

(四) 彭城ハ石部石膏ノ註チ見ヨ。

(五) 歷陽、江寧ハ芳草類當歸ノ註チ見ヨ。

(六) 板橋、即チ板橋浦、今ノ江蘇省江寧縣ノ附近ニ在リ、太平寰宇記ニハ當時ノ江寧縣治ノ南四十里ニ在リトアリ。

(七) 同州ハ石部凝水石ノ註チ見ヨ。

渭城じやうじやうに生ずるものは子があつて、實は小麥ほどのものだ。今はきやうじやう彭城の乾地黄を最良とし、次はれきやう歷陽のものだ。近來は江寧のはんきやう板橋のものを勝れたものとして用ゐる。乾製するには方法があつて、搗汁を和して蒸すのだが、なかなか技巧を要するものだ。此に別錄に『陰乾す』とあるは、恐らく蒸ひして作るには方法を過ち勝ちだからであらう。世間には亦牛膝ごしやうや萎薹みずひで作るものもあつて、一般人にはその識別が付かない。

頤曰く、今は處處にあるが、じやう同州のものを上位とする。二月生え、葉は地に布いて出ることば車前に似てゐる。葉の表面に皺文があつて光らない。高いものは一尺餘にもなり、低いものは三四寸である。花は油麻の花に似て紅紫色だ。また黄色の花のものもある。實は房になつて連翹れんきやうのやうだ。中の子は甚だ細かくして沙褐色である。根は人の手の指ほどで全體が黄色だ。粗、細、長、短一定せぬ。これを栽培するには甚だ簡易なもので、根を土に入れて置けば生えるものだ。一説に、古は、地黄を種くさゑるには黃土がよいといつたさうだが、今はさうでない。肥えた輕虛な土地が甚だよく、根も太く汁も多くなる。その種植法は、徑一丈餘を車輪のやうにみせき葦席

〔註〕懷慶ハ春秋ノ管
ノ地、漢ノ河内郡ノ
地ニシテ後魏ニ懷州
ヲ置キ、元ニ懷慶路
ニ改メ、明ニ府トナ
ス。今ノ河南省沁陽
縣城即チ舊寄治ナ
リ。

で編み圍ひ、その中へ壤土を實して一壇を作り、その上へ又一尺ほど小さく草席で圍つて土を實て、漸次に一尺ほどづつ小さくして、佛塔ぶつたふのやうな幾層かの壇を作り、地黄根の節多きものを一寸ほどづつに斷つて壇の層層へ一面に種ゑ、毎日本水を灌げ



〔黃 地〕

ば繁茂する。かくて春、秋分の時に至つてその上層から取ると、根はいづれも長大になつて、折れもせず斷れもせぬ。掘る時に斬り付けて傷める處がないから、だ。かくて取つた根を暴乾するのである。同州の産は光潤で甘美だ。

宗奭曰く、地黄の葉は甘露子のやうだ。

花は脂麻花のやうだが、ただ細かな斑點がある。北方地方ではこれを牛奶子ゴダマといふ。花の莖に微細な短い白毛がある。

時珍曰く、今一般には、懷慶くわいけいの地黄だけを上等品としてゐる。やはりそれぞれの産地も時代に依つて興廢があり、常に同一様にはないわけなのだ。苗は初生には地

にはり付き、葉は山白菜のやうで毛があつてざら付く、葉の面は深青色だ。また小芥菜にも似てゐるが、頗る厚くして丫字型の岐がない。葉の集つた中から面に細毛のある莖が出て、莖の梢に小さい筒形の紅黄色の花を開き、小麦粒ほどの實を結ぶ。根は長さ四五寸、手の指ほどの細いものだ。根皮は赤黄色で、羊蹄の根、及び胡蘿蔔の根のやうだが、曝乾すれば黒くなる。生で食へば土臭い。俗にその苗を婆婆奶と呼ぶ。古代には子を蒔いたさうだが、今ではただ根を種ゑることになつてゐる。王旻の山居錄に『地黄は嫩苗のうちに旁葉を摘み、菜にして食へば甚だ人體に益がある。本草には「二月、八月に根を採る」とあるが、物の性の上から見て、甚だ安當を得て居らぬ。八月には殘葉がまだ在るもので、葉の中の精氣がまだ完全に根に歸らない。二月には新苗が已に生えるので、根の中の精氣が已に葉の方の滋養に行つてゐる。故に正月、九月に採る方がより多く完全なのだ。又、蒸し曝らすにも都合が宜い。禮記に、羊、豕、豕、豕、豕の文字があるところを見ると、古代から已にこれを食つたものだ』とある。

嘉謨曰く、江浙地方の壤地に種ゑたものは、南方の陽氣を受けるので質は光潤だ

が、力が微弱だ。懷慶の山地に産するものは、北方の純陰を稟^うけるので皮に^き瘰癧^{ろくぎ}があり、力が大きい。

乾地黄 修治

藏器曰く、乾地黄に就いて、本經では、生から乾したものと蒸して乾したものとに言及してないが、醫方上に用ゐるものには、二種それぞれ用途に別がある。蒸して乾したものは温であつて補的作用があり、生で乾したものは平であつて宣^{せん}するものだ。この法則に依つて使用すべきものである。

時珍曰く、本經に所謂乾地黄とは、生地黄をそのまま乾したものである。その製法は、地黄一百斤の中から肥えたもの六十斤を擇^より分け、洗淨し晒して微し舂^うませ、揀り残りの下等品をば、洗淨して木臼で搗いて盡く汁を絞^しり、更に酒を投じて汁を取り、その汁を先の肥えた地黄に拌^まぜて日中に晒し乾かすのだ。或は火で焙乾して用ゐる。

氣味

【甘し、寒にして毒なし】別錄に曰く、苦し、權曰く、甘し、平なり。

好古曰く、甘く苦し、寒である。氣薄く味厚く、沈にして降る。陰であつて、手、足の少陰、厥陰、及び手の太陽の經に入る。酒に浸せば上行し外行する。日光

（本村）曰く、本經ニ於テハあかやむらぎ栽培ミテ藥用ニ充テ、漢藥ニ生地黄、乾地黄、熟地黄

等ノ種類アリ。

藤田直市——藥誌、

大一三(五〇六)圖版一。

(成分)根ハマンニツト及糖ヲ含有ス。

大谷文昭——日本藥學會第四十八總會講演(昭三)

(一)忌ノ字大觀ニ據リ補入ス。

(二)傷中ハ飲食節ヲ失シ房勞度ヲ過ゴシテ内臟ノ氣傷害セラ

ルナリ。

(三)血痺ハ血行ノ障

害ヨリ起ルシビレ。

(四)飽力ハ消化力。

で乾したものは平であり、火で乾したものは温である。功用は同じものだ。元素曰く、生地黃は大寒である。胃弱のものには斟酌して用ゐる。胃氣を損する處があるからだ。

之才曰く、清酒、麥門冬と配合するが良し。貝母を惡み、蕪荑を畏る。權曰く、葱、蒜、蘿蔔、諸血を忌む。人體の營、衛を澀らせ、鬚髮を白からしめるものだ。毀曰く、銅、鐵器を忌む。腎を消耗せしめ、并に髮を白くし、男子は營を損じ、婦人は衛を損ずるものだ。時珍曰く、薑汁で浸せば膈に泥せぬ。酒で修治すれば胃に故障を起さぬ。採つたばかりの生のものを用ゐれば寒であり、乾して用ゐれば涼である。

主治

【(一)傷中】(二)血痺を逐ひ、骨髓を填充し、肌肉を長ずる。湯にして用ゐれば、寒熱積聚を除き、痺を除き、折跌絶筋を療ず。久しく服すれば、身體を輕くし、老衰せぬ。生が就中良し【(本經)】【男子の五勞、七傷、婦人の傷中、胞漏下血に主效があり、惡血、溺血を破り、大、小腸を利し、胃中の宿食、飽力の斷絶を去り、五臟内傷の不足を補し、血脈を通じ、氣力を益し、耳、目を利す】(別錄)【心

膽の氣を助け、筋骨を強くし、志を長じ、魄を安じ、魄を定め、驚悸、勞劣、心、肺損の吐血、鼻衄、婦人の崩中、血運を治す【大明】「産後の腹痛、久しく服すれば、髪の白きを黒く變じ、天年を延べる」【竇權】「血を涼し、血を生じ、腎水の眞陰を補し、皮膚の燥を除き、諸濕熱を去る」【元素】「心病で掌中が熱痛するもの、脾氣で痿癭し、横臥を好み、足下の熱して痛むものに主效がある」【好古】「齒痛、唾血を治す」

生地黃

主治

【大寒なり。婦人の崩中で血の止まぬもの、及び産後の血が上に心に薄つて悶絶するもの、身體を傷めたための胎動で下血し、胎の落ちぬもの、墮墜跪折の瘀血、留血、鼻衄、吐血を治す。いづれも搗いて飲む】【別錄】「諸熱を解し、月水を通じ、水道を利す。搗いて心、腹に貼れば、能く瘀血を消す」【竇權】

發明

好古曰く、生地黃は手の少陰に入る。又、手の太陽の劑である。故に

錢仲陽は【大明】丙火を瀉するに木通と共に用ゐた。以て【大明】赤を導いたのである。諸經の血熱には、他の藥と共に用ゐてそれぞれ能く治效を舉げる。滑血、便血にも皆同様だ。

（五）丙トハ心臟ヲ指ス。
（六）赤モ心臟ヲ指ス。

權曰く、患者が虚して熱多き場合に加へて用ゐるがよし。

（七）煎熬ハ濃厚ニナル意。

戴原禮曰く、陰微にして陽盛なために、相火が熾さかんで強壓的に陰の範圍を壓迫し、日に日に漸次に（七）煎熬して虚火の證となつたものには、地黄の屬を用ゐて陰を滋盛にし、陽を退くべきものである。

宗奭曰く、本經には、ただ乾、生の二種のみを舉げて熟せる者には言及してないが、血虚の勞熱、産後の虚熱、老人の中虚燥熱の場合には、生、乾のものを與へては大寒ならしむるの處あたれがある。故に後世では、蒸し曝し熟したものをを用ゐることに改めた。生と熟とではその功力に甚しい區別があるから明確な注意を要する。

時珍曰く、本經の所謂いふる乾地黄は、陰乾、日乾、火乾のものをいふ。故にまた『生なるもの尤も良し』といつてある。別錄にはまた『生地黄とは、新たに掘つた新鮮なものだ』とある。故に性は大寒なりといつたのだ。熟地黄なるものは、後世更に蒸し晒さらして作つたものことで、諸家の本草に、いづれも乾地黄を指して熟地黄としてあるが、主治の病證は同一だけれども、功果に於て、血を涼ひやずると血を補するとに稍異るところがある。故に本書には、熟地黄の一條を別つて次に記載する。

(二八) 去字ハ大觀ニ據ル。

熟地黄

修治

頤曰く、熟地黄を作る方法は、肥えた地黄二三十斤を洗淨し、別に揀り(二八)去つた瘦せて短いもの二三十斤を搗いて絞り取つた汁を石器の中に入れて、肥地黄を甑(こ)に入れたままその汁に浸し漉してよく浸み徹らせ、かく三四回浸し漉しては蒸して暴し、更に幾度もまた浸し漉して蒸す毎に暴し、汁全部が盡きるまで繰返す。かくすると肥地黄は漆のやうに黒光がして、味は飴(あめ)のやうに甘くなる。それをば甕器(じき)に取つて貯藏する。それは脂柔(じり)でよく潤ひ易いものだからだ。

穀曰く、生地黄を採り、皮を去つて柳木甑に入れ、甕鍋の上で蒸して取り出し、ひろげて蒸氣を無くしてから酒を拌(まぜ)ぜて再び蒸し、又出して乾すのである。銅、鐵器に觸れてはならぬ。腎を消耗(せうぼう)し、また髪を白くし、男子は營を損じ、女子は衛を損ずるものだからだ。

時珍曰く、近頃の製法は、水に沈む肥大なものを揀り取り、縮砂仁末(しゆくしゃにんまつ)を入れた好き酒の中へ入れて、かき拌(まぜ)ぜ、柳木甑に盛つて瓦鍋の中へ入れ、蒸して氣を透(とほ)らせて暴し乾し、再び砂仁酒を拌(まぜ)ぜて蒸し暴らす。かく蒸し暴すこと九回繰返して止めるのである。蓋し地黄の性は泥(ちつ)むものだから、砂仁の香しくして滲み込む性質を配合

するのであつて、五臓の冲和ちゅうわの氣を合和して丹田に納り落付かすことを目的とするのだ。現に商店でただ酒で煮熟して賣つてゐるものは用ゐられない。

氣味

【甘く微し苦し、微温にして毒なし】元素〇〇曰く、甘く微し苦し、寒で

ある。酒の力を假かりて晒し蒸せば、微温にして大いに補の功がある。味厚く氣薄し、陰中の陽であり、沈であつて、手、足の少陰、厥陰の經に入る。外部を治し、上部を治するには、酒で製したものを用ゐるがよし。蘿蔔らふ、葱そう、蒜さん、諸血を忌む。牡丹皮、當歸と配合すれば血を和し、血を生じ、血を涼し、陰を滋くし、髓を補す。

主治

【骨髓を填め、肌肉を長じ、精血を生じ、五臓内傷の不足を補し、血脈

を通じ、耳、目を利し、鬚髮を黒くする。男子の五勞、七傷、婦人の傷中、胞漏、月經不順、妊娠、出産のあらゆる疾病】時珍【血氣を補し、腎水を滋くし、眞陰を益し、臍腹せいふくの急痛、病後脛、股の酸痛を去る】元素【坐して起たんとするとき目がぐらぐらして物の見えぬもの】（好古）

發明

元素〇〇曰く、地黄は、生は大寒で血を涼ず。血熱の者に用うべきものだ。

熟は微温で腎を補す、血の衰へた者に用うべきものだ。又、臍下痛せいかつうは腎の經に屬す

（二）湯液本草ニハニ
作ル之ヲ正トス、然
レドモ其用キル所ハ
乾地黄ニシテ熟地黄
ニ非ズ。
（三）癸ハ水ニシテ腎
臟ヲ指シ、乙ハ木ニ
シテ肝臟ヲ指ス。

る。熟地黄以外では除き得ない。これは通じて腎の薬なのだ。

好古曰く、生地黄は、心の熱、手、足の心の熱を治し、手、足の少陰、厥陰に入り、能く腎水を益し、心血を涼ずる。脈の洪、實なるものに適する。脈が虚する者ならば熟地黄がよい。火力を假りて九回蒸すものだから、能く腎中の元氣を補するのだ。仲景の（一）六味丸は、これを以て諸薬の首、天一所生の源としてある。湯液の四物湯は、血を藏する臟器を治するもので、これを以て君薬としてある。癸と乙とは共に一治に歸するものだ。

時珍曰く、按ずるに、王傾の易簡方に『男子の陰虚の傾向多きには熟地黄を用ゐるがよく、婦人の血熱の傾向多きには生地黄を用ゐるがよい』とあり。又『生地黄は能く精血を生じ、天門冬はその生ずる作用の存する當體まで導き入れる。熟地黄は能く精血を補し、麥門冬はその補の作用を受くべき當體まで導き入れる』とある。虞搏の醫學正傳には『生地黄は血を生ずるものだが、胃氣の弱い者が服すれば食物の消化を妨げる虞がある。熟地黄は血を補するものだが、痰飲の多い者が服すれば膈に泥むの虞がある』とある。或は、生地黄は酒で炒れば胃を妨げず、熟地黄は薑

汁で炒れば膈に泥まないとはいふ。これはいづれも地黄使用法の精微を得たものだ。

頌曰く、崔元亮の海上方に『發病の新、久を問はず、一切の心痛を治するには生

(二二) 餅飢ハスキト
シ。

(二三) 冷淘ハナガシモ
ノ寒天ニテ作ル。

(二四) 壁宮ハ守宮ノ一
名ニシテヤモリヲ云

フ。

地黄一味を用ゐる。患者の食ひ得るだけの量を搗いて汁を絞取り、麪にまぜて(二二) 餅飢を作り、或は(二三) 冷淘にして食ふ。良久して必ず頭の形が(二四) 壁宮に似た長さ一尺ばかりの蟲を利出して、その後は復びその病に罹らぬものである。昔、ある者がこの病を二年の間患ひ、非常に不治を残念がつてゐたが、臨終に家人を喚んで「この身が死んだら、解剖してこの病の本源を取去つてくれ」と遺言した。死後遺言に従つて解剖すると、果して蟲が居た。そこでその蟲を取つて竹筒中に入れ、食事毎に膳部のものを與へて飼つてゐたが、地黄の餅飢を作つたとき、やはりそれを與へると、その蟲は忽ちは壞爛して了つた。これから右の方を得たものだ』とある。劉禹錫の傳信方にもこの蟲のことを記載して『貞元十年に、通事舍人崔抗の娘が心痛を患つて瀕死の危篤に陥つた。その際地黄冷淘を作つて食はせると、忽ち堅墓のやうな形狀で、足も目も無くて口ばかりはあるやうな、方寸じばかりのある物を吐出して遂に癒えた。その冷淘には鹽を著けてはならない』とある。

附方

舊十三、新五十一。

【服食法】地黄根を洗淨し、搗いて汁を絞り、ねばる

までに煎じて白蜜を入れ、更に丸にし得るまでに煎じて梧子大の丸にし、毎早朝溫酒で三十丸を服し、日毎に三回服す。また青州の棗（さう）を和して丸にするもよし。或は別に乾地黄末を膏に入れて丸にして服するもよし。百日服すれば顔が桃花（たうけ）のやうになり、三年服すれば身體が輕くなり、老衰せぬ。抱朴子に『楚文子は、地黄を八年間服して、夜中物の形を明かに見た』とある。

（三）乳石ヲ取リトハ
乳石ノ害ヲ去ルノ意
歟、乳ハ石鍾乳、石
ハ石莖其他ノ石藥。

【地黄煎】虚を補し、熱を除き、吐血、唾血を治し、（三）乳石を取り、癰癤（ようせつ）等の疾を

去る。生地黄を多少に拘はらず、三回搗き三回壓搾して盡く汁を取り、瓦器に入れて氣の洩れぬやうに密に蓋（おほ）ひ、それを湯上で半減するまで煮て滓を絞り去り、再び餚のやうに煎じて彈子大の丸にし、一日二回、一丸づつを溫酒で服す。（千金）

【地髓煎】生地黄十斤を洗淨し、搗いて壓搾して汁を取り、鹿角膠（ろくかくかう）一斤半、生薑半斤の絞汁、蜜二升、酒四升を用ゐ、先づ文武火で地黄汁を煮て數沸したところへ、酒で紫蘇子四兩を研つて取つた汁を入れ、一二十沸煎じて膠を入れ、膠が溶けたとき薑汁と蜜を入れて再び煎じ、稠（ねは）るやうになつたとき瓦器に移して取收め、一ヒづ

つを空心に酒に溶かして服す。大いに補益がある。(同上)

(三五)乙ハニ通ズ乙
合ハ一合ヲ云フ。

【地黄粥】大いに血を利し、精を生ずる效能がある。地黄を切つて二合を米と共に罐に入れ、煮て熟した頃に酢二合、蜜乙合を共に香しく炒つて入れ、再び煮熟して食ふ。(麗仙神隱)

【地黄酒】穀部、酒の條を見よ。

【瑤玉膏】常に服すれば、心を聞き、智を益し、髪の白きを黒に返し、齒の落ちたるを更生し、穀食を辟け、天年を延べ、癰疽、勞瘵、欬嗽、唾血等の病を治す。これは鐵甕城の申先生の方である。生地黃十六斤から汁を取り、人參末一斤半、白茯苓末三斤、白沙蜜十斤を濾し淨めてよく拌ぜ、瓶に入れて箬で封じ、砂鍋の中へ入れて三晝夜間桑柴火で煮てから、再び封を換へて蠟紙で二重に封じ、一夜井底に浸して取り出し、再び一伏時煮る。それを一匙づつ白湯、或は酒に點て服する。丹溪は『房事過度で虚した者の欬嗽、唾血には、これを服すれば甚だ速かな效がある』といつてある。我が明朝の太醫院に於ける皇帝の服食進供の規定では、天門冬、麥門冬、枸杞子末各一斤を加へ、名稱を益壽永眞膏と賜はつた。麗仙の方では、琥珀、

ニテ恐クハ各ノ字ヲ
脱ス。

ニセ吸小氣ハ呼吸ノ
吸氣ガ短イモノ。

沈香（ニセ）半兩を加へる。【明日、補腎】生半（じやうはん）、熟半（じやくはん）各二兩、川椒紅一兩を末にして蜜で梧桐子大の丸にし、三十丸づつを空心に鹽湯で服す。（普濟方）【齒を固くし、鬚を烏くする】一には齒痛を治し、二には津液を生じ、三には白鬚を變ず。その功極めて妙である。地黄五斤を柳木甑に入れて土で上を蓋ひ、蒸熟して晒し乾かすこと三回、それを擣いて小さき餅にし、一箇づつを嚙（く）んで嚥（の）む。（御藥院方）【男女の虛損】或は大病後、或は積勞の後、四體が沈滯し、骨肉が酸痛し、また（ニセ）吸小氣、或は小腹拘急（くわうきつ）、腰、背の強痛、咽乾、唇燥、或は飲食に味無く、多くは横臥して起きる時少き等、永さは積年の久き、輕さも百日、漸次に肉落ちて瘦削（さうさく）するには、生地黄二斤、麴一斤を搗き爛し、炒り乾して末にし、一日三回、方寸匕づつを空心に酒で服し、法則通りの忌み物を守る。（肘後方）【虛勞困乏】地黄一石の汁を取つて酒三斗と攪（か）きまぜて煎じ、貯へて日毎に服す。（必效方）【病後の虛汗】口乾き、心燥するには熟地黄五兩、水三盞を一盞半に煎じ、一日の内に全部を三回に分服する。（聖惠方）【骨蒸勞熱】張文仲の方では、生地黄一升を搗いて三回に絞り盡し、二回に分服する。若し痢するときは量を減じ、涼となるを度とする。（外臺秘要）【婦人の發熱】勞病とな

る傾向があつて、肌瘦し、食減じ、月經不順なるには、地髓煎——乾地黄一斤を末にして煉蜜で梧子大の丸にし、酒で五十丸づつを服す。（保慶集）【婦人の勞熱】心忪するには、地黄煎——生乾地黄、熟乾地黄等分を末にし、生薑自然汁を入れた水で和した糊で梧子大の丸にし、一日二回、三十丸づつを地黄湯で服す。或は酒、醋、茶湯で服するもよし。臟腑に虚冷を覺えるときは、早朝に八味丸を服す。地黄は性冷である。脾を壞め、陰虚すれば發熱するものだ。地黄を用ゐるは陰血を補するためである。（婦人良方）【欬嗽唾血】勞瘦、骨蒸で日暮寒熱するには、生地黄汁三合を用ゐ、白粥を煮て熟したときその地黄汁を入れ、攪きませて空心に食ふ。（食醫心鏡）【吐血欬嗽】熟地黄末を、一日三回、一錢づつ酒で服す。（聖惠方）【吐血の止まぬもの】生地黄汁一升二合、白膠香二兩を磁器に盛り、甑に入れて蒸し、膠を溶かして服す。（梅師）【肺損の吐血】或は舌に孔を生じて出血するには、生地黄八兩から汁を取り、童尿五合と共に煎じ熱し、鹿角膠を炒り研つて一兩を入れ、三回に分服する。【心熱吐衄】脈の洪、數なるには、生薑汁半升を一合までに熬つて大黃末一兩を入れ、膏に成るを待つて梧子大の丸にし、五丸乃至十丸を熱水で服す。（いづれも聖惠方）

(三八)微轉一行詳ナラズ、三回中一回ヲ省クモ可ナリノ意カ。

【衄血】乾地黄、地龍、薄荷等分を末にし、冷水で調へて服す。(孫兆配資方) 【吐血、

便血】地黄汁六合を銅器で煎沸し、牛皮膠一兩を入れ、溶けるを待つて薑汁半盃を

入れ、三回に分服すれば止まる。或は(三八)微轉一行するも妨げぬ。(聖惠方) 【腸風下

血】生地黄、熟地黄をいづれも酒に浸し、五味子と等分を末にして煉蜜で梧子大の

丸にし、七十九づつを酒で服す。(百一選方) 【初生兒の便血】生後七八日の初生兒が

大、小便に出血すれば、熱が心、肺に傳はるものだ。涼藥を服ませるわけに行かぬ

から、ただ生地黄汁五七匙に酒半匙、蜜半匙を和して服す。(金幼心鑑) 【小便尿血】

吐血、及び耳、鼻の出血には、生地黄汁半升、生薑汁半合、蜜一合を和して服す。(聖

惠方) 【小便血淋】生地黄汁、車前葉汁各三合を和し、煎じて服す。(聖惠方) 【小兒

の蠱痢】生薑汁一升二合を三四回に分服すれば立ろに效がある。(子母秘錄) 【月水不

止】生地黄汁一盞、酒一盞を煎じて一日二回服す。(千金方) 【月經不順】不順の状態

が久しきに亙つて妊娠せぬは衝任の伏熱である。熟地黄半斤、當歸二兩、黃連一

兩、いづれも一夜酒に浸し焙じて研末し、煉蜜で梧子大の丸にし、七十九づつを米

飲、溫酒のいづれか任意のもので服す。(禹講師方) 【妊娠漏胎】下血して止まぬには、

百一方では、生地黃汁一升を酒四合に漬け、煮て三五沸して服す。止まぬときはまた服す。○崔氏方では、生地黃を末にし、晝一回、夜一回、酒で方寸匕を服す。○經心錄では、乾薑を加へて末にする。○保命集では、二黃丸——生地黃、熟地黃等分を末にし、一日二回、半兩づつを白朮、枳殼の煎湯で調へて空心に服す。【妊娠胎痛】妊婦が衝任の脈の虚するには、ただ抑陽助陰内補丸が適する。熟地黃二兩、當歸一兩を微し炒つて末にし、梧子大の丸にして三十丸づつを溫酒で服す。(許學士本事方) 【妊娠胎動】生地黃の搗汁を煎沸して雞子白一箇を入れ、攪きまぜて服す。(聖惠方) 【産後の血痛】塊があり、并に經脈が行つて後腹痛し、不調なるには、黑神散——熟地黃一斤、陳生薑半斤を共に炒り乾して末にし、二錢づつを溫酒で調へて服す。(婦人良方) 【産後の惡血】止まぬには、乾地黃を搗いて末にし、一錢づつを食前に熱酒で服し、續けざまに三服する。(瑞竹堂方) 【産後の中風】寢返りの出來ぬには、交加散——生地黃五兩を研つた汁に生薑を浸し、生薑五兩から取つた汁に生地黃を浸して一夜置き、翌日各、黄色に炒つて汁に浸し、乾してから焙じて末にし、一方寸匕づつを酒で服す。(濟生方) 【産後の煩悶】これは血氣ニカ上冲ニヤウチウである。生地

(二九)上冲ハ上衝スル
コト。

三〇食物本草ニハ糯米一ノ三字ニ作ル。

三二寒澼ハ痢病ノ汚物。

黄汁、清酒各一升を和し、煎沸して二回に分服する。(集驗方) 【産後のあらゆる病】

地黄酒——地黄汁に麴二升、淨じやう糯米二斗を漬けて醱酵させ、普通の醸造法のやうに釀熟してから、封じて七日置いて澄んだものを取り、絶えずそれを常服する。生
物、冷物、鮓さき、蒜さん、雞、猪の肉、一切の毒物を忌む。酒は出産一箇月前に醸造する。
夏季は造れない。(千金翼方) 【胞衣不出】生地黄汁一升、苦酒三合を和して煖服す

る。(必效方) 【寒疝の絞痛】去來するには、烏雞一羽を普通やうに調理し、生地黄七

斤を細かに剉み、共に甑中に入れて蒸し、その落ちる汁を銅器に承け、早朝から夕
刻までに服し盡す。その間に諸しよ寒澼かんへきを下すものだから、下し訖きはつてから白粥を作
つて食ふ。久しき疝痛には三劑を用ゐる。(肘後方) 【小兒の陰腫】葱椒湯で煖い處で

洗ひ、睡で地黄末を調へて傳ける。外腎の熱には雞子清で調へ、或は牡蠣少量を加
へる。(危氏方) 【小兒の熱病】壯熱し、煩渴し、頭痛するには、生地黄汁三合、蜜半

合をよく和し、折折與へて服させる。(普濟方) 【熱喝昏沈ねつごんちん】地黄汁一盞を服す。【熱

瘴の昏迷】煩悶し、水を飲んで止まぬものは甚だ危險に陥るものだが、左の藥一服
で效が現はれる。生地黄根、生薄荷葉等分を搗り爛らして自然汁を取り、麝香少

量を入れて井華水で調へて服す。心下が頓に涼を覺える。再服の要なし。(普濟方)

【溫毒發斑】黑膏——溫毒の發斑、嘔逆おうぎやくを治す。生地黄二兩六錢二字半、好き豆豉づし

一兩六錢二字半を、猪膏十兩で合はせて一夜露らし、煎じて三分一減つたとき絞つて滓を去り、雄黃うへう、麝香けうかうを豆ほど入れて攪さませ、三回に分服する。毒が皮中から出て癒える。蕪荑うぎを忌む。(千金方) 【血熱で生じた癰せん】地黄汁を頻りに服す。(千金方)

【疔腫ちゆうしゆ、乳癰】地黄を搗いて敷き、熱すれば取換へる。性は涼であつて、腫を消するに必ず效が現はれる。(梅師方) 【癰癤惡肉】地黄三斤、水一斗を三升に煮取り、滓

を去つて煎稠し、紙に塗つて貼る。一日に三回換へる。(鬼遺方) 【一切の癰疽】及び

打撲傷損。まだ破れずして疼痛するには、生地黄を杵こいて泥の如くし、それをのし、た上に木香末を掺かり、その上にまた地黄泥一重をのして貼る。三五回に過ぎずして内消する。(玉袞博濟方) 【打撲損傷】骨碎、及び筋の傷爛には、生地黄の熬膏がうかうで裹つつん

で竹簡を添へて挟み、急に縛つて動かぬやうにし、一晝夜に十回換へれば癒える。

○類説に『許元公きよげんこうは、橋を渡るとき落馬して右臂が脱臼し、従者が急に揉み込んだが、人事不省となつて痛苦の意識がなかつた。そこで急に田録事を招いで手當を請

ふと、録事は視て、「まだ十分助かる」といひ、藥で腫處を封ずると、夜半に意識が回復し、曉方には痛が止り、痛處は已に白くなつてゐた。その後日毎に貼換へると、瘀腫は肩、背に移動した。そこで藥を用ゐて黒血三升を下すと、それで癒えた』とある。これは上記の方である。記載は肘後方中にある。○損傷、打撲の瘀血が腹に在るには、生地黃汁三升、酒一升半を二升半に煮て三回に分服する。記載は千金方にある。【物で瞳を突いた負傷】輕きは脇胞が腫痛し、重きは眼睛が突出する。但だ眼の神經さへまだ切斷されぬならば、眼窩中に納れて急に生地黃を搗いて綿で裹んで傅け、風に當らぬやうにして膏藥でその四邊を保護し圍ふ。(聖濟總錄) 【睡から起きて目の赤きもの】腫起し、良久して平常に復するものは血熱である。血は寢れば肝に歸するものだ。故に熱すれば目が赤腫する。良久すれば血が散ずるから平常に復するのだ。生地黃汁で粳米半升を浸し、三回浸し三回晒して乾し、その米で每夜粥を煮て一盞づつ食へば數日で癒える。ある患者にこれを實行して效果を得た。

(膏餘) 【突然の眼の赤痛】水で洗つた生地黃、黑豆各二兩を搗いて膏にし、就寢時に鹽湯で目を洗ひ、目を閉ぢてこの藥で厚く目の上を覆ひ、夜明て水で潤して取り除

く。(聖濟總錄)

【葶內赤日】生地黃を薄く切り、溫水に浸して貼る。(小品方)

【牙疳宜

露】膿血を出し、口の臭きには、生地黃一斤、鹽二合を末にし、臼で搗き和して

團にし、麪で包んで烟が無くなるまで煨いて麪を去り、麝一分を入れて研勻し、晝

夜それを貼る。(聖濟總錄)

【牙齒の長く伸び出るもの】一分程伸び出たものは、常に生

地黃を嚼むが甚だ妙である。(張文仲備急方)

【牙が脱けるやうに動くもの】生地黃を綿

で裹んで嘔ひ、汁で齒根を漬けてから嚙む。一日五六回試みる。(千金方)

【蟹を食つ

て起つた齧腫】肉の弩出するには、生地黃汁一盃を用ゐ、牙皂角數本を火で炙つて

その汁全部を蘸け、末にして傅ける。(永類方)

【耳中の常鳴】生地黃を截つて耳の中

を塞ぎ、一日に數回換へる。或は煨熱して用ゐるが尤も妙である。(肘後方)

【鬚髮の

黃赤】生地黃一斤、生薑半斤を、各、洗ひ研つて自然汁と滓とを各別に取り、蚌の

付かぬ皂角數本を皮の弦を去つて右の汁を蘸け、汁が盡きるまで幾回も繰返して炙

り、先の滓と共に罐に入れて泥固し、煨いて性を存して末にし、その末三錢を鐵器

に入れて湯で調へ、そのまま二日置いて就寢時に鬚髮を刷き染めれば黒くなる。(本

事方)

【竹木で肉を刺したとき】生地黃を嚼み爛らして罨ふ。(救急方)

【毒箭が肉を

【註】飯餅ハソクヒ。

【註】大觀ニ方寸ヲ錢ニ作ル。

【註】陸眼ハ衰眼ニ通ズ。

穿つたとき】生地黃の汁を煎じて丸にし、百日間服すれば箭が出る。(千金方) 【狂大

の咬傷】地黃の搗汁で飯餅を作つて塗る。百回で癒える。(百一方)

葉 主 治

【癰に似た惡瘡の十年の永きには、先づ鹽湯で洗つてから、葉を搗き爛らして日毎に塗る】(千金方) ○時珍曰く、按ずるに、抱朴子に、『韓子治が、地黃

の苗で五十歳の老馬を飼つたところ、その老馬が三頭の駒を生んだ。又、一百三十歳で死んだ』とある。張鸞の朝野僉載には『雉が鷹に傷けられたときは、地黃葉を啣んで點ける。虎が藥箭で射られたときは、清泥を食つてこの毒を解す。鳥獸すら解毒の方法を心得てゐる。況や人間をや』といつてある。

實 主 治

【四月に採つて陰乾し、擣いて末にし、一日三回方寸匕を水で服す。その功力は地黃と等しい】(蘇頌) ○弘景曰く、渭城に出るものには子がある。淮南七精丸に用ゐてある。

花 主 治

【末にして服食する。その功力は地黃と同じ】(蘇頌) 【腎虛の腰、脊痛には、末にし、一日三回、方寸匕を酒で服す】(時珍)

附 方 新 一。

【内障青盲】風赤で瞖を生じたもの、及び陸眼久しきに互つ

（三）瞶損ハ瀉目不明
ヲ云フ。

（四）牧野云フ、先輩
ノ説ニ從ヘバ胡面葵
ハ和名ゼンリトモテ
アルガ支那ニハ此地
黃屬（*Rehmannia* ノ

モノハ種種アルカラ
此レが果シテ其品デ
アルカ否カ實ハ能ク
列ツテ居ル譯デハナ
イ。右ノゼンリトモ

ハ往時支那カラ渡シ
タモノデ今日デハ世
間ニ絶エテ無クシテ
僅ニアル位ノモノデ
アラウト思フ、地黃

ヨリハ壯大ナ品デ花
モ大キイ、此品ハ藥
用ニハセズタダ花ヲ
賞スルバカリデアル
地黃屬デ學名ナ

Rehmannia glutin-
osa, Liliaceae. var.
Maletii, *Mitsuru*.
トイヒ地黃ト同科ニ
屬スル。

て（一）瞶損し、失明したるには、地黃花を晒し、黒豆花を晒し、槐花くわいかを晒して各一兩を末にし、豬肝一頭分と共に水二斗で煮る。上に凝脂の出るまでになつたとき、その脂を盡く掠かきめて瓶に取收め、少量づつを三四回點ける（聖惠方）

附 錄

（三）胡面葵（拾遺） 藏器曰く、味甘し、溫にして毒なし。瘰癧げんげき、及び冷氣を去るに主效がある。腹痛を止めるには煮て服す。嶺南に生ずるもので、葉は地黃のやうなものだ。

（一）牛 膝（本經上品）

和名 めのこづち
學名 *Ahyranthes hirtellata*, *Ulmaceae*.
科名 ひのき科（莧科）

釋 名

牛莖（廣雅） 百倍（本經） 山萵菜（救荒） 對節菜 弘景曰く、莖に牛

の膝に似た節があるところから名けたものだ。時珍曰く、本經にまた百倍とある名は隱語であつて、その滋補の功力が牛のやうに力が多いといふことだ。葉が莧げんに似て節に對して生ずるところから、俗に山萵、對節などの稱がある。

集 解

別錄に曰く、牛膝は（三）河内かたの川谷、及び（四）臨朐りんこに生ずる。二月、八月、

(一) 牧野云フ、最も普通ナル宿根草デ山野ニ生ズル、其果實ハ宿在夢之レヲ被ヒ先端尖リテ全體反屈シ能ク衣服ニ著ク、一種狭長葉ノモノガアルやなぎゐのこづちト稱スル。

(二) 河内ハ菊ノ註テ見ヨ。

(三) 臨朐ハ石部石野ノ註テ見ヨ。

(四) 蔡州ハ金部金ノ註テ見ヨ。

(五) 本村(廣)曰ク、生薬ハゐのこづちノ根ヲ用ウルモノナレドモ、懷州トシテ出ヅキ牛膝ハ其ダシク長大ナルモノアリ、ゐのこづちニヨルモノナレバ否ヲ決定スルヲ得ズ。

懷州、即チ懷慶ノ地ナリ。地黄ノ懷慶ノ註參照。蔡州ハ隋ニ

十月に根を採つて陰乾する。普曰く、葉は夏藍のやうで莖本が赤い。弘景曰く、今は近道に産するが、(細さいしう)蔡州さいしうのものが最も長大で柔潤だ。その莖には節があつて、莖が紫で節の大なるものを雄、青く細いものを雌とし、雄を勝れたものとする。

大明曰く、(くわいしう)懷州くわいしうのものは長く白く、蘇州そしうのものは色が紫だ。

頤曰く、今は(かうい)江淮かうい、(てんちう)閩粵てんちう、(くわんちう)關中くわんちうにも

あるが、懷(くわい)慶ていの者の純真なるには及ば

ない。春苗が生え、莖は高さ二三尺、青

紫色で鶴の膝(か)か牛の膝(か)頭(か)のやうな節が

あり、葉は尖つて匙(さし)のやうに圓く、節の


上に兩兩相對して生える。花は穗になり、

秋甚だ細い實を結ぶ。根は極めて長く太

く、三尺ほどある。柔く潤ふものが佳い。葉も單用し得る。

時珍曰く、牛膝は處處にある。土牛膝といふは服食に堪へない。ただ、此土、及

び、川中の人家で栽培するものを良しとする。それは秋季間に子を取つて春蒔く



〔膝 牛〕

置ケ。今ノ江蘇省吳縣ナリ。

(六) 江淮ハ江蘇、安徽地方。閩粵ハ福建地方。關中ハ陝西地方ナリ。

(七) 大觀ニ慶州ニ作ル。

(八) 大觀ニ頭ナクニ作ル。

(九) 大觀ニ此ナクニ作ル。

(一〇) 川中ハ四川省ノ地ナリ。

(一一) 船、集韻ニ音船、牛角ノ開キタル貌ナリトアリ。

(一二) 鼠負、一名鼠婦、和名おもむし、一名わらぢむし。

(一三) 濡毛ハ粗毛。

(一四) 木村(康)曰ク、

ゐのこづちノ根ノ水性甚幾斯ハ約八ノ灰分ヲ有シ、其内カリユム鹽類最モ多量ナリ、又多量ノ粘液

もので、苗は莖が四角で節があらはになり、葉は皆對して生え、頗る莧葉に似て長く且つ尖^{せん}。船^{せん}だ。秋季に穂になつた花を開き、小さい^{せう}鼠負蟲のやうな形狀の子を結び、濡毛^{しよくまう}があつて莖に貼^はつたやうに倒生する。九月末に根を採る。二晝夜水に浸して皮を揉み去り、裏み括つて暴乾すると、白く眞直で外觀は宜しいが、白汁を揉み去るので、薬に入れるには皮のままのものの功力の大なるに及ばない。嫩苗^{ざんべう}は菜にして食へる。

根 修治

毀曰く、凡そ使用するには、頭蘆を去つて黄精の自然汁に一夜浸し、漉出して剉^{うざ}み、焙じ乾して用ゐる。時珍曰く、今はただ酒に浸して薬に入れる。功力を下行せしめるには生で用ゐ、滋補するには焙じて用ゐ、或は酒を拌せて蒸して用ゐる。

氣味

【苦く酸し、平にして毒なし】 普曰く、神農は甘しいひ、雷公は酸し、毒なしといひ、李當之は溫なりといふ。之才曰く、螢火^{けいくわ}、龜甲^{きうか}、陸英を惡み、

白前を畏れ、牛肉を忌む。主 治 【寒濕痿痺で四肢が拘攣し、膝痛して屈伸し得ぬもの。血氣を逐ふ。傷熱、火爛、墮胎。久しく服すれば、身體を軽くし、老衰を

ぬもの。血氣を逐ふ。傷熱、火爛、墮胎。久しく服すれば、身體を軽くし、老衰を

質ヲ含有ス。

(五)血結ハ子宮血塊
ノコトナラン。

防ぐ(本經)【傷中少氣、男子の陰の消耗、老人の失尿。中を補し、絶を續き、精を益し、陰氣を利し、骨髓を填て、髮の白きを止め、腦中痛、及び腰、脊痛、婦人の月經不通、(こも)血結を除く】(別錄)【陰痿を治し、腎を補し、十二經脈を助け、惡血を逐ふ】(賈樞)【腰、膝の軟怯、冷弱を治し、癥結を破り、膿を排し、痛を止める。産後の心腹痛、并に血運、死胎を落す】(大明)【筋を強くし、肝臟の風虚を補す】(好古)【茯苓と共に酒に浸して服すれば、腎を益す。竹木で刺して肉に入りたるには、嚼み爛して罌へば出る】(宗奭)【久癰寒熱、五淋の尿血、莖中痛、下痢、喉痺、口瘡、齒痛、癰腫、惡瘡、折傷を治す】(時珍)

【發明】

權曰く、患者の虛羸きよろみせるにはこれを加へて用ゐる。

震亨曰く、牛膝は能く諸藥を導いて下行するものだ。筋骨痛で風が下部に在るものに加へて用ゐるがよし。凡そ土牛膝を用ゐるには、春、夏は葉を用ゐ、秋、冬は根を用ゐる。しかし葉の汁の効力が就中速かだ。

時珍曰く、牛膝なるものは足の厥陰、少陰の藥であつて、その主たる效力を有する病の範圍を要約すれば、酒で制して用ゐれば能く肝腎を補し、生で用ゐれば能く

惡血を去るの二途に歸するやうに思はれる。その腰、膝の骨痛、足痿、陰消、失尿、久瘵、傷中少氣の諸病を治するは、それは肝、腎を補する功力に因るものではあるまいか。癥瘕、心腹諸痛、癰腫、惡瘡、金瘡、折傷、喉、齒、淋痛、尿血、月經異狀、妊娠、出産の諸病を治するは、それは惡血を去るの功力に因るものではあるまいか。按ずるに、陳日華の經驗方に「予は方夷吾が編修した集要方を臨汀で出版したが、その後鄂渚に居た頃、九江の知事の王南強からの書翰に「拙老は久しく淋疾に苦しみ、あらゆる薬も效がなかつたが、偶々臨汀本集要方の記述中に牛膝を用ゐるとあるのを見て、それを服して瘥えた」と言つて來た。又、葉朝議の家族の者が血淋を患ひ、排泄した尿を盆の中へ取つて置くと、凝つて蒟蒻のやうになり、久しくしてただ足がないだけの鼠のやうな形に變化した。あらゆる治療も效果がなかつたが、ある田舎醫師が地髓湯と名けるものだといつて、牛膝根の濃煎汁を一日五服づつ飲ませたところ、即瘥とは行かなかつたが、尿血の色が漸次に淡くなり、久しくして舊時の健康に回復した。その後十年でまた發病したが、それを服してまた瘥えた。そこで本草を調べて見ると、肘後方に「小便不利、莖中痛で死せんとする

を治するには、牛膝、并に葉を用ゐ、酒で煮て服す」とあつた。今茲に再びこの事

實を舉げてこの物の神功を推奨する」とある。又按ずるに、楊士瀛の直指方に「小

便淋痛、或は尿血、或は沙石脹痛には、川牛膝一兩、水二盞を一盞に煎じて溫服す

る。十年の長い間この病を患つたある婦人患者に、これを服ませて効果を擧げた。

土牛膝もよし。或は麝香、乳香を入れるが尤もよし」とある。

附方

舊十三、新八。

【勞瘁】積年の久しきに互つて止まぬには、（六七）長牛膝一

握を生で切り、水六升で（七）二升に煮て三回に分け、早朝一服、發作直前に一服、發

作時に一服する。（外臺秘要）【消渴の止まぬもの】下元の虚損である。牛膝五兩を末

にし、生地黃汁五升に浸し、晝曝し夜浸して汁が盡きるまで繰返し、蜜で梧子大の

丸にし、三十丸、つづを空心に溫酒で服す。久しく服すれば、筋骨を壯にし、顔色の

衰へを防ぎ、髪を黒くし、津液が自ら生ずる。（經學二八方）【突然の劇しき癢疾】腹

中に石のやうなものがあつて刺し、晝夜啼き叫ぶには、牛膝二斤を酒一斗に漬けて

密封し、灰火中で溫めて味を出さしめ、毎服五合乃至一升を、量に隨つて飲む。（肘

後方）【下痢腸蠱凡そ下痢は、先に白を下し後に赤を下す筈のものだ。先に赤を下

（六）大觀ニ長下ニ生
字アリテ握下ニ無
シ。
（七）大觀ニ二ナニ
作ル。

（八）大觀ニ方上ニ後
字アリ。

二六〇大觀ニニサ三ニ
作ル。

し後に白を下すは腸蠱である。牛膝（二六）二兩を搗き碎き、酒一升に漬けて一夜經過し、一日三回、一二盃づつを服す。（肘後方）【婦人の血塊】土牛膝根を洗つて切り、

焙じ搗いて末にし、酒で煎じて溫服するが極めて有效だ。福州地方では單用する。

（圖經本草）

【婦人の血病】萬病丸——婦人の月經淋閉、月經不調、臍の周圍の寒疝

痛、及び産後の血氣不調、腹中に結聚して癥の散ぜぬもの等の諸病を治す。牛膝を

酒に一夜浸して焙じ、乾漆を烟のなくなるまで炒り、各一兩を末にして生地黃汁一

升と石器に入れ、慢火で丸になるまで熬つて梧子大の丸にし、二丸づつを空心に米

飯で服す。（按萃方）【婦人の陰痛】牛膝五兩、酒三升を一升半に煮取つて滓を去り、

三回に分服する。（千金方）【生胎の墮胎】牛膝一握を搗き、無灰酒一盞で七分に煎じ

て空心に服し、同時に獨根の土牛膝に麝香を塗つて臍内へ挿入する。（婦人良方）【胞

衣不出】牛膝八兩、葵子一合、水九升を三升に煎じ、三回に分服する。（二六〇）（延年方）

【産後の尿血】川牛膝を水で煎じて頻りに服す。（蘇氏補遺）【喉痺乳蛾】新鮮なる牛

膝根一握、艾葉七斤を搗き、人乳を和して汁を取り、鼻から灌ぎ込む。須臾にして

痰涎が口、鼻から出て癒える。艾を入れなくもよし。○ある方では、牛膝の搗汁に

二〇〇大觀ニハ梅師方
ニ作ル。

〔三〕大觀ニ孫真人食忌ニ作ル。

〔三二〕大觀ニ孫真人食忌ニ作ル。

〔三三〕瘡癰ハイボノ大ナルモノ。

〔三四〕問ハ閉ト同意。

陳い酢を和して漱ぐ。【口舌の瘡爛】酒に牛膝を浸して含漱する。煎じて飲むもよ

し。〔肘後方〕【牙齒の疼痛】牛膝を研末して含漱する。焼灰を用ゐるもよし。〔三二〕千金

方〕【折傷、閃肭せんなん】杜牛膝を搗いて罨ふ。〔衛生易簡方〕【金瘡の痛み】生牛膝を搗い

て敷けば立るに止まる。〔梅師方〕【卒然生じた惡瘡】久しく何瘡なるや判然せぬには、

牛膝根を搗いて傳ける。〔三三〕千金方〕【癰癤ようせつの潰れたもの】牛膝根を略はぼ皮を刮り去

つて瘡口中に挿入し、半寸だけ外部へ殘し、嫩橘葉、及び地錦草各一握でその瘡上を

搗く。牛膝は能く惡血を去り、橘、地錦の二草は溫、涼で痛を止める。乾く都度取換

へる。完全に功を擧げるものだ。〔陳日華經驗方〕【風瘡癰疹ふうそうようしん】及び〔三〕瘡癰。牛膝末を

一日三回方寸匕づつ酒で服す。〔千金方〕【骨疽癰病】方は上に同じ。

莖葉 氣味 (缺) 主治 【寒濕痠痺、老瘡、淋瀝りんりつ、諸瘡。功力は根

と同じ。春、夏はこれを用ゐるがよし。〕〔時珍〕

附方

舊三、新一。

【氣濕の痺痛】腰膝痛には、牛膝葉一斤を切り、米三合と豉

汁じゆの中へ入れて粥かゆに煮、鹽醬を和して空腹にして食ふ。〔聖惠方〕【老瘡の斷たぬもの】

し即時に斷たずして更に發作はつさしても三劑に過ぎずして止む。(肘後) 【溪毒の寒熱】東方の邊境には溪毒がある。人の中毒すること射工に似たものだが、これは無形の邪氣である。初期には惡寒し、發熱し、煩悞はんごし、骨節強痛し、急に治療せねば蟲を生じて臟を食ひ、遂に死亡するものだ。雄牛膝ゆうこの紫で節の大なる莖一把に酒、水各一盆を入れ、共に搗いて汁を絞り、一日三回溫服する。(肘後方) 【眼の珠管】牛膝、并に葉の搗汁を一日三四回點ける。(聖惠方)

(一) 紫苑

(本經中品)

和名 無
學名 未詳
科名 未詳

釋名

青苑(別錄)

紫儻(別錄)

返魂草(綱目)

夜牽牛

時珍曰く、その根

が紫色で柔宛じみんだから名けたのだ。許慎の説文には此苑しんと書き、斗門方には返魂草といつてある。

集解

別錄に曰く、紫苑は漢中、房陵ぼうりやうの山谷、及び眞定、邯鄲かんたんに生ずる。二月、三月に根を採つて陰乾する。弘景曰く、近道處處にある。地に布いて生

(二) 牧野云フ、紫苑ハ我邦ノ學者從來之レヲきク科(菊科)ノシナンニ充テ來リ居レドモ穩當デハナイ紫苑ハ何カ唇形科ニ屬スル品デ其葉ハ對生デ花ハ唇形デアルヤウダガ今ソレガ何ンデアルカ私ニハ見當ガ附カヌ、多分ソレハ我邦ニハ無イ或ル一種ノ草デアラウト思フ。

(二) 大觀ニハ漢中ノ二字ナシ。漢中ハ礬石ノ註、房陵ハ石部特生礬石ノ註ヲ見ヨ。

(三) 眞定ハ漢ノ眞定國、卽チ今ノ直隸省正定府、故城ハ正定縣南ニ在リ。
(四) 邯鄲ハ十部白堊ノ註ヲ見ヨ。

(五) 重臺ハ玄參ノ一名、又蚤休ノ一名。

(六) 耀州、孟州ハ石部石膏ノ註、咸州ハ石部鹵石類光明鹽ノ註、泗州ハ山草類遠志ノ註、壽州ハ芳草類澤蘭ノ註、台州ハ石部鹵石類食鹽ノ註ヲ見ヨ。興國ハ宋ノ軍、明ニ州トナス。
今ノ湖北省武昌府陽新縣ソノ舊治ナリ。

え、花は紫色で本に白毛がある。根は甚だ柔かで細い。白菀と名ける白いものもあるが、それは用ゐない。

大明曰く、形は重臺（じゅうたい）に似て根が節を作し、紫色で潤軟なものが佳い。

頌曰く、今は（きん）耀、成、泗、壽、白、孟、興國の諸州にいづれもある。三月の内



〔菀 紫〕

に布いて苗が生え、その葉は二枚、四枚と相連り、五月、六月の内に黄、白、紫の花を開き、黒い子を結ぶ。その他は陶氏の説の通りだ。

恭曰く、白菀（はくあん）、卽ち女菀（にょあん）であつて、治病上の功力は紫菀と同様なものだ。

紫菀のないときはこれも用ゐる。

頌曰く、紫菀は、根、葉を連ねて採つて醋に浸し、少量の鹽を入れて貯ひたものを菜にすると、辛く香しいものだ。これを仙菜と稱する。鹽を多く入れてはならない、多ければ腐るものだ。

(七) 牢山、即チ勞山。
石部附錄諸石黑石華
ノ註ヲ見ヨ。
(八) 沂州ハ石部馬腦
ノ註、兗州ハ石部雲
母ノ註ヲ見ヨ。

(九) 大觀ニ白ヲ曰ニ
作ル。

(一〇) 璧、大觀ニ璧ニ
作ル。

時珍曰く、按ずるに、陳自明は「紫苑は、牢山に産する根の北細辛のやうなものが良く、沂、兗以東にはいづれもある。今は一般に車前、旋復の根を赤土で染めて作る偽物が多いが、紫苑は肺病の要薬であつて、肺なるものは本来それ自體が津液を亡くするものだから、それに更に津液を走らす薬を服しては害を爲すことますます甚しい。大いに注意を要することだ」といつてある。

根 修治

穀曰く、凡そ使用するには、先づを鬚を去る。白い練絲のやうに見えるのもあるが、それは白羊鬚草と號するものだ。その自然の質が同一でない。頭、及び土を去つて東流水で洗淨し、蜜で一夜浸し、翌早朝火の上にかざして焙じ乾かす。一兩の紫苑に蜜二分を用ゐる。

氣味

【苦し、溫にして毒なし】

別錄に曰く、辛し。權曰く、苦し、平なり。

之才曰く、款冬花が使となる。天雄、瞿麥、藁本、雷丸、遠志を惡み、茵陳を畏

主治

【款逆上氣、胸中寒熱、結氣、蠱毒、痿、璧を去り、五臟を安ずる】

(本經) 【款睡膿血を療じ、喘悸を止める。五勞の體虚に不足を補す。小兒の驚癇】

(別錄) 【尸疰を治し、虚を補し、氣を下す。勞氣虚熱、百邪鬼魅】(甄權) 【中を調へ、

（二）息實ハ少腹ヨリ
心下ニ至ル拘攣ヲ云
フ。

（三）大觀ニ錢下七字
アリ。

（四）纏喉風痺ハ咽喉
加多兒、偏頭腺囊ノ
類。

痰を消し、渴を止め、肌膚を潤ほし、骨髓を添へる【大明】【肺氣を益し、（二）息實に
主效がある】（好古）

附方

舊三、新四。

【肺傷欬嗽】紫苑五錢、水一盞を七分に煎じ、一日三回溫服

する（衛生易簡方）

【久嗽の瘥えぬもの】紫苑、欬冬花各一兩、百部半兩を搗き篩つ

て末にし、三（二）錢づつを、薑三片、烏梅一箇の煎湯で調へ、一日二回服するが甚だ

佳し（圖經本草）

【小兒の欬嗽】聲の出ぬには、紫苑末、杏仁等分に蜜を入れて共に

研り、芡子大の丸にして一丸づつを五味子湯で溶かして服す（全効心鑑）【吐血欬嗽】

吐血後に欬するには、紫苑、五味を炒つて末にし、蜜で芡子大の丸にして一丸づつ

含み溶かす（指南方）

【産後の下血】紫苑末五撮を水で服す（聖惠方）

【（三）纏喉風痺】

通ぜずして死せんとするには、返魂草根一本を洗淨して喉中に入れ、惡涎を取り出

せば瘥える。神效のあるものだ。更に馬牙硝を唾液で嚥めば根本を斷つ。この草は

一名紫苑といひ、南地地方では夜牽牛と呼ぶ（斗門方）

【婦人の突然の排尿不能】紫

苑を末にし、井華水で三撮を服す。直ちに通ずる。小便血には、五撮を服すれば立

ろに止まる（千金方）

女苑 (本經中品)

和名無し
學名未詳
科名未詳

釋名

白苑 (別錄) 織女苑 (別錄) 女復 (廣雅) 茆 音は柳(リウ)である。

時珍曰く、根が女の身體のやうに柔で婉だから名けたものだ。

集解

別錄に曰く、女苑は漢中の(三)山谷、或は(三)山陽に生ずる。正月、二月に採つて陰乾する。弘景曰く、近頃の醫方には一向用ゐない。別に白苑といふ紫苑に似たものがあるが、恐らくこの物ではあるまい。

恭曰く、白苑、即ち女苑だ。有名未用に一條を重複記載してあるところから、陶氏が疑問を生じたのだ。功力は紫苑と似たものである。

宗奭曰く、女苑、即ち白苑であつて二物ではない。唐に本草修輯の際、白苑を刪去したのは妥當の處置だ。

時珍曰く、白苑、即ち紫苑の白色なるものだ。雷斅が「紫苑の白い練絲のやうに見えるものを羊鬚草と名ける」といつたのは、恐らくは此の物のことだらう。

(一)牧野云フ、從來我邦ノ本草學者ハ之レヲきく科(菊科)ノひめしなニ充テテ居レドモソレハ誤リデアル、女苑ハ唇形科ノ一種デ其形狀酷ク能クあきのたむらや(Shiru Chen-sis, Benth.)ニ似タモノデ其下部ノ葉ハ基部ニ側生ノ小葉ヲ有セル複葉ヲナシテ居ル、此點ハ同科ノゆきみさう即チみぞかうじゆ(S. Prostr., R. Br.)ト全ク相異ツテ居ルノデ女苑ハ決シテゆきみさうデハナイ。
(二)山、大觀ニ川ニ作ル。
(三)山陽ハ山ノ陽、即チ南タイフカ。漢ニ山陽縣アリ、河内ニ屬ス。故城ハ今ノ

根 氣 味

【辛し、溫にして毒なし】之才曰く、鹵鹹を畏る。

主 治 【風

寒で洗したるもの、霍亂洩痢、腸鳴の上下位置の一定せぬもの、驚癇、寒熱のあらゆる疾】本經【肺傷欬逆で汗の出るもの、久寒が膀胱に在つて支滿するもの、飲酒夜食から發した病】別錄

發 明

時珍曰く、按ずるに、葛洪の肘後方に『人の顔色の黑さを白くする方。

眞女苑三分、鉛丹一分を末にし、一日三回、醋漿で一刀圭を服す。十日繼續すれば



〔苑白ち即苑女〕

大便が黒くなり、十八日で顔が漆のやうになり、二十一日で全く白くなる。同時に服藥を止める。度を過せば白くなり過ぎるものだ。三十歳以後は服してはならぬ。五辛

を忌む』なる記載があり、孫思邈の千金方に『酒で服すれば、男子は十日、女子は二十日で黒色が皆大便と共に出る』とある。又、名醫錄には『宋の興國年間に任氏といふ美人があつた。進士の王公輔と婚約したが不成立に終り、その後久しく憂鬱の日を送るうちに、漸次に顔色が黒くなつたので、生家では種種醫療に手を盡したが、

(一) 牧野云フ、麥門冬ハやぶらんとじやのひげトノ兩品ヲ指シタ總名デアアル、故ニ之レヲ別々ニ唱フルニハ宜シクやぶらんと方チ大葉麥門冬じやのひげノ方チ小葉麥門冬ト稱スベキデアアル、因ニ云フ此兩品ノ實ハ類ニナツタ種子デアアル、松村任三博士著改訂植物名彙前編ニ植物名實圖考卷ノ二十七ニア

ル松蔞蘭チやぶらんに充ツルハ非デ、コレハきちやうさう(吉祥草)ノ一種ノ名デアアル。

(二) 大觀ニハ、秦名羊

ある道人が女眞散といふ藥を用ゐ、一日三回、二錢づつを酒で服せると、數日で顔色が微に白くなり、一箇月で故の通りに回復した。そこでその藥の處方を懇ろに求めると、その方は、黃丹、女菀の二物等分を用ゐるのであつた』とある。この記述に據れば、葛氏の方は已に有效が實驗されてゐたわけだ。かやうな次第で、紫菀は手の太陰の血分を治し、白菀は手の太陰の氣分の藥であつて、肺が熱すれば顔色が紫黒色となり、肺が清くなれば顔色が白くなるのである。三十歳以後になれば肺氣が漸減の傾向に在るから、その上に更に泄すべきものではない。故に「服してはならぬ」といふのだ。

(一) 麥門冬 (本經上品)

小葉者

和名	やぶらん
學名	<i>Liriope graminifolia</i> , Batsch
科名	ゆり科(百合科)
和名	じやのひげ、りゅうのひげ
學名	<i>Ophiopogon japonicus</i> , Gaertn.
科名	ゆり科(百合科)

釋名

蔓冬 音は門(モン)である。(一) 秦では烏韭と名け、齊では愛韭と名け、楚では馬韭と名け、越では羊韭と名ける。(竝に別錄) 禹韭(吳普) 禹餘糧(別錄)

進名著一名禹腹トアリ。秦ハ陝西地方、齊ハ山東地方、楚ハ湖北地方、越ハ浙江地方チイフ。
(三)大觀ニハ草ヲ藥ニ作ル。

(四)續ハ種ノ誤。

(五)正字通門常靈字今省作門。

(六)木村康曰ク、

今本邦ニテ長門冬丸夢門冬等ノ名ヲ以テ販賣スルモノハ全

クじやのひげニシテやぶらんに會テ用ニタルコトアルベキモ

今之チ市店ニ見ズ、

而シテ丸夢門冬ハ佳

品ニシテ長門冬ハ劣

劣品ナリ、生藥ハ

イヅレモ中心柱ヲ拔

キヤ乾燥セシモノナリ、藤田直南ノ藥譜、

大、二(四九八)

(七)函谷ハ秦ノ關ノ所在地。今ノ河南省

忍冬(吳普) 忍凌(吳普) 不死草(吳普) 階前草 弘景曰く、根が續麥に似た

ものだから麥門冬といふ。時珍曰く、麥の鬚を藥といふ。この草は根が麥に似て鬚

があり、その葉が韭のやうで、冬を凌いで凋まない。故にこれを麥藥冬といひ、ま

た諸種の韭、忍冬などの諸名がある。俗に門冬と書くは字訓を簡單に省いたもの

だ。この草は、服食すれば穀食を斷ち得るといふところから、また餘糧、不死など

の稱がある。吳普本草には、一名饅壘、一名隨脂とある。

集解

別錄に曰く、麥門冬は、葉が韭のやうで冬、夏共に長生する。(七)函

谷の川谷、及び隄坡、肥土、石間、久しき

荒廢地に生ずる。(八)二月、八月、十月に根


を採つて陰乾する。普曰く、山谷の肥地に

生ずる叢生の草で、葉は韭のやうで青黄

色だ。採收に一定の時期はない。

弘景曰く、函谷とは秦時代に關門のあつ

た土地だ。この草は處處にあつて、冬季に



冬 門 夢

雲寶縣ノ南ニ在リ。
即チ秦ノ東關ナリ。

東嶺山ヨリ西潼津ニ
至ル間ヲ通シテ函谷
ト稱ス。

(一〇) 大觀ニ二月ノ次
ニ三月ノ二字アリ。

(二) 大觀ニ青上實ノ
字アリ。

(一〇) 江寧ハ山草類白

鮮ノ註ヲ見ヨ。

(一) 新安ハ水部溫湯

ノ註ヲ見ヨ。

(二) 大觀ニハ根上ニ

在字ナシ。

(一三) 浙中ハ浙江省地
方。

青珠のやうな實になる。四月採つた根の肥大なものを良しとする。

藏器曰く、(一〇) 江寧の産は小さくして潤ひ、(二) 新安の産は大きくして白い。苗の大なるは鹿葱ろそうほどあり、小なるは韭葉ほどだ。大、小三四種あるが、功用は相似たものだ。子は圓くして碧い。

頌曰く、所在にある。葉は青く、莎草しやさうに似て長さ一尺餘にもなる。四季を通じて潤まない。根は黄白色で、鬚が根に(一三) 在つて連珠のやうな形になつてゐる。四月紅蓼花こうりやくけのやうな淡紅色の花を開き、實は碧で珠のやうに圓い。江南の産は葉が大きい。或は吳地のものが最も勝れてゐるといふ。

時珍曰く、古代には野生のものののみを用ゐたのだが、後世用ゐるものは多くは栽培して作る。その栽培法は、四月初に根を採つて黒壤の肥えた沙地に栽うゑ、毎年六月、九月、十一月の三回に糞肥を施し、また芸くさずつて水を灌ぎ、夏至の前一日に根を取つて洗ひ晒して取り收める。子を蒔いてもやはり生えるが、それでは成長が遅いものだ。(一三) 浙中せつちゆうから來るものが甚だ良い。葉が韭に似て縦文が多く、且つ堅韌けんじんな點が特長だ。

根 修治

弘景曰く、凡そこれを用ゐるには、肥大なものを取り、湯で洗ひみがいて心を抽き去る。さうせねば人を煩せしめる。大抵一斤に就て四五兩を減じ去る程度に洗ふのだ。

時珍曰く、凡そ湯液に入れるには、沸湯で潤濕して少頃して心を抽き去る。或は瓦で軟かに焙じて熱い間に心を去る。また丸、散に入れる場合には、瓦で焙じ熱してから風に當てて吹き冷す。かく三四回繰返せば、燥し易く、且つ藥力を損じない。或は湯に浸し膏に搗いて藥に和するもよし。滋補藥とするには酒に浸して搗る。

氣味

【甘し、平にして毒なし】別錄に曰く、微寒なり。普曰く、神農、岐

伯は甘し、平なりといひ、黃帝、桐君、雷公は甘し、毒なしといひ、李當之は甘し、小溫なりといふ。杲曰く、甘く微し苦し、微寒である。陽中の微陰であり、降であつて、手の太陰の經の氣分に入る。之才曰く、地黃、車前が使となる。欸冬、苦瓠、苦芡を惡み、苦參、青蘘、木耳を畏れ、石鍾乳を伏す。

主治

【心腹結氣、傷中、傷飽で胃の絡脈が絶し、羸瘦し、短氣のもの。久しく服すれば、身體を輕くし、老衰せず、饑えず】本經【身重、目黃、心下支滿、虛

（二）大觀ニ大才火ニ
作ル。

勞の客熱、口乾、燥渴を療じ、嘔吐を止め、痰癰を瘥し、陰を強くし、精を益し、穀物を消化し、中を調へ、神を保ち、肺氣を定め、五臓を安じ、身體を肥健ならしめ、顔色を美しくし、子を舉げしめる【別錄】「心熱を去り、煩熱、寒熱、體勞を止め、痰飲を下す」【藏器】「五勞、七傷を治し、魂を安じ、魄を定め、嗽を止め、肺痿吐膿、時疾熱狂、頭痛を定める」【大明】「熱毒、大水で顔面、肢節が浮腫するを治し、水を下す。泄精に主效がある」【甄權】「肺中の伏火を治し、心氣不足を補し、血の妄行するもの、及び經水が枯れたるもの、乳汁不下に主效がある」【元素】「久しく服すれば、身體を軽くし、目を明かにする。車前、地黄と和して丸にして服すれば、濕痺を去り、白髮を黒く變じ、夜間物を明に視得る」【藏器】「斷穀の要藥である」【弘景】

發明 宗奭曰く、麥門冬は肺熱を治するの功が多いので、その味は苦い。但し泄に專にして收に專でないものだから、寒多き患者の服用は禁物だ。心、肺の虛熱、及び虛勞を治するに、地黄、阿膠、麻仁と共に用ゐれば、經を潤ほし、血を益し、脈を復し、心を通ずるの劑となり、五味子、枸杞子と共に用ゐれば、脈を生ずるの劑となる。

（一）先天眞炁ハ人體ノ精力。

（二）大儒醫精要ニハ參チ天ニ作ル、然ラバ則チ時珍ギ門冬ノ説チ以テ麥門冬ヲ釋スルモノニシテ誤釋ニ屬ス。

元素曰く、麥門冬は、肺中の伏火で脈氣の絶せんとするを治す。五味子、人參を加へた三味をば生脈散といひ、肺中の元氣不足を補す。

杲曰く、六七月頃の濕熱の旺さかんな時に病むものは、骨乏して力無く、身體重くして氣短く、頭旋して眼黒く、甚しきは痿軟するものだ。故に孫真人は生脈散を用ゐてその（一）先天眞炁てんげんしきを補したのである。脈は人間の元氣であつて、生脈散三味中人參の甘、寒は熱火を瀉し、元氣を益す。麥門冬の苦、寒は燥金を滋しくし、水の源を清くする。五味子の酸、温は丙の火を瀉し、庚の金を補す。これが互に働いて五臟の氣を益するのだ。

時珍曰く、按ずるに、趙繼宗の儒醫精要に『（二）麥門冬は、地黄を使として服すれば、頭髮が白くならず、髓を補し、腎氣を通じ、喘促ぜんぷくを定め、肌體を滑澤ならしめ、身體上の一切の惡氣、不潔の痰を除く』とある。蓋し君あり使有るものだ。君有つて使なければ、それは獨行であつて功はない。しかし、この方はただ火盛、氣壯の患者だけに適するもので、氣弱、胃寒の患者ならば必ず服餌ふくじしてはならない。

附方

舊三、新九。

【麥門冬煎】中を補し、心を益し、顔色を悅澤にし、神を

(一七)上元、即チ江寧府ノ地ナリ。山草類
 自鮮ノ註參照。
 (一八)板橋ハ地黃ノ註
 ナ見ヨ。
 (一九)宣州ハ石部丹砂
 ノ註ナ見ヨ。
 (二〇)大觀ニ和字下ニ
 擲ノ字アリ。

(二一)大觀ニ時只ノ二
 字ヲ毎日ニ作ル。

安じ、氣を益し、人體を肥健にするもので、その力甚だ速かだ。新麥門冬を取り、心を去つて搗き熟し、汁を絞つて白蜜を和し、銀器に入れて重湯で手を停めず攪廻しながら煮る。飴のやうになれば出來上つたのだ。それを溫酒に溶かして日毎に服す。(圖經本草)『消渴飲水』(一七)上元(一八)板橋の新鮮にして肥えた麥門冬二大兩を用ゐ、(一九)宣州黃連の九節のもの二大兩——兩頭の尖つた三五節を去り、小刀で調理して皮毛を去り、塵を吹き去り、更に生布で摩拭してから秤る——を搗いて末にし、麥門冬をば肥大な苦瓠の汁に一夜浸し、然る後に心を去り、臼に入れて搗き爛らし、先の黃連末を入れて(二〇)和し、いづれも手で丸めて梧子大の丸にし、一日二回、食後に五十丸を飲で服す。渴は必ず二日で定まるものだ。重い患者ならば、第一日に一百五十丸を服し、二日目に百二十丸を服し、三日目には一百丸を服し、四日目には八十丸を服し、五日目に五十丸を服す。合藥の際の注意要項は、天炁晴明の夜に方つて藥を浸すこと、清淨の場處を撰ぶこと、婦人、雞、犬の見るを禁ずることである。もし服して效果を自覺したならば、(二二)只二十五丸を服す。服用して見て虚する傾向があるときは、白羊頭一箇を清淨に調理し、水三大斗で煮爛して汁一斗を取り、少

しづつ飲む。肉を食つてはならず、鹽を入れてもならぬ。二劑に過ぎずして平復する。(崔元亮海上集驗方) 【勞氣で絶せんとするもの】麥門冬一兩、甘草を炙つて二兩、杭米かうまい半合、棗さう二箇、竹葉十五片、水二升を一升到煎じ、三回に分服する。(南陽活人書) 【虛勞客熱】麥門冬の煎湯を頻りに飲む。(本草衍義) 【吐血、衄血】諸種の方で效なきには、麥門冬を心を去つて一斤を搗き、自然汁を取つて蜜二合を入れ、二回に分服すれば止まる。(活人心統) 【衄血の止まぬもの】麥門冬を心を去り、生地黃と各五錢を水で煎じて服す。立ろに止まる。(保命集) 【齒縫の出血】麥門冬の煎湯で嗽ぐ。(蘭室寶鑑) 【咽喉に生じた瘡】脾、肺虛熱の上攻である。麥門冬一兩、黃連半兩を末にし、煉蜜で梧子大の丸にし、二十九づつを麥門冬湯で服す。(普濟方) 【乳汁不下】麥門冬を心を去つて焙じて末にし、三錢づつを、酒に犀角さいかくを約一錢ほど磨つて溫熱したもので調へて服す。二服を過ぎずして下る。(熊氏補遺) 【下痢口渴】引飲して度なきには、麥門冬を心を去つて三兩、烏梅肉うまいにく二十箇を細かに剉み、水一升で七合に煮取り、少しづつ呷ふ。(必效) 【金石藥の發動】麥門冬六兩、人參四兩、甘草を炙いて二兩を末にし、蜜で梧子大の丸にし、一日二回、五十九づつを飲で服す。(本草圖經)

【男女の血虚】麥門冬三斤の汁を取つて熬膏し、生地黃三斤の汁を取つて熬膏し、等分を合せて濾過して蜜四分の一を入れ、再び熬つて瓶に取り收め、毎日白湯に點てて服す。鐵器を忌む。(醫方摘要)

(一) 萱 草 (宋嘉祐)

和名 しくわんざう、ほんくわんざう、
學名 Hemerocallis fulva, L.
科名 ゆり科(百合科)

釋名

忘憂(說文)

療愁(綱目)

丹棘(古今注)

鹿葱(嘉祐)

鹿劍(土宿)

妓女(吳普)

宜男

時珍曰く、萱の字は本來は諼と書く。諼は忘の意味だ。詩に『焉

得諼草。言樹之背』とあつて、その意味は、憂思自から遣るに由なく、この草を樹

て玩味して憂を忘れようといふのである。吳地方では療愁といふ。董子に『人の憂

を忘れんと欲するには、則ち之に丹棘を贈る』とあるは、一名忘憂といふからだ。

その苗を煮て食ふと、氣味が葱のやうだ。鹿が食ふ九種の解毒の草のうち、萱もそ

の一だから鹿葱と名けたのだ。周處の風土記に『懷妊の婦人がその草を身に佩びれ

ば男を生む』とある。故に宜男と名けたのだ。李九華の延壽書には『嫩苗を蔬にし

ば男を生む』とある。故に宜男と名けたのだ。李九華の延壽書には『嫩苗を蔬にし

ば男を生む』とある。故に宜男と名けたのだ。李九華の延壽書には『嫩苗を蔬にし

(一) 牧野云フ、萱草ノ本品ハ我日本ニハナイ、從ツテ和名ガナイカラ下ノヤウニ今回新ニ之レヲ命ジタ、此品ハ我がのくわんざう(Hemerocallis fulva, Don)ニ似タモノデハアルガ固ヨリ同種デハナイ、我邦ニヤぶくわんざう又單ニくわんざう又ノ名ワすれぐさト云ツテ八重咲ノモノガアル、是レハ支那ニモ産シ救荒本草ニハ之レヲ萱草花トシテ圖説シテ居ル此八重咲ノモノハ支那ノ萱草ノ一變種デ

のくわんざうノ變種
デハチイ、故ニ其學
名ハ滿蒙ノ瀋リ「*Lilium, L. var. Karwinsko, Regel.*」テ宜シ
イ、草木圖説ニわす
れぐさトアルモノハ
たうくわんざうデア
ツテ之レチわすれぐ
さト云ツテハヨクナ
イ。

〔二〕花附ハ花ノ子房
此ヲ花附ハ花瓣チモ
含ム。

〔三〕蒲トハ菖蒲チ指
ス。

て食へば、風を衝動し、人をして昏然として酔へるが如くならしめる。それで忘憂と名けたのだ』とある。これも亦一説だ。嵇康の養生論にも『神農經に、中藥は性を養ふとある。故に合歡は忿りを蠲て、萱草は憂を忘れるのだ』とある。これも食ふことの意味を取つたのだ。鄭樵の通志に『萱草、一名合歡』とあるは誤だ。合歡は本部に記載してある。

集 解

頌曰く、萱草は處處の田野にある。俗に鹿葱と名けるものだ。五月花を採り、八月根を採る。今世間では、多くその嫩苗、及び花附を採つて茹にして

食ふ。

時珍曰く、萱は下濕の地に適し、

冬季に叢生する。葉は蒲、蒜などのやうで柔かく弱く、新舊の葉が生

え代つて、四季を通じて青青として

ある。五月莖が抽き出て花を開く、

花は六出で四方に垂れ、朝開いて暮



萱

〔草〕

〔註〕字書ニ薦音煙不鮮也トアリ。

〔五〕廣中ハ廣東、廣西地方。

に^{〔五〕}薦^{しや}み、秋深くなつてから花が盡さる。その花には紅、黄、紫の三色があり、實は三の角があつて、その内に大さ梧子ほどの黒光澤のある子を有つ。根は麥門冬とよく似たもので、最も繁殖し易い。南方草木狀に『^{〔五〕}廣中の一の水葱は、形狀が鹿葱のやうで、花には紫もあり黄もある』とあるは、やはりこの草の類であらう。或は『鹿葱は花に斑文^{はんぶん}があり、萱花とは時期も違ふ』といふが、謬りだ。肥土に生えたものは、花が厚く、色が深く、斑文があり、臺が二重になつて開き、花期も數月に互る。瘠地に生えたものは、花が薄く^{うす}、色は淡く^{あは}、花期もやはり久しくないのだ。稽含の宜男花の序にも、やはり『荆楚の地方ではこれを鹿葱と呼ぶ。茹にして人に薦^{すす}め得るものだ』といつてあつて、尤も憑據すべきものである。現に東方地方では、その花跗を採り、乾して商品にし、名稱を黃花菜と呼んでゐる。

苗 花

氣 味

【甘し、涼にして毒なし】

主 治

【煮て食へば、小便の赤

澀、身體の煩熱を治し、酒疸を除く】〔大明〕【食物を消化し、濕熱を利す】〔時珍〕【茹にして食へば、胸膈^{きやうかく}を利し、五臓を安じ、人をして好んで歡樂して憂なからしめ、身體を輕くし、目を明かにする】〔蘇頌〕

根 主治

【沙淋】水氣を下す。酒疸で全身が黄色となるには搗汁を服す】（藏

器）

【大熱、衄血には、研汁一大盞に生薑汁半盞を和して少しづつ呷ふ】（宗奭）【吹

乳、乳癰で腫痛するには、酒に搗つて服し、滓で封ずる】（時珍）

發明

震亨曰く、萱は水に屬し、性は陰分に下走する。一名宜男といふところに妙味があるではないか。

附方

新四。

【全身の水腫】鹿葱の根、葉を晒乾して末にし、二錢づつに席下

の塵半錢を入れ、食前に米飲で服す。（聖惠方）【小便不通】萱草根を水で煎して頻り

に飲む。（杏林摘要）【大便秘血】萱草根と生薑を油で炒り、酒に淬して服す。（聖濟總錄）

【丹藥の中毒】萱草根の研汁を服す。（事林廣記）

（一）牧野云フ、記事
粗略テ其形狀ヲ考フ
ル事が出来ナイ。

槌胡根（拾遺）

和名無し
學名未詳
科名未詳

集解

藏器曰く、江南の川谷、蔭地に生ずる。苗は萱草のやう、根は天門冬



〔根 胡 蘆〕

に似てゐる。凡そ用ゐるには心を抽き去る。

氣味

【甘し、寒にして毒なし】

主治

【五臓を潤ほし、消渴を止め、煩を除き、熱を去り、目を明にする。治功

は麥門冬のやうだ】〔藏器〕

〔一〕 淡竹葉 〔綱目〕

和名 ちやうくわ
學名 *Lophatherum elatum*, Zoll.
科名 禾本科 (禾本科)

釋名

根を碎骨子と名ける 時珍曰く、竹葉とは形狀の形容だ。碎骨とは、


そのものが胎を下すことをいつたのだ。

集解

時珍曰く、處處の原野にある。春苗が生え、高さ數寸あり、莖細く葉緑で、さながら竹の實が地に落ちて生えた細竹の莖、葉のやうだ。根は一株に數本

〔一〕 牧野云フ、さうぐさハ大和本草ニハとうざとアル、處ニヨリテハ之レヲシヤシト稱スル。熟スル時ハ其小穗能ク衣服ニ著ク、我邦デハ中部カラ以西ノ地ニ普通デアル。
木村(康)曰ク、支那ニ一種 *L. sinense*, Rendle アル。

(一)牧野云フ、野外
普通ノ一年草デほと
ろぐさ、とんぼぐさ
ナドノ名ガアル、支
那デハ此花舞ヲ青巴
ヲ染メルヤウダガ我
日本デハ今日此種種
デアルおほぼうしば
な染料ヲ製スル。



〔葉 竹 淡〕

氣 味

【甘し、寒にして毒なし】

主 治

【葉は煩熱を去り、小便を利し、

心を清くす。根は能く墮胎し、分娩を催す】(時珍)

(二)鴨 跖 草

跖の音は隻(セ
キ)である。

(宋嘉祐補)

和 名 つゆぐさ、あなばな
學 名 *Commelina communis*, L.
科 名 つゆぐさ科(鴨跖草科)

釋 名

芩 雞舌草(拾遺) 碧竹子(同上) 竹雞草(綱目) 竹葉菜(同上) 淡

竹葉(同上) 耳環草(同上) 碧蟬花(同上) 藍姑草

集 解

藏器曰く、鴨跖あふせきは江東、淮南の平地に生ずる。葉は竹のやうで高さ一
二尺あり、花は深碧で染色の原料とするに適する。鳥嘴うしのやうな角さやがある。



〔草 葉 節 鴨〕
—— 菜 葉 竹 ——

時珍曰く、竹葉菜は處處の平地にある。三四月苗が生え、莖が紫で葉は竹のやうだ。嫩いうちは食へる。四五月花を開く。その花は蛾の形のやう、二枚が翅のやうで、碧色で愛すべきものだ。尖り曲つて鳥喙のやうなさを結び、そのさやの中に小豆ほどの實があり、その豆の中に灰黒色で皺んだ蠶屎のやうな細子がある。

工匠はその花を採り汁を取つて繪具に作り、羊皮燈などに彩色するが、蠶のやうに青碧なものだ。

苗

〔氣 味〕

【苦し、大寒にして毒なし】

〔主 治〕

【寒熱瘧瘧、痰飲丁腫、

肉癰澹滯

小兒の丹毒、發熱狂癇、大腹痞滿、身體面部の氣腫、熱痢、蛇、犬の咬

傷、癰疽等の毒

【赤小豆に和して煮て食へば、水氣、濕痺を下し、小便を利

す】〔大明〕【喉痺を消す】〔時珍〕

(三) 木村(康)曰ク、
成分澱粉粘液等
A.T.P. 189(6) 2.0;
189(70) 321.
T.S.D. 1331, W. L.
85.

附方

新四。

【小便不通】竹雞草一兩、車前草一兩の搗汁に蜜少量を入れ、

空心に服す。〔集簡方〕

【下痢赤白】

らんごう藍姑草、

即ち淡竹葉菜を湯に煎じて目毎に服す。

〔活効全書〕

【喉痺腫痛】

あふせきそう鴨跖草の汁を點ける。

〔袖珍方〕

【五痔腫痛】耳環草の碧い蟬

のやうな花を軟かく揉んで患部に納る。即效があるものだ。〔危亦林得效方〕

葵

（本經上品）

和名 ふひあふひ、あふひ

學名 *Malva verticillata*, L.

科名 あふひ科（錦葵科）

校正

菜部より此に移し入る。

釋名

露葵（綱目）

滑菜

時珍曰く、

按ずるに、爾雅翼に『葵は揆なり。葵

（一）牧野曰フ、ふひあふひハ往時ハ單ニあふひト云ツタモノデアアル然シ我邦ノ土産デハナイガ今處ニヨツテハ野生ノ狀態ニナリテ居ル事がアル、花ガ小サクテ觀ルニ足ラヌカラ觀實用トシテハ敢テ作ツテ居ナイ、此一種ニナカノリトイフモノデズル葉縁ガ微曲シテ居ル、之レヲ焙ツテ軟ニシ食用ニスルソレデ岡海苔ノ名ガ有ル、學名チ *Melva verticillata*, L.ト稱スル。

葉は日光の方に傾いて、其根を日に照らさしめぬやうにする。そこでそれを智慧があつて揆はかるとしたのだ』とある。古代には、葵を採るには必ず露の放れ落ちるのを待つたといふ。故に露葵といつたのだ。今は一般に滑菜くわつさいと呼ぶ。それは性をいつたものだ。古は葵が五菜の主位であつたさうだが、今は一向食はない。故に此の部に移入した。

集解

別錄に曰く、冬葵子は（三）少室山（せうしつざん）に生ずる。弘景曰く、秋季に葵を種ふ、

か、こひをして冬を越せば春になつて子が成る。これを冬葵といふ。薬用としては性が至つて滑利するものだ。春葵子も滑するが薬用には堪へない。故にこれは普通の葵なのだ。術家では、葵子を取つて（す）微し炒り、煨（わい）——音は畢乍（ヒツサク）である——して湿地に撒き、その上を萬遍なく踏んで置くと、朝種ゑて暮に生える。しかし（四）還たその夜一夜を越さないものだ。

恭曰く、これは通常食ふ葵のことだ。數種あるが（五）皆薬に入れては用ゐない。

頌曰く、葵は處處にある。苗、葉は菜にして食へばなかなか甘美だ。冬葵子は、古方の薬には入れたものが最も多い。葵には、（六）蜀葵、錦葵、黄葵、終葵、菟葵などあつて、いづれも功用がある。

時珍曰く、葵菜は、古代には栽培して常食としたといふが、現在では栽培することが頗る稀れた。紫葵、白葵の二種類あつて、白葵のものを勝（かち）としてある。葉は大きく、花は小さい。その花が紫黄色で、最も小さいものを鴨脚葵（あひまき）と名ける。この草の實は大さ指頭ほどで、皮が薄くして扁く、實の中の子は輕虚（けいこ）で榆莢仁（けふにん）のやうだ。四

本村 廣日ク、ぞにあふひノ花ハ葵、米、

蜀、傳局法ニテ

Purc. Malva トシテ

用キラルルモノナル

ガ、色素、粘液等ノ

外特別ノ有效成分ヲ

含有セズト。生、二

八三。

（一）少室山、即チ嵩

山ノ一峯、今ノ河南

省登封縣ノ北、大室

山ノ西ニ在リ。

（二）大觀ニ托音陀ニ

作ル。

（三）大觀ニ還チ遠ニ

作ル。

（四）大觀ニ皆チ多ニ

作ル。

（五）牧野曰フ、蜀葵

ハ次ニ本條ガアル、

錦葵ハゼにあふひデ

Malva coccinea, L.

Var. nanulana,

Mill. デアル、黄葵ハ

黄蜀葵デ此レモ下ニ

大條ガアル、終葵ハ

つるむらさき即チ
Basella rubra, L.

ニ其名ガアルガ、此
ノ終葵ハ恐ラク此レ
デハアルマイト思
フ、菟葵モ下ニ本條
ガアル。

(セ) 字書ニ枳ハ伐木
而根復生ズルナリト
アリ、ひこばえ。
(ハ) 族ハ挾ノ誤、榜
挾ハ船ト船トチ繫グ
コト、皮ノ纖維チ取
リ船ヲ引繫グ綱トス
ルコト。

五月種ゑたものは子が取れる。六七月種ゑたものは秋葵といふ。八九月種ゑたものは冬葵といひ、年を越えてから採收する。正月にまた種ゑたものは春葵といふ。しかし舊根からも春になれば生えるものだ。按ずるに、王禎わうてんの農書に『葵は陽草であ



〔子 葵 冬〕

つて、この葉は生じ易く、場末や原野に甚だ多い。土地の肥、瘠に拘はらずいづれにもあるものだ。これは百菜の主たるもので、四時食膳の備となる。本來が豊かなもので、旱天にも耐へ、味は甘くして毒なく、凶作の場合の凌とほぎにもなり、茹にも

脂せきにもなる。枯れた(セ)枳ちは榜ぼう族にもなる。根と子とはまた能く治病上の效用がある。悉く棄てるところは無い。誠に蔬茹としての重要なもので、人類生存の有益な資料だ』とある。而るに今世間では一向に食はず、栽培するものもない。

苗 氣 味

傷いためる【別録】

弘景こうけい曰く、葵葉は尤も冷にして利するものだから多く食つてはなら

ぬ。頤曰く、菜にして食へば甚だ甘美だが、性が滑利だから人體に益がない。

読曰く、その性は冷なものだが、熱して食へば熱悶を起し、風氣を動ずる。四月食へば宿疾を發する。天行病後（てんかうびょうご）に食へば失明する。霜葵を生で食へば、五種の留飲を動じて吐水する。凡そあらゆる藥を服するには、その心を食ふことを忌む。心には毒があるものだ。背面が黃で莖の紫なものは食つてはならぬ。鯉魚、黍米（しうまい）、鮓（さく）と食合はせてはならぬ。人體を害（そ）ふものだ。

時珍曰く、凡そ狂犬に咬まれた者は永くこれを食つてはならぬ。食へば毒が發するものだ。葵を食ふには蒜（さん）を共に用ゐるがよい。蒜が無ければ食つてはならぬ。又、硫黃を伏す。

主治

【脾の菜であつて、脾に宜く、胃氣を利し、大腸を滑する】（思邈）【積滯

を宣導する。妊婦がこれを食へば、胎を滑して分娩を容易にする】（蘇頌）【煮汁を服すれば、小腸を利し、時行黃病（じかうわうびやう）を治す。乾葉を末にし、及び灰に焼いて服すれば金瘡出血を治す】（甄權）【客熱を除き、惡瘡を治し、膿血を散ずる。婦人の帶下、小兒の熱毒、下痢、丹毒には、いづれもこれを食ふがよし】（汪頌）【丹石を服する人は食

ふがよし』〔孟詵〕『燥を潤ほし、竅を利する功は子と同じ』〔同上〕

發明

張從正曰く、凡そ久病で大便の澀滯するには、葵菜を食ふがよい。自然に通利するものだ。これは、滑は竅を養ふ關係からだ。

時珍曰く、按ずるに、唐の王勣の外臺祕要に『天行斑瘡で、須臾に全身白漿を戴いたやうに瀰漫するは惡毒の氣だ。高宗の永徽四年に、この瘡が西域から中國全土に蔓延したが、ただ葵菜を煮て蒜、薑と共に啖つたので終息した』とある。又、聖惠方にも『小兒の發斑には、生葵菜葉の絞汁を少しづつ與へて服せせる。惡毒氣を散するものだ』とある。按ずるに、これは今の痘瘡のことだ。現今の治療法では、患者が大小二便頻數なれば、その元氣を洩して痘が發せなくなることゝ特に處れる。葵菜は竅を滑して二便を利するものだから、甚だ不適當のやうに思はれるが、往昔の時代には反つて此の方法に賴つてゐた。古と今とでは、運氣にそれだけの異同があるので、それ故に、治療の方法そのものも、やはり時運に隨つて變化したものであるまいか。

附方

舊四、新三。

【天行斑瘡】方は前項を見よ。【肉錐怪疾】ある患者は、突

然手、足が長くなつて、やがて肉刺を生じ、錐で刺すやうに忍び難く痛んだが、葵菜を食つただけで癒えた。（夏子益奇疾方）【諸瘻の合せぬもの】先づ温めた汁清で患部を洗つて清潔に拭ひ、葵菜を微火で烘り暖めて貼る。二三百枚以内で盡く膿を引き出し、肉が生ずる。諸種の魚肉、蒜、房事を忌む。（必效方）【湯火傷瘡】葵菜を末にして傅ける。（食物本草）【蛇、蠍の螫傷】葵菜の搗汁を服す。（千金方）【誤つて銅錢を呑んだとき】葵菜の搗汁を冷して飲む。（普濟方）【丹石の發動】口乾き、欬嗽するには、毎食後に冬月葵菜の汁一盞を飲み、少時静臥する。（食療本草）

根 氣 味

【甘し、寒にして毒なし】

主 治

【惡瘡。淋を療じ、小便を利

し、蜀椒の毒を解す】（別錄）【小兒が錢を呑んで出ぬときには、煮汁を飲めば不思議の效がある】（甄權）【疳瘡で黃汁の出るを治す】（孟詵）【竅を利し、胎を滑し、消渴を止め、惡毒氣を散す】（時珍）

附 方

舊五、新七。

【二便不通】脹急するには、生冬葵根二斤の搗汁三合、生

薑四兩から取つた汁一合をよく和し、二回に分けて連服すれば直ちに通じる。【消渴引飲】（千金方）小便利せぬには、葵根五兩を水三大盞で煮た汁を早朝に服し、一日三回服

す。（いづれも聖方）【消中で尿多きもの】晝夜に七八升排尿するには、冬葵根五斤、

水五斗を三斗に煮取り、毎日早朝に二升を服す。（外臺秘要）【漏胎下血】血が盡され

ば胎兒が死亡する。葵の根、莖を灰に焼き、一日三回、酒で方寸匕を服す。（千金方）

【療疰惡毒^{へうそあくどく}】肉中に忽ち豆か栗ほどの一暗黒點を生じ、或は梅、李^{すもも}ほどになつて、

或は赤く、或は黒く、或は白く、或は青く、その黒暗點に核があり、核に深根があつて心に應じ、能く筋骨を爛らすものは、その毒が臟腑に入れば死亡する。但だ

葵根汁を飲めばその熱毒を折^{よこ}くものだ。（姚僧坦集驗方）【妬乳乳癰】葵莖、及び子を末

にし、一日二回、酒で方寸匕を服す。（合股產寶）【身體、面部の疔瘡】黃汁の出るに

は、葵根を灰に焼き、豬脂に和して塗る。（食療本草）【小兒の瘡瘡^{くさくさ}】葵根を焼いて末

にして傅ける。（外臺）【小兒の緊唇】葵根の燒灰を酥^そで調へて塗る。（聖惠方）【口吻に

生じた瘡】年を越した葵根を灰に焼いて傅ける。（外臺秘要）【蛇、虺の螫傷】葵根を

搗いて塗る。（古今錄驗）【防葵の毒を解す】葵根の搗汁を飲む。（千金方）

冬葵子

別錄に曰く、十二月に採る。機曰く、子は春生するものだ。十二月に採

取し得る筈はない。

氣味

【甘し、寒、滑にして毒なし】黃芩^{わうこん}が使となる

主治

【五臟、六腑の寒熱、羸瘦、五癰ごうに小便を利す 久しく服すれば、骨を堅くし、肌肉を長じ、身體を輕くし、天年を延べる】（本經） 【婦人の乳の内閉腫痛を療ず】（別錄） 【癰疽の頭を出す】（產乳） 【丹石の毒を下す】（弘景） 【大便を通じ、水氣を消し、胎を滑し、痢を治す】（時珍）

發明

時珍曰く、葵は氣、味俱に薄く、淡にして滑する、陽なるものだ。故に能く竅を利し、乳を通じ、腫を消し、胎を滑するのであつて、その根、葉と子と功用は相同し。按ずるに、陳自明の婦人良方に『乳婦が氣脈壅塞うようそくして乳汁が行らず、また經絡が凝滯し、乳首が脹痛し、留蓄して癰毒となりたるには、葵葉子を香しく炒つて縮砂仁と等分を末にし、熱酒で二錢を服す。この薬は氣脈を滋くし、營、衛を通じ、津液こんじきを行らすに極めて效驗がある。これは上蔡の張子愚の方だ』とある。

附方

曹八、新十二

【大便不通】十日乃至一箇月間不通なるには、肘後方で

は、冬葵子三升、水四升を一升到煮取つて服し、なほ瘥えぬときは更に作つて服す。○聖惠では、葵子末、人乳汁等分を和して服すれば立たちるちこに通ずる。【關格脹滿】大、小便不通で死せんとするには、肘後方では、葵子二升、水四升を一升到煮取り、猪

〔乙〕大觀ニニチニ
作ル。

〔丙〕轉胞ハ産後ノ小
便閉。

〔丁〕大觀ニ灌上ニ格
口ノ二字アリ。

脂を雞子一箇ほど入れて頓服する。千金では、葵子を末にして豬脂で和し、梧子大の丸にして五十丸づつを服し、效あれば止る。【小便血淋】葵子一升、水三升の煮汁を一日三回服す。(千金方) 【妊娠中の淋疾】冬葵子一升、水三升を二升に煮て分服する。(千金方) 【妊娠下血】方は上に同じ。【産後の淋瀝】通ぜぬには、葵子一合、水二升を八合に煎じ、朴硝八分を入れて服す。(集驗方) 【妊娠水腫】身體重く、小便利せず、ぞくぞくと惡寒し、起てば頭眩するには、葵子、茯苓各三兩を糝にし、一日三回、飲で方寸匕を服し、小便が利すれば癒える。(乙)轉胞の場合には、髮灰を加へるが神效がある。(金匱要略) 【出産の困悶】冬葵子一合を搗き破り、水二升で半升到煮た汁を頓服すれば、少時して分娩する。昔ある婦人が右の方を服し、厠へ行つて産兒を中へ打ち落したことがある。【逆産口禁】冬葵子を黄に炒つて末にし、酒で二錢匕を服すれば效がある。(醫嚴產寶) 【乳汁不通】方は發明の項を見よ。【胎兒死亡】葵子を末にして酒で方寸匕を服す。若し口禁して開かぬときは、瀉ぎ込む。藥が口を下れば甦る。(千金方) 【胞衣不下】冬葵子一合、牛膝一兩、水二升を一升到煎じて服す。(千金方) 【血痢、産痢】冬葵子を末にし、一日三回、二錢づつを臘茶一錢を入

（三）六觀ニ方上ニ後
字アリ。

（一）牧野曰フ、我邦
ニハ固ヨリ土産ガナ
ク往時支那カラ渡シ
タモノデ、通常觀賞
用トシテ諸州ノ民家
ニ能ク栽エラレテ居
ル、俗ニ花ガ梢マデ
咲キ上リテ了ルト梅
雨ガアケルト謂ツテ
居ル、本種ハ小亞細
亞ノ原産デアル。

れた沸湯で調へて服す。（聖惠方）【びんやうにせつ瘰癧邪熱】冬葵子を陰乾して末にし、酒で二錢を

服す。午の日に花を取つて手で搥んでも瘰癧を去る。（聖惠方）【あたま頭なき癰腫】孟詵曰く、

三日の後、葵子二百粒を取つて水で吞めば、その日の内に口が開く。○經驗方では

は、只一粒を吞めば直ぐ破れる。二粒吞めば二箇の頭が出来る。【べん便毒の初期】冬

葵子末二錢を酒で服す。（儒門事親）【はう顔面の皰瘡】冬葵子、柏子仁、茯苓、瓜瓣各一

兩を末にし、一日三回、食後に酒で方寸匕を服す。（陶隱居方）【しんくせう蜀椒の毒を解す】冬

葵子の煮汁を飲む。（千金方）【きんぎょ傷寒の勞復】葵子二升、梁米一升を粥に煮て食ひ、汗

を取れば立ちに平安になる。（聖惠）

（一）蜀葵（宋嘉祐）

和名 たちあふひ はなあふひ
學名 *Althaea rosea*, Cav.
科名 あふひ科（錦葵科）

校 正

薬部より此に移し入れ、有名未用、別錄の吳葵華を併
せ入る。

釋 名

戎葵（爾雅）

吳葵

藏器曰く、爾雅に『しやう膚——音は堅（ケン）である——

—は戎葵^{じゅうき}なり』とあり、郭璞の註に『今の蜀葵である。葉は葵に似て花は木槿花のやうだ。戎といひ蜀といふは、そこから來たので名としたものだ』とある。



〔葵〕 蜀

るに、唐代の人はそれを知らずして、退けて有名未用の部に入れ、嘉祐本草^{かいうほんそう}では、重複して菜部に蜀葵の一條を掲げてある。蓋し爾雅註、及び千金方の『吳葵、一名蜀葵』とある記述を見なかつたものであらう。今は此に併記した。

集解

頤曰く、蜀葵は葵に似て花は木槿花のやうだ。花の色に五種類あつて、小花のものを錦葵と名け、功用が更に強い。

時珍曰く、蜀葵は處處の人家で栽培し、春初に子を蒔く。冬季の舊根からも自か

時珍曰く、羅願の爾雅翼に

は、吳葵を胡葵と書き『胡とは戎の意味だ』といつてある。夏小正には『四月小滿後五日に吳葵が花咲く』とある。別錄の吳葵、即ちこの物だ。然

(三) 稽ハ枯レ莖チ云
フ。

ら苗が出るもので、嫩(みよ)いうちはやはり食へる。葉は葵葉に似て大きく、また絲瓜(しきわ)の葉のやうでもあつて岐(き)叉(さ)があり、小滿後に成長して莖の高さ五六尺になる。花は木槿に似て大きく、深紅、淺紅、紫、黒、白色、單葉、千葉などの異つたものがある。昔の人は、疎莖、密葉、翠萼、艷花、金粉、檀心などといった。誠に巧みに形容し得てゐる。しかし藥に入れるは紅、白の二色だけだ。その實の大きさは指頭ほどで、皮が薄くて扁(ひら)たい。その中に馬兜鈴(ばとうりやう)仁(に)か燕莢(えん)仁(に)のやうな仁があり、輕虚(けいこ)なもので種植し易い。その(三)稽(か)を剝つた皮は布を織り、繩に綯(な)ひ得る。一種の小さいものは錦葵と名ける。即ち荆葵のことだ。爾雅にはこれを苳——音は喬(けう)である——といつてある。その花の大きさは五銖錢ほどのもので、粉は紅色で紫の縷(る)文(もん)がある。掌禹錫の補注本草に、これを戎葵といつたのは誤だ。けれども功用はやはり似てゐる。

苗 (三) 氣 味

【甘し、微寒にして滑す、毒なし】思邈(しやう)曰く、久しく食つてはならぬ。人の志、性を鈍(にぶ)らすものだ。狗に嚙(か)まれたときこれを食へば永く癒(い)えない。李廷飛(りていひ)曰く、猪肉と食ひ合はせると、顔の色澤がなくなる。

(三) 木村(康)曰ク、
たちあふひハ一般生
藥ニ蜀葵根トシテ其
根チ用キラレ、うす
べにたちあふひ(一)

officinalis, L.) ハアル
ルデア根、アルデア
葉トシテ知ラレ、粘
滑藥、或ハ丸劑、錠
劑等ノ賦形藥トス。
主要ノ成分ハ粘液ナ
リ。生、一五五、一六
〇、一二二。

主 治

【客熱を除き、腸胃を利す】（思過）【煮て食へば、丹石の發熱、大人、小兒の熱毒下痢を治す】（藏器）【葦にして食へば、痰を滑し、淋を治し、燥を潤ほし、分婁を容易にする】（時珍）【搗き爛らして火瘡に塗り、燒き研つて金瘡に傅ける】（大明）

根 莖

主 治

【客熱。小便を利し、膿血、惡汁を散す】（藏器）

發 明

宗奭曰く、蜀葵の四時紅色で單葉のものの根を陰乾し、帶下を治するに用ゐれば、膿血、惡物を排して極めて效驗がある。

附 方

新七。

【小便淋痛】葵花根を洗ひ、剉んで水で煎じ、五七沸して服すれば神效がある。（衛生寶鑑）【小便血淋】葵花根二錢、車前子一錢を水で煮て日毎に服す。（簡易單方）

【小便尿血】葵莖方寸匕を無灰酒で一日三回服す。（千金）【腸胃の瘕】

懷忠丹——内癰で敗血、腥穢があり、殊に甚しくして臍腹冷痛するには、これを用ゐて膿を排し、血を下す。單葉の紅蜀葵根、白芷各一兩、白枯礬、白芍藥各五錢を末にし、黃蠟を溶かし和して梧子大の丸にし、空心に二十九づつを米飲で服す。膿血が出盡きるを待つて十宣散を服して補ふ。（世傳普濟方）

【諸瘡腫痛】忍び難きには、葵花根を黒皮を去つて搗き爛らし、井華水を入れて調製して貼る。（普濟方）

【小兒の

蜀 葵

吻瘡^{くしやう}】年を経て腐らんとするには、葵根を燒き研つて傳ける。聖惠方。【小兒の口瘡】赤葵莖を炙き乾して末にし、蜜を和して含む。聖惠方。

吳葵華^{ごきゐ}（別錄）「氣味」【鹹し、寒にして毒なし】禹錫曰く、蜀葵華は、甘し、

冷にして毒なし。主 治 【心氣不足を理す】（別錄）【小兒の風癰^{ふうよう}、瘰癧^{れいぎ}】（蘇頌）

（母）溜火ハ熱アルヲ云フ。

【帶下、目中の溜火^{りゅうか}を治し、血を和し、燥を潤ほし、竅を通じ、大、小腸を利す】（時珍）

發明

張元素曰く、蜀葵華は陰中の陽であつて、赤いものは赤帶を治し、白いものは白帶を治し、赤いものは血燥を治し、白いものは氣燥を治す。いづれもその寒、滑、潤、利の功力を應用するのだ。又、紫葵花は髭髮^{ひげ}を染める方に入れて用ゐる。

附方

舊二、新五。

【二便關格】脹悶して死せんとするは、二三日手當をせねば死亡する。蜀葵花一兩を搗き爛らし、麝香半錢、水一大盞で煎じて服す。根を用ゐるもよし。【痲瘡邪熱】蜀葵花の白いものを陰乾し、末にして服す。午^うの日に花を取つて手で揉んでもよく瘡を去る。蘇頌（綱目經本草）【婦人の帶下】臍腹^{せいふく}が冷痛し、顔

(五) 宣毒ノ宜ハ散ス
ルノ意。

色が痿黄し、逐日漸次に虚して衰弱するには、葵花一兩を陰乾して末にし、二錢匕づつを空心に溫酒で服す。赤帶には赤葵を用ゐ、白帶には白葵を用ゐる(聖惠方)

【横産、逆産】葵花を末にして酒で方寸匕を服す(千金方) 【酒齏赤鼻】蜀葵花を研

末して臘豬脂によく和し、夜傳けて朝洗ふ(仁存方) 【誤つて鍼、錢を吞んだとき】

葵花の煮汁を服す(普濟方) 【蜂蠟の螫毒】五月五日正午に採つた蜀葵花、石榴花、

艾心等分を陰乾して末にし、水で調へて塗る(肘后方)

子 氣 味 【甘し、冷にして毒なし】 主 治 【淋澀するもの。小腸を通じ、

分婁を催ほし、胎を落し、水腫を療じ、一切の瘡疥、并に癰疵、赤靨を治す】(大明)

發 明 時珍曰く、按ずるに、楊士瀛の直指方に『蜀葵子は、炒つて(五)宣毒藥中

に入れるが最も效驗がある。又、催生の方に、子二錢、滑石三錢を末にし、順流水で五錢を服すれば下る』とある。

附 方 舊一、新三。 【大小便閉】通ぜぬには、白花胡葵子を末にし、煮て濃汁を

服す(千金方) 【石淋破血】五月五日に採つた葵子を炒つて研り、食前に一錢を溫酒

で服す。石を下出するものだ(聖惠方) 【頭なき癰腫】蜀葵子を末にして水で調へて

傳ける。(經驗後方)

(一) 莧葵 (唐本草)

和名 うきあふひ(新編)
學名 *Mulva parviflora*, L.
科名 あふひ科(錦葵科)

釋名

天葵(圖經) 莧 音は希(キ)である。雷丸草 外丹本草)

集解

恭曰く、莧葵は、苗が石龍肉のやうで葉に光澤があり、花は白くして

梅に似てゐる。その莖は紫黒だ。煮て食へば極めて滑かなものである。所在の下澤、田間にいづれもあつて、一般に識られて居るものだ。六月、七月に莖、葉を採り、曝乾して薬に入れる。

禹錫曰く、郭璞注爾雅に『莧葵は葵に似て小さく、葉の形は葵のやうで毛がある。その毛を灼けば食へるもので、滑なものだ』とある。

宗奭曰く、莧葵は、葉は緑で黃蜀葵のやう、花は拒霜に似て甚だみやびたものだ。形は至つて小さく、初めて開いた單葉の蜀葵のやうで、黒紫色の心があり、色に姚黃と號する牡丹に似てゐるが、その葉は蜀葵である。唐の劉夢得が『莧葵、燕麥、春

(一) 牧野曰く、從來我邦本草學者ハ莧葵ヲ或ハセツぶんさウ或ハテうるさウ(ぎんせんくわ)或ハいちやくさウニ充テ居レドモ皆ナロイ加減ナ充テカタデ何レモ中ツテ居サイ、即チ下ノ學名ノモノガ其品デアルガ是レハ我邦ニハ産セザル草デアツテ、廣ク舊世界ノ北溫帶地ニ見ルモノデアルガ今日デハ其他ノ地方ニモ野生ノ姿トナツテ擴ガツテ居ル。

(二) 大觀ニ色ニ作ル。

(三) 大觀ニ平ニ作ル。

風に動搖す』といつたのはこの物だ。

時珍曰く、按ずるに、鄭樵の通志に『菟葵は天葵であつて、形は葵菜のやう、葉は大さ錢ほどで厚く、表面は青く裏面は微し紫だ。崖石に生ずる。凡そ丹石の類はこの物を得て始めて神祕な力を生ずるものだ』とある。これは雷公炮炙論に『如し形堅からんことを要せば豈紫背を忘れんや』とあるそのことで、この物が能く鉛を堅くすることをいつたのだ。また『この説は天台のある僧から傳聞した』といつてある。又按ずるに、南宮從の峴嶼神書には『紫背天葵は蜀中に産する靈草で、水際



菟葵

に生えるものだ。自然汁を取つて汞を煮れば堅くなる。また能く八石に入れて煮れば火を拒むものだ』とある。又按ずるに、初虞世の

古今錄驗には『五月五日の前日に齋戒して桑樹の下で菟葵を見つけ、翌五日正午にその桑の下へ往つて「繫藜乎俱當蘇婆訶」と咒文を唱へ、畢つて手で一回桑陰を摩でながら、口に菟葵、及び五葉草を搗んで嚼み熟し、唾のまゝそれを手に塗り、幾度となく手全體に飽まで揩み付け、そのまゝ手を洗はずに再び七日間齋戒し、然る後

(傳) 按ズルニ周禮醫學十三科ノ中咒由按摩ノ二科アリ、太醫院其傳ヲ失フ、然レドモ往往民間之ヲ傳フルモノアリ此處ニ記スルモノノ如キ其一例ナリ。

(二) 牧野曰フ、我邦デハ實用ノ方面ト觀實用ノ方面ト二様ニ栽培セラルルガ、然シ我邦ノ原産デハナイ、實用ノ方面デハ其根皮デ製紙用ノ糊ヲ製スル、粘ル故ニとろろあふひノ名ヲ得タモノデアル。

に蛇、蟲、蠍、蠚などの咬傷をその手で摩ると直ちに癒える」といふことが書いてある。時珍竊かに思ふに、古代には(前)咒由といふ醫の一科があつた。これもその類のものであらう。けれども必ずしも菴葵を用ゐたのは何の意味か判らない。若しその物の相制する力を利用するものだとしても、毒蟲を治する草は他にも數多くあるではないか。

苗 氣味

【甘し、寒にして毒なし】 主 治 【諸種の石淋、五淋を下し、

虎、蛇の毒を止める。諸瘡には搗汁を飲む。瘡に塗れば能く毒を解し、痛を止める】

(唐本)

黃 蜀 葵 (宋 嘉祐)

和名 とろろあふひ
學名 *Abutilon* *var. var.*
(*Abutilon* *var. var.*)

科名 あふひ科(錦葵科)

校 正

薬部より此に移し入る。

釋 名

時珍曰く、黃蜀葵は、別の一種のものであつて、當然薬部に編入すべきものである。然るに、嘉祐本草では敢て薬部に編入したが、それは名が蜀葵と同

(一) 葉心ハ花瓣ノ中
心ヲ六フ。

じく、氣味、主治もやはり同一で紛はしかつたためだらう。本書では此に移した。

〔集解〕

禹錫曰く。黃蜀葵花は近道處處にある。春苗葉が生え、頗る蜀葵に似て葉の尖が狭く、切れ込みが多い。夏の末に淺黄色の花を開く。六七月に採つて陰

乾する。

〔黃〕

〔蜀〕

〔葵〕

宗奭曰く、黃蜀葵と蜀葵とは別種である。この物は蜀葵中の黃なる一種ではない。(二) 葉心下にある紫檀色の部分を摘み取つて剔ね散じ、日光で乾かす。さうせねば濡爛するものだ。

時珍曰く、黃葵は二月種を下し、

或は土中に在る舊子から自然に生え、夏までに成長する。葉は大さ蓖麻葉ほどの深綠色のもので、丫字型の岐が開いて五尖になり、人の爪のやうな形で旁に小尖があり、六月花を開く。その花は鶯黄色で大さ椀ほどあり、心が紫で六瓣が側ち、朝開



き正午につぼんで日暮に落ちる。世間では側金盞花とも呼んでゐる。花が落ちるに随つて角を結ぶ。その角は長さ二寸ばかり、太さ拇指ほど、本が太く末が尖り、六稜で毛があり、老熟すると黒色になつて稜が自から綻びる。その中には芝麻房のやうな六箇の房があつて、房内に累累として子があり、その子の形は茴麻子のやうで色が黒い。この草の莖は長さは六七尺あつて、皮を剥いで繩に縛へる。

花 氣味

【甘し、寒、滑にして毒なし】

主治

【小便淋、及び分娩を

催ほし、諸惡瘡を治す。膿水の久しく癒えぬには、末にして傅ければ癒える。瘡患者に對する重要な藥である。【毒腫を消す。油に浸して湯火傷に塗る。】

附方

新八。

【沙石淋痛】黃蜀葵花一兩を炒つて末にし、米飲で一錢づつを

服す。これを獨聖散と名ける。【難産に分娩を催す】如聖散——胎藏の乾澀

で劇しき難産には、三服同時に進めるがよし。藥が腹に入れば氣が寛になり、胎が

滑して直ちに下る。黃蜀葵花を焙じて研末し、熱湯で二錢を調へて服す。花がないと

きは子半合を研末し、酒で淘つて滓を去つて服す。【胎兒死亡】下らぬには、

上記の方を紅花酒で服す。【癰疽腫毒】黃蜀葵花に鹽を摻り、罌器に入れ密封して

（本村）（康）曰ク、
ところあふひノ根ハ
黃蜀葵根（局方）トシ
テ歐洲產アルテア根
ニ代用セラル、即其
煎劑又ハ黃蜀葵金利
別（局方）チ粘滑藥ト
シテ胃腸加答兒等ニ
用キ、又鎮咳藥トシ
或ハ丸劑錠劑ノ賦形
藥トス、而シ工業上
ニハ製紙用糊料トシ
テ多量ニ用キラル。
（成分）根ニハ約一六
%ノ粘質物ヲ含ム其
大部分ハアラバン・
カラクタン・ラムノ

ザン等ナリ。
小澤武一工化、大、一
一(二五)三八九、生、
一五八、石津利作一
藥誌、明、三三(二〇
九)六三十一。

置けば、年を経ても壞れぬものだ。それを傳ければ自から平になり、自から潰れる。
花のないときは根、葉を用ゐるもよし。(直指方) 【小兒の口瘡】黃葵花を燒いて末に
して傳ける。(肘後方) 【小兒の木舌】黃蜀葵花を末にして一錢、黃丹五分を傳ける。
(直指方) 【湯火傷】瓶に麻油を盛り、咲いてゐる黃葵花を箸で摘み取つてその瓶に入
れ、密封して置く。直接手を觸れてはならぬ。負傷者があつたとき、その油を塗るが
甚だ妙である。(經驗方) 【小兒の禿瘡】黃蜀葵花、大黃、黃芩等分を末にして香油で
調へ、患部を米泔で洗淨して後に搽る。(普濟方)

子 及び根

氣 味

【甘し、寒、滑にして毒なし】

主 治

【癰疽。小便を

利す。五淋、水腫、難產。乳汁を通ずる】(時珍)

發 明

頤曰く、冬葵、黃葵、蜀葵は、形狀はそれぞれ同一でないが、性はい
づれも寒にして滑するものだ、故に主たる治療の對症も甚だ遠くはない。

時珍曰く、黃葵^{わうき}子は、古方には用ゐたものが稀だが、今は分婉を催し、小便を利
する重要な藥となつてゐる。或は單用し、或は湯、散に入れていづれもよし。蓋し
その性の滑することが冬葵子と同功だからだ。花、子と根との性と功も同様だから

互用こようしてよし 花がなければ子を用ゐ、子がなければ根を用ゐる。

附方

曹二、新二。

【臨産催生】

宗奭そうしやく曰く、臨産時に、四十九粒を研り爛らし

（舊）大觀ニ方ノ上ニ後字アリ。

（金）便癰ハ便毒即横痃和名ヨコネ。

て溫水で服すれば良久して分娩する。○經驗きんけん方では、子を焙じ研つて三錢を井華水で服す。子が無ければ根を煎じて汁を服す。【（金）便癰の初期】淮地方では、黃蜀葵子十七粒、皂角さうきやく半挺を末にし、石灰と醋とで調へて塗る。永類鈴方。【癰腫の破れぬもの】黃葵子を酒に研つて服す。一粒で一箇の頭が付く。神の如き效がある。（衛生易簡方）

【打撲傷損】黃葵子を酒に研つて二錢を服す。（海上方）

龍葵（唐本草）

和名 いねほはづき
學名 Solanum nigrum, L.
科名 なす科（茄科）

校正

圖經の老鴉眼睛草を併せ入る。

釋名

苦葵（圖經）

苦菜（唐本）

天茄子（圖經）

水茄（綱目）

天泡草（綱目）

老鴉酸漿草（綱目）

老鴉眼睛草（圖經）

時珍曰く、龍葵とはその性が滑して葵のや

うだといふ意味だ。苦とはその菜の味に冠したもの、茄かとはその葉の形の形容であ

（金）牧野曰フ、廣ク世界ノ諸地ニ生ズル雜草ノ一デ又有毒植物ト稱セラルル。

(二) 益州ハ金部金ノ註ヲ見ヨ。

(三) 關河ハ當時ノ關内、河東兩道チイフ。即チ今ノ陝西省ノ渭水以北、及び山西省ノ地ヲ指ス。

(四) 排風ハ白英ノ一名、和名ヒヨドリジワウ。

る。天泡、老鴉眼睛らうあがんせいなどいふは、いづれも子の形の形容だ。酸漿さんしやうの形に類するものだから、酸漿に老鴉を冠して區別したのだ。五爪龍ごさうりうにも老鴉眼睛草なる名があり、敗醬、苦苣くきよのいづれにも苦菜と名があるが、これは同名異物である。

集解

弘景曰く、(二)益州に苦菜といふがある。これは苦蕒くきざのことだ。



〔葵 龍〕
——茄 天——

恭曰く、苦蕒、即ち龍葵であつて、俗に苦菜とも名けるが、茶チャのことではない。龍葵は所在にあるもので、(三)關、河の地方ではこれを苦菜といふ。葉は圓く、花は白い。子は牛李子ごりしのやうで、生では青く熟すれば黒い。煮れば食へるが生では食へない。

頌曰く、龍葵は近い地方にはやはり稀で、北方地方にだけある。その地方ではこれを苦葵といふ。葉は圓く、(四)排風はいふうに似て毛がない。花は白色だ。子もやはり排風に似たもので、生では青く熟すれば黒い。その赤いものをば赤珠と名ける。これも藥に入れ得るものだ。又曰く、老鴉眼睛草は江、湖地方に生ずる。葉が茄子かしの葉

のやうだから天茄子と名ける。或はこれは漆姑草しつこそうだともいふが、漆姑、即ち蜀羊泉のことであつて、已に本經の草部に記載がある。一般にはやはり明確な識別がつかない。

(五) 燈籠草、和名は
はづき。

時珍曰く、龍葵、龍珠は一類の二種であつて、いづれも處處にある。四月苗が生え、嫩いうちは食物にもなり、柔かで滑かなものだ。漸漸に高くなつて二三尺に達し、莖は太さ箸ほどで、(五) 燈籠草に似て毛がない。葉は茄の葉に似て小さく、五月以後に小さい白花を開く。花は五出で蕊が黄色だ。その結子は正圓形で大さ五味子ほど、上に小蒂があつて數顆が共に綴り付いてゐる。味は酸い。その中に細子があつて、やはり茄子の子のやうだが、但し生は青く熟すれば黒いものを龍葵といひ、生は青く熟すれば赤いものを龍珠といふ。功用も共に彷彿たるもので、甚だ懸隔はないものだ。蘇頌の圖經には、菜部に一旦説明した龍葵を、また外類に於て老鴉眼晴草として重複記載してある。蓋し同一物たることを知らなかつたのだ。又、老鴉眼晴草を蜀羊泉といふ説も誤つてゐる。蜀羊泉は、葉が菊に似て紫の花を開き、子は枸杞くきに類するものだ。詳細は草部のその本條に記述してある。楊慎の丹鉛錄に『龍

(三) 木村康)曰ク、

全草中ニ極少量ノアルカロイド(散腫作用ヲ有ス)ヲ含有ス、又果實ハソウニン及サボニンヲ含有ス。

F. Schmidt und Schütte: Arch. Pharm. 1891 (229) 527.

Delessens: Jour. de Pharm. (1820) (6) 374.

Waege: Pharm.

Contrahl. 1832, 712

U. S. D. 1619, P. T.

1909 (65) 422; W.

P. 678; A. E. T. P.

1895 (36) 361.

(七) 火丹ハ丹毒ノコ

葵、即ち吳葵だ』といひ、反つて本草を誤として、素問、千金に「四月吳葵が花咲く」とあるを引證してあるが、それは千金方に『吳葵、即ち蜀葵なり』とあつて、已に明白な問題なることに氣が付かぬのだ。今いづれも誤を正して置く。

苗 (六) 氣味

【苦く微し甘し、滑、寒にして毒なし】

【主治】【これを食へ

ば、勞を解し、睡を少くし、瘧熱腫を去る】(唐本) 【風を治し、男子の元氣、婦人の敗血を補益する】(蘇頌) 【熱を消し、血を散ずる。丹石の毒を壓するにこれを食ふがよし】(時珍)

附方

舊一。【熱を去り、睡を少くす】龍葵菜を米と共に羹、粥に煮て食ふ

(食醫心鏡)

莖葉根 氣味

苗に同じ。【主治】【擣き爛して土に和し、丁腫、火丹

瘡に傅けるが良し】(孟詵) 【癰疽腫毒、跌撲傷損を療じ、腫を消し、血を散ず】(時珍)

【根を木通、胡荽と共に湯に煎じて服すれば小便を通利す】(蘇頌)

附方

舊四、新八。【小便を通利す】方は前項にある。【高處より墜下したるも

の】死せんとするには、老鴉眼晴草を取り、莖、葉を搗いて汁を服し、渣を患部に

傳ける。(唐瑤經驗方) 【火焰丹腫】老鴉眼睛草の葉に醋を入れ、細研して傳ける。能

く赤腫を消す。(蘇頌圖經本草) 【頭無き癰腫】龍葵の莖、葉を搗いて傳ける。(經驗方)

【發背癰疽】瘡となつたものには、蘇頌の圖經には『龍葵一兩を末にし、麝香一分と研りまぜて塗るが甚だ善し』とある。○袖珍方には『一切の發背癰疽、惡瘡には、蝦蟇がま一匹と老鴉眼睛草の莖、葉とを共に搗き爛して傳ける。直ちに散ずる神效がある』とある。【諸瘡惡腫】老鴉眼睛草を酒に搗つて服し、渣を傳ける。(普濟方) 【丁腫毒瘡】黒色で焮腫きんしゆするは丹石を服した毒、赤色のものは肉麪の毒である。龍葵根一握を洗つて切り、乳香末、黃連三兩、杏仁六十箇と搗き和して、錢三枚ほど厚さの餅にし、瘡の大、小に隨つて傳ける。痒かゆさを覺えたときは直ちに取換へる。また痒くして忍び難きときも絶對に搔き動かしてはならぬ。かくて久しい間焮ただれて瘡中が石榴子のやうになるを待ち、手早くシュツと藥を剝ぎ去り、時時甘草湯を溫めて洗ひ、洗つて後蠟を貼る。終身羊血を食つてはならぬ。もし龍葵が無いときは蔓菁根を代用する。(聖濟總錄) 【天泡濕瘡】龍葵の苗、葉を搗いて傳ける。【吐血して止まぬもの】天茄子てんかしの苗半兩、人參二錢半を末にし、二錢づつを新汲水で服す。(聖濟總錄)

(一) 牧野曰フ、我邦ノ本草學者ハ之レヲはだかほほづキ(Thibocapsicum, anomalum, Makino. = Capsicum anomalum, Fr. et Sav.) トナセド穩當デナイ、是レハいねほほづキノ赤キ實ヲ結ブ一變種デアルガ我日本ニハ産シナイ品デアル。

【蚤虱の驅除】天茄葉を席下に鋪^しく。翌日は盡く死ぬ。【多年の惡瘡】天茄葉を貼

る。或は末にして貼る。(救急良方) 【産後の腸出】收まらぬには、老鴉酸漿草一把を

水で煎じ、先づ熏じて後に洗ふ。收まれば止める。(救急方)

子 七月採收する。主治 【丁腫】(唐本) 【目を明にし、身體を軽くするに甚

だ良し】(甄權) 【風を治し、男子の元氣、婦人の敗血を益す】(蘇頌)

(一) 龍 珠 (拾 遺)

和名 あかみのいねほづき
學名 *Solanum nigrum*, L. var. *miniatum*, Hook. f.
科名 なす科(茄科)

釋 名

赤珠

頌曰く、龍葵子の赤いものを赤珠と名けたもので、形容である。

集 解

甄權曰く、

龍葵の珠の赤いものを龍珠と名ける。汁を揉み去れば食へ

る。能く白髪を變じて黒くするものだ。藏器曰く、龍珠は路傍などに生える。子は

圓くして龍葵に似てゐるが、ただ熟すると正赤色になるものだ。時珍曰く、龍珠、

龍葵は子の黒、赤で區別するのだが、その實は一物の二色を強ひて二種に區別した

ものだ。

苗 氣味 【苦し、寒にして毒なし】 【主治】 【能く白髪を變じ、睡れなく

する。諸熱毒、石氣の發動に主效があり、中を調へ、煩を解す】 (藏器)

【發明】 權曰く、龍珠を服すれば、白髪を變じて黒くし、老衰を防ぐ。若し生

で食つて、苦味を能く味ひ得て他の菜を食はぬならば、十日の後には神祕的な現象がある。葱薺と共に食つてはならぬ。根も藥用に入れる。

子 氣味 菜に同じ 【主治】 【丁腫】 (藏器)

(一) 酸漿 (本經中品)

和名 はなづき
學名 *Physalis Alkekengi, L.*
科名 なす科 (茄科)

【校正】 菜部の苦耽、草部の酸漿、燈籠草を共に一條に併記す

る。

【釋名】 醋漿 本經 苦葢 音は針(シン)である。苦耽(嘉祐) 燈籠草 唐本

皮葶草(食療) 天泡草(綱目) 王母珠(嘉祐) 洛神珠(同上) 小なるものを苦蘢と名ける。藏器曰く、爾雅に『苦葢は寒漿なり』とあり、郭璞の注に『即ち今の酸

(一) 牧野曰フ、我邦産ノものは、皆ハ歐洲産ノ *Physalis Alkekengi, L.* トハ同物デハナイラシイガ然シ兩者ハ能ク骨タモノデアル、我邦ノモノハ *P. Fumicarpa, Michx.* デアルガ支那デハ其品種ガドウイフ具合ニナツテ居ルカ分ラフ故今姑ラク廣イ意味デふらんしえ、へむずれ

一ナドノ諸氏ノ説ニ從ヒ下ノ學名ヲ用キテ置ク。

釋名ノ中ノ苦蕒ハ小ナル者トノミアツテ其形狀ノ特徵ガ記シテナイカラ果シテ先輩ガ爲シタヤウニ之レヲせんなりはばづキ (Physalis angulata, L.) ニ充テテヨイカ薩トハ分ラナイガ植物名實圖考ニ酸漿トシテせんなりはばづきノ圖ガ掲ゲテアル事カラ思ヒ廻ラシテ、ソレハ多分申ツテ居ルデアラウト思フ。

(一) 苦ハ衍字本書ニナシ。

(二) 皮弁ハ武官ノ冠。

(三) 燕京、即北京、今ノ北平。

漿である。江東地方では苦蕒と呼び、小なるものを苦蕒くしやくといひ、また小苦蕒せうくしやくとも呼ぶ』とある。崔豹の古今注には『蕒、一名蕒子。實の形は皮弁ひべんのやうで、その子は珠のやうに圓い』とある。

時珍曰く、酸漿は子の味に因つて名けたもの、苦蕒、苦耽は苗の味に因つて名けたもの、燈籠とうろう、皮弁はさやの形を形容した名稱、王母、洛神の珠といふは子を形容



〔藥 酸 漿〕
——草 籠 燈——

した名稱だ。按ずるに、楊慎の扈言しげんに『本草の燈籠草、苦耽、酸漿は皆同一物だ。本草の記述、編輯は、一時代、一人で行はれたものでない。それで重複したのだ。』燕京えんきやうの野果に紅姑娘こうこやうといふがある。外に絳あかい囊を垂れ、

中に珠のやうな赤い子を含み、酸く甘くして食し得る。房房とした豊かなもので、他の翠草と共に庭先などへ植ゑ遶めぐらすも面白い風情のものだ。蓋し姑娘とは瓜囊の訛りであつて、古代には瓜、姑は同音だ。嬢、囊もやはり發音が似寄つたものだ』といつてある。これは當を得た説だ。故に本書には、本經の酸漿、唐本草の燈籠草、

〔金〕荆、楚ハ石部石炭ノ楚ノ註參照。

〔六〕薤、大觀ニ薤ニ作ル、野菜ノコト。

〔七〕關中ハ山草類淫羊藿ノ註ヲ見ヨ。

宋嘉祐本草の苦耽を、共に一括同條に記載したわけである。

〔集解〕別錄に曰く、酸漿は〔金〕荆、楚の川澤、及び人家、田園の中に生ずる。

五月採つて陰乾する。弘景曰く、酸漿は處處に多くある。苗は水茄すゐかに似て小さく、葉はやはり食へる。子は房になり、房の中に梅、李ほどの子があつて、全部が黃赤色だ。小兒はこれを食べふ。

保昇ほせい曰く、酸漿、即ち苦葳である。根は〔六〕薤せ芹きんのやう、色は白く極めて苦い。

禹錫う曰く、苦耽は古い廢墟の垣ほりや塹ほりの間に生える。高さ二三尺、子は口をすべた袋のやうな、やになり、その中の子は珠のやうで、熟すれば赤色になる。〔七〕關中くわんちゆう地方では、これを洛神珠、一名王母珠、一名皮弁草といふ。一種の小さいものは苦藺と名ける。爾雅にいふ黃蔭くわういんだ。

恭曰く、燈籠草は所在にある。枝幹の高さは三四尺、燈籠のやうな形の紅花があつて、中に可愛い紅子がある。根、莖、花、實、いづれも藥用に入れる。

宗奭そうせき曰く、酸漿、即ち苦耽である。嘉祐には、苦耽の一條が重複してある。天下到處にあるもので、苗は天茄子のやうだ。小さい白花を開いて青い殻こてを結び、熟

(ハ)落蘇ハ茄ノ一名。

すれば深紅になる。殻の中の子は櫻ほどの大きさで、やはり色は紅い。その櫻のやうな中にまた細い(ハ)落蘇子のやうな子がある。食つて見ると青草の臭氣があるものだ。

時珍曰く、龍葵、酸漿は一類の二種、酸漿、苦藺は一種の二物であつて、ただ大

なるものが酸漿、小なるものが苦藺と區別すればよい。敗醬にも苦藺なる名稱はあるが、これとは同じくない。龍葵と酸漿とは苗、葉が一樣だが、龍葵は、莖が光つて毛が無く、五月から秋に入るまで小さい白花を開く。その花は五出で蕊は黄色だ。殻のない子を結び、數顆が纍纍として一枝に著き、子には蒂蓋があり、生は青く熟すれば紫黒になる。酸漿は、同時期に小花を開くが、色は黃白、心が紫で蕊は白い。花の形は盃のやうで瓣がなく、ただ五箇の尖があつて一箇の鈴のやうな殻を結ぶ。

殻はすべて五稜で、一枝に一顆が下へ懸り、燈籠のやうな形狀だ。殻中には龍葵子のやうな一箇の子があつて、生は青く熟すれば赤い。かやうに相異點を擧げて區別すれば自から明白なものだ。按ずるに、庚辛玉冊に『燈籠草は全國各地いづれにもあるが、ただ(ハ)川、陝のもの最も大きい。葉は龍葵に似たもので、嫩苗のうちは食へる。四五月花を聞いて實を結ぶ。實は四葉に盛られて燈籠のやうだ。河北では

(ハ)川、陝ハ四川省、
陝西省ノ地ヲ指ス。

酸漿と呼ぶ」とある。この説と楊慎の説とに據れば、燈籠と酸漿の同一物なることは尤も證だ。唐慎微は、三葉の酸草を酸漿の章の後に附録したが、蓋し同名異物なるに氣が付かなかつたのだ。その草は草部の八、酢漿の條下に記載してある。

苗 葉 莖 根

(一〇)

氣 味

【苦し、寒にして毒なし】

禹錫曰く、小毒あり。

恭曰く、苦し、大寒にして毒なし。時珍曰く、方士は、汁を取つて丹砂を煮、白礬を伏し、三黃を煮、硝、硫を煉る。(一〇) 主治 【酸漿は、熱の煩滿を治し、志を

定め、氣を益し、(一〇) 小道を利す】(本經)

主 治

【酸漿は、熱の煩滿を治し、志を

い】(弘景) 【燈籠草は、上氣欬嗽、風熱を治し、目を明にする。根、莖、花、實いづ

れも宜し】(唐本)

【苦耽の苗、子は、傳尸、(一〇) 伏連、鬼氣、疰忤、邪氣、腹内の熱結

で目黃となり、食物が通らず、大小便の澀るもの、骨熱欬嗽、多睡勞乏、嘔逆痰壅、

疥癬痞滿、小兒の無辜癰子、寒熱大腹を治し、蟲を殺し、胎を落し、蠱毒を去る。

いづれも煮汁を飲み、また生で搗いて汁を服す。膏に研つて小兒の閃、癰に傅け

る】(嘉祐)

發 明

震亨曰く、燈籠草は苦くして能く濕熱を除き、輕にして能く上焦を治

(一〇) 木村(康)曰く、
全草中フイザリント
イフ無品形ノ苦味質
チ含有ス、又果實中
枸橼酸及微量ノアル
カロイドアリ(一) 溝
口氏(二)ハ根ヨリ子
宮緊縮作用アル結晶
性物質ヲ得、之ヲヒ
ストンナル名稱ヲ附
セルモ、單一ノ物質
ナリヤ否ヤ未ダ化學
的性狀詳カラズ。
(一) D. sanguis et
Chinurid: J. J. Har-
m. 1862 (21) 21.
(二) 溝口龍三(衛生
試験所彙報大、一三、
二四) 二一。
(三) 木村(康)曰く、
ヒストンチ動物ニ就

テ試ミタル所ニヨレバ最初大腸ヲ麻痺セシメ、次ニ大量ニアリテハ呼吸中樞ノ麻痺ニヨリ死ニ至ル、特ニ著シキハ子宮ニ對スル作用ニシテ、諸動物ヨリ剔出セル子宮ハ少量ノヒストンニヨリ蠕動運動旺盛トナリ、且ツ緊縮ヲ營ムヲ見ルトイフ。

(二)木經、大觀共小ナ水ニ作ル、金陵本小ニ作ル水ノ誤ナリ。(三)快連ハ勞極骨蒸ヲ云フ。

(四)癖ハ腹中ノ痞塊閤ハ急症ヲ云フ。

(五)佛耳草ハ和名ははぐさ。

(六)大觀ニ煩下滿字アリ。

(七)之、大觀ニ其實ニ作ル。

(八)別錄、當ニ木經

するものだ。故に熱欬咽痛に主效がある。この草は熱痰欬嗽を治し、(五)佛耳草は寒痰欬嗽を治するもので、片苓清金丸と共に用ゐれば更に效がある。

時珍曰く、酸漿は濕を利し、熱を除くもので、熱を除くから肺を清くして咳を治し、濕を利するから能く痰を化して疰を治するのである。ある患者は虛乏咳嗽で痰があつたが、予は湯中にこれを加へ用ゐて奏效した。

附方

新三。

【熱欬咽痛】燈籠草を末にして白湯で服す。これを清心丸と名ける。同時に醋で調へて喉の外部へ傳ける。(丹溪要)

【喉瘡痛】燈籠草を炒り焦して研末し、酒で調へて呷ふ。(醫學正傳)

子氣味

【酸し、平にして毒なし】別錄に曰く、寒なり。【主治】【熱(六)

煩。志を定め、氣を益し、水道を利す。難産には、(七)之を吞めば立ろに産する】(八)

(別錄)【これを食へば熱を除き、黃病を治す。就中小兒に益がある】(蘇頌)

熱、尸疰、疰瘦、瘡癰熱結を治す。苗、莖と同功である】(嘉祐)

附方

新二。

【酸漿實丸】三焦、腸、胃の伏熱、婦人の胎熱、難産を治す。

酸漿實五兩、芡實三兩、馬蘭子を炒り、大鹽、榆白皮を炒つて各二兩、柴胡、黃芩、

ニ作ルベシ。

橘樓根くわつろうこん 蘭茹らんじょ 各一兩を末にし、煉蜜で梧子大の丸にし、三十丸づつを木香湯で服す。
(聖濟總錄) 【天泡濕瘡】天泡草の中の珠を生で搗いて敷く。また末にして油で調へて敷くもよし。(鄧才雜興方)

(一) 蜀羊泉 (本經中品)

和名 きくばほろし(新稱) ふるかはなすび
學名 *Solanum septemlobum*, *Bunge*.
科名 なす科(茄科)

釋名

羊泉 別錄 羊飴 別錄 漆姑草

時珍曰く、諸名稱の意味は判然し

ないが、能く漆瘡を治するので漆姑しつこといふ。

集解

別錄に曰く、蜀羊泉は蜀郡の(一)山谷に生ずる。弘景曰く、(二)方には一

向用ゐない。世間でも識らぬ。

恭曰く、この草は俗に漆姑と名けるものだ。葉は菊に似て花は紫色、子は枸杞子

に類する。根は遠志えんじのやうで、心がなくて糝さんがある。所在の平澤にあるもので、陰

濕の地に生ずる。三月、四月に苗、葉を採つて陰乾する。

藏器曰く、陶氏の杉材さんさいの注に「漆姑は葉が細く、多く石の邊に生える。能く漆瘡

(一)牧野曰フ、從來我邦ノ本草家ハ蜀羊泉ヲひよどりじやうこニ充ツレドモソレハ中ツテ居ナイ、蜀羊泉ハ救荒本草ニハ青杞ト出テ居ルガ今其圖ヲ見テモ其レガひよどりじやうこデナイ事ガ能ク分ル、本品ハ直立シタ草デ其葉ハ菊葉樣ニ分裂シテ居ル、ひよどりじやうこハ蔓木デ支那ノ名ハ白英デアツテ蜀羊泉トハ全ク別ノ種類デアル。
(二)大觀ニ川ニ作ル字アリ。

を療ずるものだ』といひ、蘇氏は『漆姑は羊泉のことだ』いふ。按ずるに、羊泉といふは大きな草だ。漆姑草は鼠の足跡ほどのもので、堦段や石疊の間などの陰處に

生える。氣は辛烈なもので、揉んで漆

瘡に付け、また溪毒にも主效がある。

そこで名が同じいのだ。

頌曰く、或は老鴉眼睛草、即ち漆姑

草だといふが、漆姑ならば蜀羊泉のこ

とだ。一般人にはよく正確に判らない。

時珍曰く、漆姑に三種ある。蘇恭のいふものは羊泉のことだ。陶氏、陳氏のいふ

ものは小草のことだ。蘇頌がいふ老鴉眼睛草は龍葵のことだ。又、黃蜂が窠を作る

に、漆姑草の汁を啣んで帯にすると、即ちこの草だ。

氣味

【苦し、微寒にして毒なし】

主治

【(蜀) 秃瘡、惡瘡、熱氣疥癩、癩

癬の蟲(本經)】【齲齒、婦人の陰中内傷、皮間の實積を療ず(別錄)】【小兒の驚に主效

があり、毛髪を生ずる。搗いて漆瘡に塗る】(蘇恭)】【蚯蚓の氣に呵せられたるもの



〔蜀羊泉〕
——草姑漆——

(蜀) 秃瘡、本經二頭
禿二作ル。

(七) 蕪ノ誤。

(一) 牧野曰フ、從來ノ學者ガ爲セシヤウニ之レナいちやくさう (Tinea japonica, Steb.) ニ充ツルハ非テアル、いちやくさうハ支那デハ鹿街早ト稱スル。

(二) 江廣ハ江西、廣東兩省ヲ指ス。
(三) 淮北ハ淮河以北ノ安徽、江蘇ノ地ヲ指ス。

には、搗き爛らして黃丹を入れて(モ) 含(ふ) 時珍 記載は摘玄方にある。

附方

新一。

〔黃疸疾〕漆草一把の搗汁を酒に和して服す。三五回に過ぎずして愈える。(摘玄方)

(一) 鹿蹄草 (綱目)

和名無し
學名未詳
科名未詳

釋名

小秦王草 (綱目) 秦王試劍草

時珍曰く、鹿蹄(ろくてい)とは葉の形の形容だ。

よく金瘡を合はせるものだから試劍草と名けたのだ。又、山慈姑(さんじこ)にも鹿蹄なる名稱

はあるが、これとは異ふ。

集解

時珍曰く、按ずるに、軒輅述

〔草 蹄 鹿〕



寶藏論に『鹿蹄は江廣地方の平陸、及び寺院の荒地に多く生ずる。淮北地方には絶えて少い。川、陝にもある。苗は莖葉に似て葉が頗る大きく、背面は紫だ。春紫の

花を開き、天茄子のやうな青い實を結ぶ。雌^し黄、丹砂^{たんしゃ}を制し得るものだ』とある。
氣味 (缺) **主治** 【金瘡出血には、搗いて塗れば止まる。又、一切の蛇、
 蟲、犬の咬毒に塗る】(時珍)

(一) 敗 醬 (本經中品)

和名 なまめし、なごめし
 學名 *Patrinia villosa, Thunb.*
 科名 なみなへし科(敗醬科)

釋名

苦菜(綱目) 苦蕒(綱目) 澤敗(別錄) 鹿腸(本經) 鹿首(別錄) 馬

草(別錄)

弘景曰く、根に古く腐敗した豆醬^{づしやう}の臭氣があるのでかく名けたものである。



敗 醬
 苦 菜

時珍曰く、南方地方では、嫩^{わか}いうちに採つて暴し、蒸して菜に作つて食ふ。味が微苦で、古い醬の臭氣があるところから名けたものだ。又、苦菜といつて苦蕒^{くかひ}、龍葵と同名を呼び、また苦蕒と呼んで酸

(一) 牧野曰フ、李時珍ノ説ク所ハ蓋シなごめしヲ指スナラント思ヒ姑ク敗醬ヲ其レト定メ置ク、松村任三博士ノ改訂植物名彙前編ニ植物名實圖考卷ノ十四ニアル攀倒甌チなごめしトスルハ非デアツテ是レハ其品デハナイ、なみなへし(なみなめし) *Patrinia villosa, Thunb.* 植物名實圖考卷ノ十五ニアル黄花龍芽デアルト思フ。

醬と同名だが、苗の形状を見るに同じでない。

集解

別錄に曰く、敗醬は江夏の川谷に生ずる。八月根を採つて暴乾する。

弘景曰く、近道に産する。葉は稀糞に似て根の形は柴胡のやうだ。

恭曰く、この藥は近道には産しない。多くは岡や嶺の地に生ずるもので、葉は水蓼や微蘄に似て叢生する。花は黃、根は紫で、陳い醬のやうな色だ。その葉は一向稀糞には似てゐない。

頤曰く、江東にもある。形状は蘇恭の所説の通りだ。

時珍曰く、處處の原野にある。俗に苦菜と名け、野人はこれを食べ、江東地方では毎にこれを探つて蓄へて置く。春初に苗が生え、深冬に始めて凋む。初めは葉が地に布いて生え、莖菜の葉に似て狭く長く、鋸齒があり、綠色で表面は色が深く背面は浅い。夏、秋に莖の高さ二三尺になつて柔弱なものだ。數寸のところに一節があり、節の間から葉が生え、四散して繖のやうになる。その莖の頂端に芹花か蛇牀子花のやうな形の花が簇つて開き、小さい簇つた實を結ぶ。根は白、紫で頗る柴胡に似てゐる。吳普は『その根は桔梗に似てゐる』といひ、陳自明は『その根は蛇莓

(一) 江夏ハ漢ノ郡名、今ノ湖北省雲夢縣東南ニ治ス。隋ニ江夏縣ヲ置ク。即チ湖北省治武昌府ノ地ナリ。

(三) 水蓼、即チ毛茛。

(得) 木村(康)曰ク、
なみなめしノ根ニハ
精油八%ヲ含ム。
W. P. 747.

(金) 大觀ニ痛上疾字
アリ。

(金) 大觀ニ鼻鱗鼻
洪ニ作ル。
(七) 大觀ニ努ニ作ル。

根に似てゐる」といふが、いづれも違ふ。

根 苗も同じ。【修 治】 數曰く、凡そ採取したならば、粗く杵き、甘草葉を入

れて一一相對するやうに拌ぜ、午前十時から午後二時まで蒸して甘草葉を去り、焙
乾して用ゐる。

【氣 味】 【苦し、平にして毒なし】 別錄に曰く、鹹し、微寒なり。權曰く、

辛く苦し、微寒なり。大明曰く、酸し。時珍曰く、微し苦くして甘を帯びてゐる。

主 治 【暴熱火瘡、赤氣疥癩、疽痔、馬鞍熱氣】(本經) 【癰腫、浮腫、結熱風

痺、不足、産後の(金)痛を除く】(別錄) 【毒風癰痺を治し、多年の凝血を破り、能く膿

を化して水にする。産後の諸病。腹痛、餘疹、煩渴を止める】(甄權) 【血氣心腹痛を

治し、癰結を破り、分娩を催ほし、胞を落す。血運、(方)鼻衄、吐血、赤、白帶下、

赤眼、障膜、(七)瘡肉、(七)瘡耳、瘡節、疥癬、丹毒。膿を排し、瘻を補ふ】(大明)

發 明 時珍曰く、敗醬なるものは、手、足の陽明、厥陰の藥であつて、善く膿

を排し、血を破る。故に仲景の治癰、及び古方の婦人科で皆これを用ゐたのだ。こ
の物は得易いものだが、後世では用ゐることを知らない。蓋しこの物に關する智識

が缺けてゐるのだ。

附方

舊二、新三。

【膿のある腹癰】

葱苡仁よぐい にんぶし附子はいしやうたう敗醬湯——葱苡仁十分、附子

二分、敗醬五分を搗いて末にし、方寸匕つづを水二升で一升到煎じて頓服する。小便が通じて癒えるものだ。（張仲景金匱玉函）【産後の惡露】七八日繼續して止まぬには、

敗醬、當歸各六分、續斷、芍藥各八分、芎藭きうきう、竹茹ちくじょ各四分、生地黃を炒つて十二分、

水二升を八合に煮取つて空心に服す。（外臺秘要）【産後の腰痛】乃ち血氣が流入して

腰腿が痛み、寢返もならぬものだ。敗醬、當歸各八分、芎藭、芍藥、桂心各六分、

水二升を八合に煮て二回に分服する。葱を忌む。（廣濟方）【産後の腹痛】雖きりで刺すや

うに痛むには、敗醬草五兩、水四升を二升到煮取り、一日三回、二合づつを服する

が良し。（衛生易簡方）【蠱癰尿瘡くもうちやう】腰を遶るものには、敗醬の煎汁を塗るが良し。（楊氏

産乳）

（一）牧野曰フ、落葉小灌木デ通常觀賞用トシテ栽植セラレテ居ル、支那ノ原産デ我邦ヘハ往時同國カラ渡シタモノデア

迎春花（綱目）

和名 わうばい
學名 *Jasminum nudiflorum*, Lindl.
科名 ひびらぎ科（木犀科）

集解

時珍曰く、處處の人家で挿木として栽ゑる。叢生するもので、高いも


のは二三尺になり、莖は四角で葉が厚い。

葉は初生の小椒葉せうぎやうのやうだが齒がなく、表

が青く裏が淡く。節に對して小枝が生え、

一枝に三葉がある。正月の初に瑞香花ずいかうのや

うな黄色の小花を開き、實は結ばない。



葉

氣味

【苦く濇しよし、平にして毒なし】

主治

【腫毒、惡瘡には、陰

乾して研末し、二三錢を酒で服す。汗が出て瘡かさえる】〔衛生易簡方〕

(11) 木村(康)曰ク、
わうばいハシリギ
ンクリコシドチ含ム
W. P. 602, J. P. C.
1907 (24) 523; 1909
(23) 336.

(12) 牧野曰フ、從來
款冬チ我邦ノふヤ
(Petastus japoni-
cus, Miq.)ニ充テ來

レドモ是レハ全ク誤
リテアル、款冬ノ葉
ハ廣キ心臟形チナシ
葉緣角ハリ或ハ淺裂
シ莖裏ハ白毛ヲ密布

款冬花 (本經中品)

和名 くわんとう、ふきたんばら(新稱)
學名 *Fusillago Parfura*, Tr.
科名 きく科(菊科)

釋名

款凍(郭璞) 顆凍(本經) 氏冬(別錄) 鑽凍(衍義) 莧羹(本經) 囊

吾(本經) 虎鬚(本經) 時珍曰く、按ずるに、述征記に『洛水らくすいが歲末の甚しい寒

氣で氷り詰めた時、款冬くわんとうが凍つた草原の中に生えた』とある。そこで顆冬くわんとうなる名稱

シテ居ル花ノ後ニ出
テル、花ハ花梗上ニ
一輪ヅツ咲キ頭狀花
チナシ鮮黃色ヲ呈ス
ル、歐洲、亞細亞、北
亞非利加ニ分布シ隣
國ノ支那ニハ産スレ
ドモ我日本ニハ生ジ
テ居ナイ、植物名實
圖考卷ノ十一ニアル
歟冬ノ圖ハつばふき
チ晝イタモノデ異物
デハナイ。

(二) 洛水ニニアリ。

一ハ陝西省定邊縣ノ
東南、白於山ニ源チ
發シ、南流シテ朝邑
ノ南ニテ渭水ニ合
ス。一ハ陝西省雒南
縣ノ西北、冢嶺山ニ
源チ發シ、東流シテ
河南省ニ入リ、洛口
ニ至ツテ黃河ニ入
ル。此ニイフ洛水ハ
陝西ノ洛水チイフナ
ルベシ。

(三) 常山ハ石部鹵石

は此から來たのだが、後世になつて歟冬と訛つたのだ。即ち歟凍だ。歟の意味は至であつて、冬の至れる時期に花が咲く草といふ意味である。

宗奭曰く、あらゆる草のうちで、この草だけは氷雪を顧みずして最も春に先んず



〔花 冬 歟 州 醬〕

る。故に世にこれを鑽凍さんとうといふ。たとひ氷雪の下にあつても時が來れば芽が生えるものだ。春季になると世人はこれを探つて蔬菜に代へて食ふ。藥に入れるには、微し花が現はれたばかりのものをを用ゐるがよい。已に咲き切つては全く氣力がなくなる。今は一般に、多くは箸の先ほどの

のものをを用ゐてゐるが、果してまだ花が咲かなかつたものか否かが氣遣はれる。

集 解

別錄に曰く、歟冬は常山じやうざんの山谷、及び上黨じやうたうの川の邊りに生ずる。

十二月花を採つて陰乾する。弘景曰く、第一位のものは河北に産する。その形が舊い蔓じゆんのまだ舒のびないもののやうなものが佳い。その内部には絲があるものだ。次位

類、凝水石ノ註ヲ見
ヨ。

(四) 上無ハ山草類人
參ノ註ヲ見ヨ。

(五) 高麗ハ金部金ノ
註、百濟ハ山草類人
參ノ註ヲ見ヨ。

(六) 宕昌ハ石部雄黃
ノ註ヲ見ヨ。

(七) 雍州ハ石部金牙
石ノ註、南山、即チ
終南山、山草類王孫
ノ註、華州ハ石部花
乳石ノ註ヲ見ヨ。

(八) 關中ハ山草類淫
羊糞ノ註ヲ見ヨ。

(九) 斗直トハ容量ノ
義ナリト云フ。

のものは、高麗、百濟に産する。その花は大菊花に似たものだ。それに次ぐものは蜀の北部、(一) 宕昌にも産する。いづれも冬季氷の下に在るものに如くはないので、

十二月、正月の早朝に取る。

恭曰く、今は、雍州南山の溪水、及び華州の山谷の谷間に出る。葉は葵に似て大

きく、叢生するもので、花は根の下に出る。


頤曰く、今は、關中にもある。根は

紫色、葉は葶藶に似てゐる。十二月黃

花を開き、莖は青紫色で、土から一二

寸出たばかりには菊花の莖のやうだ。

通直で肥え實する。子は無い。陶氏の



〔花 冬 嶽 州 秦〕

所謂『高麗、百濟に産する』といふものはこの類に近い。又、紅花のものもあつて、葉は荷のやうで、(二) 斗直の大なるは一升を容れ、小なるも數合を容れ得るものだ。俗に蜂斗菜、又は水斗菜と呼ぶ。蘇氏の所謂『大なるは葵のやうで叢生する』とい

ふはこの物だ。傅咸ふかんの欸冬賦の序に『予曾て禽を逐ふて北山に登る。時に仲冬の月、氷凌谷に盈ち、積雪崖を被ふ。顧見すれば欸冬燁然ひびぜんとして始めて華艶を敷く』とあるはこの物だ。

修治

敷おく、凡そこれを探取したならば、裏に向つて花葉を裏む殻、并に裏にある實の栗零殻りつれいこくのやうなもの、并に枝、葉を棄去らねばならぬ。かくて甘草水に一夜浸してから、また欸冬の葉を取つて裏み纏ひ、一夜置いて晒し乾かし、葉を去つて用ゐる。

氣味

【辛し、溫にして毒なし】別錄に曰く、甘し。好古こうこ曰く、純陽である。手の太陰の經に入る。之才し曰く、杏仁が使となる。紫苑しぜんと配合するが良し。皂莢さいさう、消石、玄參を惡み、貝母、辛夷、麻黄まわう、黄芩わうこん、連翹れんけう、青葙せいさうを畏る。

主治

【欸逆上氣で善く喘するもの、喉痺、諸驚癇、寒熱邪氣（本經）】消渴で呼吸に喘息するもの（別錄）【肺氣心促の急熱、（二）勞嗽の絶えず續けざるに出て涕唾の粘るもの、肺痿、肺癰で膿血を吐くものを療ず（甄權）】心、肺を潤ほし、五臟を益し、煩を除き、痰を消し、肝を洗ひ、目を明にする。また中風等の疾（大明）

（一〇）木村（康）曰ク、欸冬ハ葉ニ配糖體ニ・六三%花ニ二種ノフラクトステリンヲ檢出ス。
W. P. 785; B. P. C. 1128; A. J. P. 1887 (50) 340; U. S. D. 1331.
（一）大觀ニ勞上ニ兒字アリ。

(三)大觀ニ方上ニ今
字アリ。

發 明

頌曰く、本經には欬逆に主たるものとあり、古(三)方には肺を溫め嗽を治するに最要藥としてあつて、崔知梯(さいちてい)の久欬を療する熏法では『每朝雞子ほどの欬冬花を取り、少量の蜜を拌(まぜ)て花を潤し、一升入りの鐵鍋に入れ、又一箇の瓦盃に孔を一箇鑽(き)り明けて一本の小筆管を挿し、それを鍋に蓋(かぶ)せて氣の漏れぬやうに麴泥で縫ひ堅め、鍋の下へ火を入れ、少時して筒から出る烟を口に含んで吸ひ嚙む。若し胸中が少し悶(も)えるときは、頭を舉げ、筒口をば手にて押へて烟を漏(も)らさぬやうにする。煙が盡れば止める。此の如く五日間一定してこれを試み、六日目に羊肉の傅(は)飪(じ)一頓を飽食すれば永く瘥(な)える』とある。

宗奭(しやく)曰く、長い間嗽を病んだある人が、ある者から、欬冬花三兩を燃し、風の無い處で筆管でその烟を満口に吸つて嚙むがよいと教へられ、それを試みて、數日にして果して効果があつた。

附 方

新二。

『血を帶ぶる痰嗽(たんしやく)、欬冬花、百合を蒸し焙じて等分を末にし、蜜

で龍眼大の丸にし、就寢時に一丸づつを嚼(か)んで薑湯で服す。(濟生方) 『口中の瘡瘡』

欬冬花、黃連等分を細末にし、睡で調へて餅にし、先づ蛇牀子(じやうじやうし)の煎湯で口を漱いでか

ら、餅を傳けて少頃の間しかと押へ付けて置く。その瘡は立ちに消する。(楊誠經驗方)

(二) 鼠麴草 (日 華)

和名 はうぐや、はらぐや
學名 Gnaphalium multiceps, Wall.
科名 さく科(菊科)

校正

有名未用の鼠耳、及び東垣藥類法象の佛耳草を併せ入る。

(一) 牧野曰フ、鼠麴草ハ我邦春ノ七草ノ一デ此場合ニハおぎやう(こぎやうハ訛リ)ト稱スル、今一般ニハこぐさ(母子草)ト呼ベドモ本名ハほうこぐさデアル、ハハこぐさハ文德實錄ノ著者カほうこぐさニ基ツイテ作ツタ名デアツテ我邦ノ古イ和名デハナイ却テほうこぐさが古イ名デアル。

釋名

米麴(綱目)

鼠耳(別錄)

佛耳草(法象)

無心草(別錄)

香薷(拾遺)

黃蒿(會編)

萱母

時珍曰く、麴とはその花が麴の色のやうに黄なるをいひ、又、

米粉に和せて食ひ得るからの名稱だ。鼠耳とはその葉の形が鼠の耳のやうだからで、

又、白毛があつて蒙茸もうじようがこれに似てゐるところから、北方地方では茸母と呼ぶ。佛

耳といふは鼠耳の訛だ。今淮地方で毛耳まうじだ朶と呼ぶところから見ると、香茅なる茅の

字も毛と書くべきものかも知れぬ。按ずるに、段成式の雜俎に『虻蜉酒草ひふしゆさうとは鼠耳

のことで、一名無心草といふ。これは(三)虻蜉がこれを食ふからかく名けたのかも知

れぬ』とある。

(三) 虻蜉、即馬蟻、大ナル蟻ナ云フ。

集解

別錄に曰く、鼠耳、一名無心は田畑の低地に生ずるもので、葉は厚く莖は肥えてゐる。

藏器曰く、鼠麴草は平な岡の熟地に生ずる。高さは一尺餘、葉に白毛があり、花



〔鼠耳〕
佛耳草

は黄色だ。荆楚歳時記に『三月三日に鼠麴の汁を取り、蜜を和し粉にしたものを龍舌絆といふ。時氣の疾を壓すものだ』とある。絆の音は板（ハン）であつて、米餅のことだ。〔山〕山南地方では香茅と呼び、花を取つて樺の皮を雜へて褐を染めるが、破れるまで色が鮮かなものだ。江西地方では鼠耳草と呼ぶ。

汪機曰く、佛耳草は、〔山〕徽州地方では黃蒿といふ。二三月に苗が伸びて長さ一尺ばかりになる。葉は馬齒莧に似て細く、微かな白毛があり、花は黄色だ。地方民は莖、葉を採つて米粉に和し、搗いて〔山〕粍果にして食ふ。

時珍曰く、日華本草に「鼠麴、即ち別錄の鼠耳なり」とある。唐、宋の諸家はそれを知らずして、鼠耳を退けて有名未用中に編入した。李杲の藥類法象にも、佛耳草

〔山〕山南ハ海盧ノ註ヲ見ヨ。

〔山〕徽州ハ宋ニ置ク。今ノ安徽省歙縣ソノ舊治ナリ。

〔山〕粍麴ハ草餅圖子ノ類ナラン。

時珍曰く、別錄に『寒熱を治し、欬を止める』とあり、東垣は『寒嗽を治す』といふ。

これは病の標に對する觀察だ。日華は『熱嗽を治す』といふ。これは病の本に對する觀察だ。概して寒嗽なるものは、多くは火が内に鬱し、寒が外を覆ふものなのである。按ずるに、陳氏の經驗方に『三奇散は、一切の欬嗽、發病の久しきと近きとを問はず、晝夜一定時なく發るを治す。佛耳草五十文、款冬花二百文、熟地黄二兩を焙じて研り、二錢づつを爐中で燒き、その烟を筒で吸つて嚥み下し、涎のあるを吐き去る。予が家の獲が久しくこの病を患つて醫療の効果がなかつたが、たまたま、沅州にゐた時、一人の下婢からこの法を聞いて用ゐ、二服で癒えた』とある。

(二) 決 明 (本經上品)

和名 えびすぐ
學名 Cassia Tora, T.
科名 きめ科(豆科)

釋 明

時珍曰く、これは馬蹄決明のこと、目を明かにする功力を表示した名稱だ。又、草決明、石決明などいふがあつて、いづれも同功である。草決明とは青葙子せいこうしのことで、陶氏の所謂さいいりやう妻蒿はその物だ。

(一) 牧野曰フ、決明ニハ幾種カアルヤウデアアルガえびすぐサヲソレノ正品ト定メテモ、コレハ處ニヨリ六角さうト呼バレルヤザソレハ民間デ藥用トシテ明ホアレル其種子ノ形ニカラシキモノアリ、定高キ一草草子小葉ノ對

(二) 文ハ錢ノ意。

(三) 獲ハ既婚ノ婢女ト云フ。

(四) 沅州ハ唐ニ置ク今ノ湖南省芷江縣ソノ舊ナリ。

集解

別錄に曰く、決明子は龍門りゅうもんの川澤に生ずる。十月十日に採つて百日間陰乾する。弘景曰く、龍門は長安の北にある土地だ。今は處處にある。葉は芒ぼうのやう、子は形が馬蹄に似たもので、馬蹄決明と呼ぶ。搗碎いて用ゐるものだ。又、別に草決明といふがあるが、それは萋蒿せいこう草のことだ。下品の部に在る。

頤曰く、現に處處の民家で畑に蒔いて栽培してゐる。初夏に苗が生え、高さ三四尺、根は紫色を帯び、葉は苜蓿もくじやくに似て大きい。七月黃花を開いて角を結ぶ。子は青綠豆のやうで鋭い。十月採取する。按ずるに、爾雅に『解蒔は（註）決光なり』とあり、郭璞の釋に『藥草の決明のことで、葉は黃色で鋭く、花は赤く、實は山菜莢さんさいゑのやうだ』とある。或は『これは蔕りょうといふもので、關西ではこれを薺蒔さいし—音は皆蒔（カイ）コウ）である—といふともいふが、その説はこの草の種類と一向類似してゐない。又、一種の馬蹄決明といふがあつて、葉は豇豆しょうづのやう、子の形が馬蹄に似てゐる。

宗奭曰く、決明は苗の高さ四五尺のもので、春季にはこれも蔬にする。秋深く角を結び、角の中に羊腎のやうな子を生ずる。現に湖南、湖北地方の民家では栽培するものが甚だ多く、或は村落の野原などに段を作つて種ゑてある。蜀本圖經に『葉

少ナク葉頭圓ク莢ハ狭長デ數寸ノ長サガアル、今日此種子ヲ安リニ萋蒿ト呼ンデ坊間テ賣ツテ居ルガ實ハ萋蒿ハ此書ニアル如ク草決明ノ一名デ（ひゆ科（莧科）のげいとう（Celosia argentea, L.）即チ書籍ノコトデアル、又苳苳決明即チ山扁豆ハ *Cycla* 屬ノ別ノ一種デ *C. nictitans* L. ノ學名ノモノト思フ、即チ救荒本草ノ山扁豆ノ圖ガ此レト一致シテ居ル。植物名實圖考卷ノ十一ニ出テ居ル決明ノ圖ハ何カ同屬ノ別ノ種デアアル、從來右ノ山扁豆ヲ苳苳トハ別ノモノトナシかはらけつめいニ充テ居レドモ其レハ非デアツテ、かはらけつめい

ノ漢名ハ今ノ處マダ

見付カラナイガ滿洲

デハ黃瓜香ノ名ガア

ルトノ事デアル。

Cucurbita ノ一種ニハぶ

やん(C. foetida, Cive-

rum)ガアル、救荒本

草卷ノ八ノ望江南ハ

之レニ近ケレドモ此

レハほそばはぶさう

(C. Sophora, L.)デア

アル、はぶさうハ臺

灣ニテ羊角豆ト云フ

トノ事デアアル。

(一)龍門ハ土部甘土

ノ註ヲ見ヨ。

(二)此ハ金陵本ニ北

ニ作ル。今ソレニ據

ル。

(三)大觀ニ草ヲ子ニ

作ル。

(四)大觀ニ決光ヲ葵

葉ニ作ル。

(五)或種ノ二字大觀

本草ニヨル。

は苜蓿に似て濶大だ』とあるは甚だ妥當を得てゐる。

時珍曰く、決明には二種ある。一種は馬蹄決明であつて、莖の高さ三四尺、葉は

苜蓿より大きくして本が小さく末が濶く、その葉は晝開いて夜は合し、兩兩互に合

はさる。秋淡黃色で五出の花を開き、初生の細豇豆のやうな長さ五六寸の角を結び、



〔明 決 蹄 馬〕

その角の中に數十粒の子が參差として相連り、馬蹄のやうな形を成してゐる。色は青緑だ。眼目の藥に入れて最も良し。

一種は苳芒決明であつて、救荒本草の所謂山扁豆がそれだ。苗、莖は馬蹄決明に

似て、ただ葉の本が小さく末が尖り、さながら槐葉に似たものだ。夜になつても合さらない。秋深黃色で五出の花を開き、太さ小指ほど長さ二寸ばかりの角を結び、その角の中の子は數列になり、黃葵子のやうな形で扁たく、褐色のものだ。味は甘くして滑する。右の二種は、苗、葉、いづれも酒麴に作れるもので、俗に獨占缸と呼ぶ。但し苳芒は嫩苗、及び花、角子いづれも瀹て食ひ、また茶に點て食へるもの

だが、馬蹄決明の苗、角はいづれも靱く苦く、食ふわけに行かぬものだ。蘇頌は『解
蒴、卽ち決明だ』といったが、一向類似せぬものだ。恐らくは別種の一植物だらう。

子 (モ) 氣味

【鹹し、平にして毒なし】 別錄に曰く、苦く甘し、微寒なり。

之才曰く、著實(シジツ)が使となる。大麻子を惡む。

主治

【青盲、目淫、膚赤、白膜、

(セ) 木村(康)曰ク、
スギナノ種子中
エモザン及ビ葡萄糖
ヲ生ズル配糖體ヲ含
有ス。
(ハ) 精光ハ眼光ノ意。

眼赤く涙の出るもの。久しく服すれば、(ハ)精光を益し、身を軽くする(本經) 【唇口

の青きを療ずる】(別錄) 【肝氣を助け、精を益す。水で末を調へて腫毒に塗る。太陽

穴を(ハ)熨(フ)けば頭痛を治す。又(ハ)胸心に貼れば鼻洪を止め、枕に作れば頭風を治す。

目を明かにすることは黑豆よりも(ハ)甚しい(日華) 【肝熱の風眼、赤涙を治するに

は、毎朝一匙を(キ)淨く揉んで空心に吞む。百日後には夜間明かに物を見行る(甄權)

【胃を益し、蛇毒を解す】(震亨) 【葉を菜にして食へば、五臟を利し、目を明にする

發明

時珍曰く、相感志に『烟に決明を種えれば蛇が敢て入らぬ』とある。

丹溪朱氏が『決明は蛇毒を解す』といったのはこれに起因するものだ。王旻の山居
錄には『春季に決明を種えて、生えた葉を採つて食ふ。その花を陰乾にしてもやはり

(ハ) 蟾ハ迫デアル矢
キ壓スル意カ。
(ハ) 大觀ニ胸ナ腫ニ
作ル。
(ハ) 大觀ニ甚チ勝ニ
作ル。

食へる。泡茶を絶對に忌む。多く食へば必ず風を患ふものだ』とある。按ずるに、馬蹄決明は苗、角いづれも靱くして苦く、食料とはならないものだ。また假令食つたにしても、五臓を利し、目を明かにする功力のあるものが、何として風を患ふ筈があらうか。又、劉積の霏雪錄には『人家に決明を種ゑてはならない。生れる子が多く跛になるものだ』とあるが、これは迂儒誤聽の説だ。信すべきでない。

附方

舊一、新七。

【積年の失明】決明子二升を末にし、毎食後に粥飲で方寸匕

を服す。(外臺秘要)

【青盲、雀目】決明一升、地膚子五兩を末にして米飲で梧子大の

丸にし、二三十九づつを米飲で服す。(普濟方)

【補肝、明目】決明子一升、蔓菁子

二升を酒五升で煮て暴乾して末にし、一日二回、二錢づつを溫水で服す。(聖惠方)

【目赤腫痛】決明子を炒つて研り、茶で調へて兩太陽穴に傅け、乾けば取換へる。一

夜にして癒える。(醫方摘玄)

【頭風熱痛】方は上に同じ。【鼻衄の止まぬもの】方は主

治の項にある。

【癰瘡の蔓延】

決明子一兩を末にし、水銀、輕粉少量を入れて星の

見えぬまで研り、瘡を擦り破つて藥を傅ける。立ろに瘥える。東坡の家藏方だ。(奇效

真方) 【發背の初期】草決明一升を搗き、生甘草一兩と水三升で一升に煮取り、二回

に分服する。概して血が滯れば瘡が生じ、肝は血を藏する^{つみかく}ことを主^{つかさど}るものであつて、決明は肝氣を和して元氣を損せぬものだ。（許學士本事方）

附 錄

〔註〕**苳芒**（拾遺）

藏器曰く、

陶氏は『決明の葉は苳芒のやうだ』といつた

が、按ずるに、苳芒は道傍に生え、^{〔註〕}葉は決明よりも小さい。性は平にして毒なし。

〔註〕牧野曰フ、苳芒ハCelastrus 屬ノ一種デ上ニ記シテ置イダ。
〔註〕大觀ニハ葉小ニシテ決明ノ如シトアリ。



〔明 決 芒 苳〕

火で炙^やいて飲に作れば極めて香しく、痰を除き、渴を止め、睡らざらしめ、中を調へるものだ。隋の稠禪師が採つて五色飲を作り、煬帝^{やうてい}に獻じたといふはこの草だ。又、^{〔註〕}苳芒——苳の字は土に从ふ、音は吐（ト）である——一名

〔註〕牧野曰フ、苳芒ハ先葉かやつりぐさ科ノしちたうニ充テ居ルガ、果シテ穩當ナ見カ否カ今遽カニ其是非ガ判ラナイ。

江離子といふがあるが、この草は堯^{くらん}に似たもので、海邊に生じ、席に作り得るものだ。決明とは葉が類^にて居らぬ。時珍曰く、苳芒もやはり決明の一種だ。故に俗にやはり獨占缸などといふ。説明は前項の集解にある。

〔註〕牧野曰フ、合明

〔註〕**合明草**（拾遺）

藏器曰く、

味甘し、寒にして毒なし。暴熱淋で小便の赤濁^{せうしやく}する

草ハ何ント云フ草カ
不明ナル、文章ニ
據レバ水ノ引キ去ツ
タ泥地ニ生ゼシて人
ジさうノヤウニモ想
像セラレヌデモナ
イ。

(一) 牧野曰ス、往時
他國ノ種ヲ傳ヘテ今
一般ニ畑ニ作ラレ簞
ノ原料ニスル、其嫩
葉ハ食用トナル。


もの、小兒の痲病に主效があり、目を明かにし、水を下し、血痢を止める。搗いて絞つた汁を服す。下濕の地に生ずるものだ。葉は四出の花のやうで、夜になるとその葉が合はざる。

(二) 地 膚 (本經上品)

和名 ははきぎ(はうきぎ)
學名 *Koeleria scopulina*, Schum.
科名 あかざ科(藜科)

釋 名

地葵(本經) 地麥(別錄) 落帚(日華) 獨帚(圖經) 王簪(爾雅) 王帚(郭璞) 掃帚(弘景) 益明(藥性) 涎衣草(唐本) 白地草(綱目) 鴨舌草(圖經)



地 膚
落 帚

千心妓女(土宿本草) 時珍曰く、地膚、地麥はその子の形の似たるに因み、地葵はその苗の味の似たるに因み、鴨舌はその形の似たるに因み、妓女はその枝が繁つて頭

落ちてからその老莖を帚に使用ころから、帚、簍などの諸名がある。

集解

別錄に曰く、地膚子は(三)荊州けいしゅうの平澤、及び田野に生ずる。八月、十月

に實を採つて陰乾する。弘景曰く、今は田野の間にやはり多く、いづれも莖、苗を取つて帚にする。その子は微細なもので、補藥の丸、散に入れて用ゐる。仙經には甚だ用ゐない。

恭曰く、田野の農民は地麥草と呼び、北方では涎衣草ぜんいさうといふ。葉は細く、莖が赤く、熟田の中に出るもので、苗は極めて弱く、持つて舉ぐるにさへ勝たへぬものだ。

ここに『帚になる』といつてあるが、恐らくその實物を知らぬのだらう。

大明曰く、地膚、即ち落帚子である。子の色は青く、一眠を起きた(三)鱗沙りんしゃの形に

似てゐる。

頤曰く、今は蜀しよく、川せん、關中くわんちゆう、近い地方にいづれもある。生え初めは地に薄うすいた五

六寸のもので、根の形は蒿のやう、莖は赤く、葉は青く、甚だ荊芥に似たもので、三月黄白色の花を開き、青白色の子を結ぶ。八月、九月に實を採る。神仙七精散の説明に『地膚子は星の精だ』とある。或は、その苗は即ち獨どく帚しゆうで、一名鵝舌草あふぜつさうと

(三)帚、大輓ニ掃ニ
作ル。

(三)荊州ハ古ノ九州
ノ一ナリ。今ノ湖北、
湖南兩省、及ビ四川
省舊邛崃、重慶ノ二
府、貴州省舊思南、
銅仁、思州、石仵等ノ
諸府、及ビ廣西省ノ
本縣、廣東省ノ連縣
等ノ地ヲ包ス。後漢
ニハ荊州刺史ヲ置キ
漢壽、即チ今ノ湖南
省武陵縣ノ東北ノ地
ニ治ス。

(三)鱗沙ハ蠶糞。

〔五〕宋ノ密州ハ今ノ山東省諸城縣ノ地ナリ。

〔六〕字書ニ藍ハ音皆禾蘖去皮類也トアリクキナリ。

〔七〕大觀ニ蒂ヲ掃ニ作ル。

〔八〕大觀ニ合ヲ類ニ作ル。

いふ。陶弘景の所謂る『苗を箒にする』といふ説と、蘇恭の『その苗は弱いもので持つて舉げるにも勝へぬものだ』といふ説と、二説合致しないが、現に醫家は皆これを獨蒂といつてゐる。〔五〕密州から提出した圖の説明に依れば『根は叢をなして生え、每葉に二三莖あつて、莖には赤いものも青いものもある。七月黄色の花を開く。その實は地膚であつて、八月に至つて、藍幹が成つてから採るものだ』とある。これは正に獨蒂と合致する。恐らく西北地方の産は短く弱いので、それ故に蘇恭はかくいつたものであらう。

時珍曰く、地膚の嫩苗は蔬茹にして食へる。一株に數十本の枝が簇集し、團になつて直上に伸び、性の最も柔弱なものだ。故にその幹枝が老い固らんとする時に採れば、十分箒としても用ゐられる。蘇恭が、箒の用にならぬといつたのは、ただその嫩苗を指していつたのである。子が最も繁多なものだ。爾雅には『蒿は王簪なり』とあり、郭璞の注に『王簪である。蒿に似たもので、箒になる。江東では落蒂と呼ぶ』とある。この説が當を得てゐる。

子 氣味

【苦し、寒にして毒なし】時珍曰く、甘し、寒なり。

【主治】

【勝胱の熱。小便を利し、中を補し、精氣を益す。久しく服すれば、耳目を聰明にし、身體を軽くし、老衰を防ぐ】〔本經〕 【皮膚中の熱氣を去り、人體を潤澤にし、惡瘡、疔瘻を散じ、陰を強くする】〔別錄〕 【陰卵癰疾を治す。熱風を去るには、湯にして沐浴するがよし。陽起石と共に服すれば、男子の陰痿不起に主效があり、氣を補し、力を益す】〔甄權〕 【客熱丹腫を治す】〔日華〕

發明

○藏器曰く、多くの病は虚から起るものだ。虚して熱多きには地膚子、甘草を加へる。

附方

舊三、新七。

【風熱赤目】地膚子を焙じて一升を、生地黄半斤から取つた汁に和して餅にし、晒し乾して研末し、三錢づつを空心に酒で服す。〔聖惠方〕 【目

痛、眯目】凡そ目痛、及び眯目中を傷め、熱膜あるには、地膚子の白汁を取つて

頻りに目中に注ぐ。〔王隱外臺秘要〕 【雷頭風腫】人事不省なるには、落帚子、生薑を

〔九〕雷頭ハ頭部ノ瘡腫。

共に研り爛らし、熱して酒に投じて服し、汗を取れば癒える。〔聖濟總錄〕 【脊下の疼

痛】地膚子を末にして酒で方寸匕を服す。〔壽域神方〕 【疝氣の危急なるもの】地膚子、

即ち落帚子を香しく炒つて研末し、一錢づつを酒で服す。〔簡便方〕 【狐疝、陰癰】

〔二〇〕狐疝ハ鼠蹊ノ脱腸。

（二）久疹ノ疹ハ病ニ
同ジ、持病ノコト。

物を飛び越え、重い物を舉げて俄かに陰癰となつたもの、及び小兒の狐疝、傷損で癰を生じたもの、いづれも地膚子五錢、白朮二錢半、桂心五分を末にし、飲、或は酒で三錢を服す。生葱、桃、李を忌む。（必效方）【（二）久疹の腰痛】積年の宿病でたまに發作するには、六月、七月に取つた地膚子を乾して末にし、一日五六回、酒で方寸匕を服す。（肘後）【血痢の止まぬもの】地膚子五兩、地榆、黃芩各一兩を末にし、方寸匕づつを溫水で調へて服す。（聖惠方）【妊娠中の淋】熱痛酸楚し、手、足煩疼するには、地膚子十二兩、水四升を二升半に煎じて分服する。（子母秘錄）【肢體の疣目】地膚子、白礬等分を煎じた湯で頻りに洗ふ。（壽域神方）

苗葉

氣味

【苦し、寒にして毒なし】時珍曰く、甘く苦し。燒灰を煎じ

た霜は、砒石、粉霜、水銀、硫黃、雄黃、硃砂を制す。

主治

【搗汁を服すれば、

赤、白痢に主效がある。燒灰も善し。水で煎じて目を洗へば、熱暗、雀盲、瀉痛を去る】（別錄）【大腸泄瀉に主效があり、氣を和し、腸、胃を瀉し、惡瘡の毒を解す】

（蘇頌）

【水で煎じて日毎に服すれば、手足の煩疼を治し、小便諸淋を利す】（時珍）

發明

時珍曰く、按ずるに、虞搏の醫學正傳に『搏の兄が七十の年、秋季に

淋を患つて二十餘日に及び、あらゆる方も效がなかつたが、後にある方を得、地膚草を取つて搗き、その自然汁を服すると遂に通じた。至つて賤しい植物だが、此の如き回生の功がある』とある。時珍按ずるに、聖惠方に『小便不通を治するには、地麥草一大把を水で煎じて服す』とあり、古方にも常にこれを用ゐてある。それはこのものが能く陰氣を益し、小腸を通ずるものであつて、陰が無ければ陽がその働を發揮し得ぬものだから、その場合にこれを用ゐるのである。東垣が小便不通を治するに黄蘗、知母を用ゐて腎を滋くしたと同一目的だ。

附方

新二。

【傷けて晴の陥つたもの】弩肉の突出せるには、地膚を土を洗ひ去つて二兩を搗き、汁を絞つて少量づつ點ける。冬季は乾いたものを煮て膿汁を用ゐる。(聖惠方)

瞿麥

瞿の音は劬(ク)である。(本經中品)

和名 からなでし、

學名 *Dianthus chinensis*, L.
科名 なでしこ科(石竹科)

(一)牧野曰フ、我邦ノ學者ハ從來瞿麥ト石竹トヲ兩分シカハラナデシ、(Dianthus superbus, L.)ヲ瞿麥トシ、からなで

釋名

瀟麥(爾雅)

巨句麥(本經)

天菊(爾雅)

大蘭(別錄)

石竹(日華)

しこチ石竹トシテ居
レドモ其レハ非デ瞿
麥モ石竹モ同一種ノ
モノデ即チ瞿麥ノ一
名ガ石竹デアル事此
書ニ記スル通りデア
ル、かはらなでしこ
ニモ何カ漢名ガアル
ベキト思フガ私ニハ
信ズベキ其名ガ判ツ
テ居ナイ、からなで
しこハ我邦ニハ野生
ハナイカ普通ニハ觀
賞用トシテ培養セラ
レテ居リ種種ノ變種
ガアル、即ちいぜな
でしこナドモ其變種
ノ一デアル、瞿麥ガ
からなでしこデアル
事ハ此書ノ文章デモ
分ルガ尙植物名實圖
考ニハ其圖モ出テ居
ル。

(一)大觀ニ採トニ實
字アリ。

南天竺草(綱目) 弘景曰く、子が頗る麥に似たものだから瞿麥と名けたのだ。時珍

曰く、按ずるに、陸佃は韓詩外傳の解に『兩旁に生ずるを瞿といふ。この麥は穂が

旁生するから名けたのだ』とある。

爾雅には藎と書いてあるが、この字

には渠(キヨ)と衢(ク)の二音があ

る。日華本草に『一名燕麥、一名杜

姥草』といふは誤だ。燕麥、即ち雀



〔麥 瞿〕

麥であつて、雀と瞿の二字は形が近いところから、傳寫に訛を生じたのだ。

集 解

別錄に曰く、瞿麥は太山の山谷に生ずる。立秋に採つて陰乾する。

弘景曰く、今は近道に出る。一莖に細葉を生じ、花は紅、紫、赤色で風情あるもの

だ。子と葉とを合はせて刈り取る。子は頗る麥の子に似たものだ。この草には二種

あつて、一種は微し大きく、花は邊に又極がある。何れが正しいものか判然せぬが、

現に商人は皆小さいものを賣つてゐる。また一種は、葉、莖は似たものだが毛が

あり、花は晩くして甚だ赤い。按ずるに、經には『實を採る』とある。その中の子

は細いもので、燥熱すれば盡く脱け落ちる。

頤曰く、今は處處にある。苗は高さ一尺ほど、葉は尖小で色が青い。根は色が紫黒で、形は細い蔓菁まんせいのやうだ。花は紅、紫、赤色で、また映山紅にも似てゐる。二月から五月まで開いて七月實を結ぶ。實は穂になり、子は頗る麥に似たものだ。(三)

(二) 河陽、河南省孟縣ニ春秋ノ河陽ノ故城アリ。

(三) 河中府ハ石部石中黃子ノ註ヲ見ヨ。

(四) 淮甸ハ淮地方トイフガ如シ。淮河チ中心トシタル一帯ノ地域チイフ。

村落の人民はそれを取つて刷子や箒を作る。爾雅に天菊といひ、廣雅に芷葵しきといふはこの物だ。

時珍曰く、石竹は、葉が地膚葉に似て尖小だ。また初生の小竹葉に似て細く窄い。

莖は纖細で節があり、高さは一尺餘、梢の間に花を開く、田野に生えるものは花の大さが錢ほどで紅紫色だ。人家に栽培するものは花がやや小さくしてたをや、かだ。

(五) 細白、粉紅、紫、赤、まだらの數色があつて、俗に洛陽花らくやうかと呼んでゐる。結實は燕麥のやうで、中に小さい黒子がある。その嫩苗は、煮熟して水で濁れば食へる。

穗 修 治

敷曰く、凡そこれを用ゐるには、ただ蕊殼を用ゐる。莖、葉を用ゐてはならぬ。若しそれ等を同時に用ゐれば、空心に氣噎きえつし、小便にし、まりが無くな

(六) 金陵本亦細ニ作ル、然レドモ細白ハ紅白ノ誤ナルコト必セリ。

(七) 大觀ニ辛トアリ。

る。用ゐる時には、箆竹瀝きんぐれきに一伏時浸して漉し晒して用ゐる。

【氣味】

【苦し、寒にして毒なし】別錄に曰く、苦し。權曰く、甘し。之才曰く、蘘草、牡丹が使となる。蝟蝟へうせうを惡み、丹砂を伏す。

【主治】

【關格、諸癰結しよゆうけつ、小便不通。刺を出し、癰腫を決し、目を明かにし、翳を去り、胎を破り、子を落し、閉血を下す】(本經)【腎氣を養ひ、膀胱の邪逆を逐ひ、霍亂を止め、毛髮を長くする】(別錄)【五淋、月經不通に主效があり、血塊を破り、膿を排す】(大明)

葉 主 治

【痔瘻、竝に瀉血には、湯粥にして食ふ。又、小兒の蛔蟲くわいちゅう、及び丹石藥の發動、并に眼目の腫痛、及び腫毒を治す。搗いて傳ければ、浸淫瘡、并に婦人の陰瘡を治す】(大明)

【發明】

呆曰く、瞿麥は小便を利するに君主の用を爲すものだ。

頌曰く、古今の方に、心の經を通じ、小腸を利する最要のものとなつてゐる。

宗奭曰く、八(八)正散に瞿麥を用ゐてあつて、既に一般に至要の藥となつてゐるが、若し心の經けいに熱が有るにしても、小腸の虛するものがこれを服すれば、心熱がまた

(八) 大觀ニ正チ政ニ作ル。

（た）大觀ニ腸下ニ藥ノ字アリ。

退かぬうちに小腸に別の病が起るものだ。蓋し小腸と心とは傳送を爲すものだから、これを用ゐれば小腸に入るのである。本草には、いづれも心熱を治すとはない。若し心に大熱がなければその心を治するに止むべきものであつて、或は制し盡くさぬやうの場合には、その屬を求めてそれでこれを衰へしむればよいのである。

時珍曰く、近古の方家には、産難を治する藥に石竹花湯があり、九孔出血を治する藥に南天竺飲がある。いづれもこの草の、血を破り、竅を利する點を應用したものだ。

附方

舊六 新五。

【小便石淋】血を破るがよいのである。瞿麥子を搗いて末にし、一日三回、酒で方寸匕を服す。三日で石が下るものだ。（外臺祕要）【小便不利】

水氣あるには、栝樓瞿麥丸を主とする。瞿麥二錢半、栝樓根二兩、大雞子一箇、

茯苓、山芋各三兩を末にし、蜜で和して梧子大の丸にし、一日三回、三九つづを服す。なほ反應なきときは七八丸まで増加する。小便が利し、腹中が温まれば反應が

（一〇）大觀ニ二錢半チ一分ニ作り、金匱ニハ一兩ニ作ル。
（二〇）大觀ニ雞子附ニ作り、金匱ニ箇チ枚ニ作ル。

現れたのだ。（張仲景金匱方）【下焦結熱】小便が淋瀝して、或は出血があり、或は大、小便に出血するには、瞿麥穗一兩、甘草を炙いて七錢五分、山梔子仁を炒つて半兩を

便に出血するには、瞿麥穗一兩、甘草を炙いて七錢五分、山梔子仁を炒つて半兩を

末にし、七錢づつを、鬚付きの葱頭七箇、燈心五十莖、生薑五片、水二盃を七分に煎じた湯で時時に溫服する。これを立效散と名ける。(千金方) 【胎兒死亡】或は臨產

數日を経て分娩せぬには、瞿麥を煮た濃汁を服す。(千金方) 【九竅の出血】服藥して

も止まぬには、南天竺草、即ち瞿麥の拇指大の一把、山梔子仁三十箇、生薑一塊、

甘草を炙いて半兩、燈心草一小把、大棗五箇を水で煎じて服す。(聖濟總錄) 【目赤腫

痛】浸淫する等の瘡には、瞿麥を黃に炒つて末にし、鷺涎で調へて背頭に塗れば直ちに開く。或は搗汁を塗る。(普濟方) 【眵目で生じた翳】その物の出でざるもの、膚翳

を生ずるものには、瞿麥、乾薑を炮いて末にし、一日二回、井華水で二錢を調へて服す。(聖惠方) 【魚臍疔瘡】瞿麥を灰に燒き、油で和して傅けるが甚だ佳し。(崔氏

方) 【咽喉骨哽】瞿麥を末にし、一日二回、水で一吋を服す。(外臺祕要) 【竹木の

肉に入りたる時】瞿麥を末にして水で方寸匕を服す。或は一日三回、煮汁を飲む。

(梅師方) 【箭、刀の肉に在るもの】及び咽喉、胸膈、その他隱處にあつて出ぬもの

には、瞿麥末方寸匕を一日三回酒で服す。(千金方)

(二) 魚臍疔ハ瘡頭黑
キコト深ク形魚臍ノ
如シ、之ヲ破レバ黃
水出テ四畔浮藥スル
モノ。

(二)牧野曰フ、從來ノ學者此王不留行ヲ歐洲原産ノ *Yucca vulgaris*, Host. 即チ和名だうくわん^{オウ}ニ充ツレドモ之レハ圖ヨリ誤リデアル、王不留行ハ我ガふしぐろニ似タ草デソレヨリ特小ナ形ヲ具ヘタモノデアツテ我ガ日本ニハ野生ハナイ。又、王不留行チせんなり^ハはづき (*Physalis angulata*, L.) トスル場合モアルコト植物名實圖考卷ノ十一所載ノ圖ヲ見デ知ラルル。自井曰ク、醫學彙函ニ命名ニ關スル一説アリ、此花本名翦金花劉玉素好此花後因降宋遺汴人言此花王不留行。本草彙言又一説アリ、虛不遠先生曰命名之義亦奇昔

(一)王不留行 (別錄上品)

和名 こふしぐろ (新稱)
學名 *Melandrym apium*, Rabh.
(= *Silene aprica* Turcz.)
科名 なべし、科 (石竹科)

釋名

禁宮花 (日華) 剪金花 (日華) 金蓋銀臺

時珍曰く、この物は性が走

つて住まらぬもので、たとひ王の命でもそれが留まらぬといふところから名けたものだ。吳普本草に、一名不流行としたのは蓋し誤である。

集解

別錄に曰く、王不留行は太山の山谷に生ずる。二月、八月に採取する。

弘景曰く、今は處處にある。葉は酸漿に似て、子は菰子に似たものだ。世間で、これは蓼の子だといふが、さうではない。多く癰、瘻の方に入れて用ゐる。

保昇曰く、所在にある。葉は菰、藍に似て、花は紅白色だ。子の殻は酸漿に似て、中の實は圓く黒く、菰子に似て大さ黍、粟ほどのものだ。三月苗を採り、五月子を採る。根、苗、花、子、いづれも通じて用ゐる。

頤曰く、今は江浙、及び河の近き處にいづれもある。苗、莖共に青く、高さは七八寸、根は黄色で薺根のやう。葉は尖つて小さい匙の頭のやうだ。また槐葉に似たもの

身有王所以主苦身之氣血及主氣血之流行者氣血之留王不留則留者行矣氣血之行王不行則行者留矣願血出不止與神產無乳者固可用此其義自見。

(一)江浙トハ江蘇、浙江。河トハ黃河ヲ指スナルベシ。

(二)大觀ニ葉チ色ニ作ル。

(三)大觀ニ濕チ混ニ作ル。

もあつて、四月黃、紫色の花を開く。(一)葉は莖に隨つて生え、菰子のやうな形狀だ。又、猪藍花ちうらんけにも似てゐる。五月に苗、莖を採つて晒し乾して用ゐる。俗にこれを剪金草といふ。河北に生ずるものは、葉が圓く、花は紅色で、この物と少し異ふ。



〔行 留 不 王〕

で、苗は高さ一二尺、三四月に鐸鈴たぐれいのやうな形の紅白色の小花を開く。結實は燈籠草のやうで、子殻に五稜があり、殻の中に豆ほどの大きさの一箇の實を包つむ。實の中の細子は菰子ほどの大きさで、生は白く熟すれば黒く、細珠のやうに正圓で愛すべきものだ。陶氏は『葉が酸漿に似てゐる』といひ、蘇氏は『花が菰子の形に似たものだ』といふが、いづれも詳審を缺いたもので、子を以て花、葉の形狀に擬なしてゐる。燈籠草は即ち酸漿だ。この草は苗、子皆藥に入れる。

苗 子 修 治

數曰く、凡そ採收したならば、拌まぜ合濕してから、午前十時

（金）大觀ニ苦字下ニ
甘字アリ。

（金）血經ハ月經ヲ指
ス。

から午後二時までの間蒸し、漿水に一夜浸して焙じ乾して用ゐる。

氣 味

【苦し、平にして毒なし】 普曰く、神農は苦し、平なりといひ、岐

伯、雷公は甘しといふ。元素曰く、甘く苦し、平なり。陽中の陰である。

主 治

【金瘡に血を止め、痛を逐ふ。刺を出す。風痺、内塞を除き、心煩、鼻衄を止める。

癰疽、惡瘡、癰乳、婦人の難産。久しく服すれば、身體を輕くし、老衰を防ぎ、壽

命を増す】（別錄）【風毒を治し、血脈を通ずる】（甄權）【遊風、風癰、婦人の血經不

均、發背】（日華）【乳汁を下す】（元素）【小便を利し、竹木の刺を出す】（時珍）

發 明

元素曰く、王不留行を乳を下し導く爲めに用ゐるは、このものの血脈
を利する功力を利用するのだ。

時珍曰く、王不留行は能く血分に走るもので、陽明、衝任の藥である。俗に『穿

山甲、王不留が有れば、婦人が服んで乳が長へに流れる』といふ言葉にも見える通

り、その性行つて住まらないものだ。按ずるに、王執中の資生經に『ある婦人が

淋を患つて久しく病臥し、諸藥も效がなかつたので、ある夜その夫が予にその事を

訴へた。予は既效方を調べて見ると「諸淋を治するには、剪金花十餘葉の煎湯を用

ゐる」とあつたので、遂にそれを服させると、翌早朝また來て、病の八分を減じたと報告した。病は再服で癒えたのである。剪金花とは、一名禁宮花、一名金盞銀臺、一名王不留行といふものだ」とある。

頤曰く、張仲景の金瘡を治する藥に王不留行散があり、貞元廣利方に諸風痞を治する藥に王不留行湯がある。いづれも最も有效なものだ。

附方

舊一、新八。

【鼻衄の止まぬもの】剪金花を莖と葉の付いたまま陰乾し、濃く煎じた汁を溫服する。立ろに效がある。(指南方) 【大便後の下血】王不留行末一

錢を水で服す。(聖濟總錄)

【金瘡亡血】王不留行散——

兇器で傷を受けて亡血したも

のを治す。王不留行十分(八月八日に採る) 蒲蓄ききてうの細葉十分(七月七日に採る) 桑

の東南の根の白皮十分(八月三日に採る) 川椒三分、甘草十分、黃芩、乾薑、芍藥、

厚朴各二分を用ゐ、前の三味を燒いて性を存し、後の六味を散にして合はせ、大瘡

には方寸匕を飲で服し、小瘡にはただまぶす。産後にも服するがよし。(張仲景金匱要

略) 【婦人の乳少きもの】氣鬱に囚するものだ。涌泉散——王不留行、穿山甲やを炮

き、龍骨、瞿麥穗、麥門冬等分を末にし、一錢づつを熱酒で調へて服し、後に豬蹄ちんてい

羹^{かう}を食ひ、一日三回、木梳^{ぼくりう}で乳を梳る。(衛生寶鑑方) 【頭風白屑】王不留行、香白芷

等分を末にし、乾して摻り、一夜にして篋^はぎ去る。(聖惠) 【癰疽諸瘡】王不留行湯

——癰疽、妬乳^{さちう}、月蝕^{げつしやく}白禿^く、及び顔面の久瘡^{くさう}を治し、蟲を去り、痛を止める。王不

留行、東南の桃枝、東に伸びた茱萸根皮各五兩、蛇牀子、牡荊子、苦竹葉、蒺藜子^{じりし}

各三升、大麻子一升、水二斗半を一斗に煮取つて頻りに洗ふ。(千金方) 【誤つて鐵石

を呑んだとき】骨に刺入つて下らず、危急なるには、王不留行、黃蘗^{わうはく}等分を末にし、

湯に浸した蒸餅で彈子大の丸にし、青黛^{せいさい}を衣にかけ、絲で穿つて風の吹く處へ掛け

て置き、一丸づつを冷水に溶かして瀉ぐ。(百一還方) 【竹、木、鍼で刺したとき】肉

中に在つて出でず、疼痛するには、王不留行を末にし、熱水で方寸匕を調へ、根を

以て傅ければ直ちに出る。(梅師方) 【疔腫の初期】王不留行子を末にして蟾酥^{せんそ}で黍米^{しよべい}

大の丸にし、一丸づつを酒で服す。汗が出て癒える。(集簡方)

(一) 牧野曰フ、剪春羅ハがんびデ夏丹赤色ノ花ヲ開クモノデア
アル、往往庭圃ニ栽
エ花ヲ賞スル。元ト
支那カラ渡シタモノ

剪春羅 (綱目)

和名 がんび
學名 *Lycnis coronata*, Thunb.
科名 なでしこ科(石竹科)

釋名

剪紅羅

集解

時珍曰、剪紅羅は二月苗が生え、高さは一尺餘、柔莖、綠葉で、葉



〔羅 春 剪〕

は莖を抱いて對生し、夏に入つて深紅色の花を開く。その花は大さ錢ほどの、すべて周圍を剪つたやうな六出で、愛すべきものだ。結實は豆ほどの大さで中に細子がある。人家で多くこれを種ゑて賞玩する。



〔紗 紅 剪〕

又、剪紅紗花といふがある。莖の高さ三尺、葉は（）旋覆し、夏、秋に花を開く。花の形は石竹花のやうで稍大きく、四圍は剪つたやうで鮮紅色の愛すべきものだ。その結ぶ穂も石竹の穂のやうで中に細子がある。方書に使用されたのを見ないが、その功力を推測するに、これも小便を利し、癰腫に主效があるものであらうと思はれる。

テ我が日本ニハ野生ハナイ、邦産ノふしぐろせんの一名おほさかさうハ稍本種ニ似テ居レドモ全ク別種デアル、集解ノ文中ニアル剪紅紗花ハまづ（L. Hinn-foaria, Lam.)ヲ指シタルモノカゼんのう(L. Fomno, Sieb. et Zucc.)ヲ指シタモノカ能ク判然セヌガ、莖ノ高サノ點カラ見レバ前者ノヤウダシ花鬚ノ剪レ具合カラ見レバ後者ノヤウデモアル、或ハ又何カ別ノ品カ其過今遽カニ明ラメ難イ。

(一) 今枝榮齋ノ說ニ此ニ旋覆トアルハ葉狀ヲ卷圓スルヲ形容セルモノニテ、石竹中ニ阿蘭陀石竹ト云フ者アリ是ヲ指シタルナラントアリ。

火毒瘡ハ帶狀皰疹、
行疹、和名ツツラコ。

氣味 【甘し、寒にして毒なし】 主治 【火帶瘡の腰を遮るものには、生の花を採り、或は葉を搗き爛らして蜜で調へて塗る。末にするもよし】（時珍） 證治要訣に記載がある。

(二) 金盞草 (救荒)

和名 きんせんくわ
學名 *Calceutha arvensis*, L.
科名 きく科(菊科)

校
正

宋圖經の杏葉草を併せ入る。

釋名

杏葉草(圖經) 長春草
時珍曰く、金盞きんせんとはその花の形容だ。長春と

は久しきに耐^たへるの意味を寓したものだ。

集解

集解 頤曰く、杏葉草、一名金盞草は常州じやうしやうに生ずる。籬邊に蔓生するもので、葉と葉と相對し、秋後に雞頭の實のやうな子があつて、その中が變じて一小蟲となり、脱出して能く歩行するものだ。中夏に花を採る。

周憲王曰く、金盞兒花は、苗は高さ四五寸、葉は初生の萵苣葉くわこえふに似て厚く狭く、莖を抱いて生える。莖は柔かで脆く、莖の端に花を開く。その花は大き指頭ほど、

effimatus, 1. 學名
チ有スルモノデアル
是レ亦歐洲ノ原産デ
アル。
自井曰ク、大觀本草
有名無用ノ部ニ香葉
草ノ圖アリ、莢草ニ
シテ救荒本草ノ金盞
草ト全ク別種ノモノ
ナリ、時珍之チ一物

トスルハ妥當チ缺ケリ。

(二) 常州ハ今ノ江蘇省武進縣ノ地ナリ。

(三) 木村(康)曰ク、たうさんせんハ全草中サリチル酸チ含ム

(一) 近ノ新鮮ナル植物ヨリ〇・四三延チ得) 根ニハイスリンチ葉及ビ花ニハカレンテユリン林檎酸、苦味質ゴム質揮發油チ含ム。

W. P. 785; U. S. D. 1300; B. P. C. 251; N. S. D. 1820.

(一) 牧野曰フ、我邦ノ學者ハ從來ニ蘇ヲ「クニナ」ナ (Draha nemorosa, var. hibernica, Ledeb.) ヲシテ居ツタガ、今、植



〔草 蓋 金〕

金黃色で蓋子のやうな形をなし、四季共に絶えぬ。その葉は味が酸い。

煮熟して水に浸し、油鹽を拌せて食ふ。

時珍曰ク、夏季に葶の内部へ實を

結ぶ。それがさながら數箇の尺蠖蟲はんくつが蟠屈してゐるやうな形に見えるの

で、蘇氏は「蟲に變化する」といつたのだが、實は蟲ではない。

氣味 【酸し、寒にして毒なし】 主治 【腸痔下血の久しく止まぬも

の】(蘇頌)

葶 藶 (本經下品)

和名 いねがらし
學名 *Neslerium indicum*, DC.
科名 十字科 十字科)

釋名 丁歷(別錄) 葶蒿 葶の音は典(テン)である。大室(本經) 大適(本

經）狗薺 別錄）時珍曰く、名稱の意義は強ひて解すべくもない。

集解

別錄に曰く、葶藶は（三）藁城の平澤、及び田野に生ずる。立夏の後に實

を採つて陰乾する。弘景曰く、（三）彭城に産するものが最も勝れてゐる。今は近道にもある。その母は公薺である。子は細かい黄色のもので、至つて苦い。用ゐるには熬るべきものだ。

頌曰く、今は汴東、陝西、河北の州郡に皆あるが、（四）曹州のものが就中佳い。初

春に苗、葉が生え、高さ六七寸、薺に似て根が白く、枝、莖共に青い。三月微黄色

の花を開いて角を結ぶ。子は扁たく小さく、黍粒のやうで微し長く、色は黄だ。月

令に『孟夏の月、靡草死す』とあり、許慎、鄭玄の注は、いづれも『靡草とは薺、

葶藶のたぐひのことだ』といつてある。一説に、葶藶は單莖で上に向ひ、（五）葉の端

に粗く且つ短い角が出るものだといふ。又、（六）狗芥草なる一種があつて、葉が根下

に近く奇數に生え、角は細く長い。葶藶を採收するには、必ずこの二種の區別に注

意せねばならぬ。

○數曰く、凡そこれを用ゐるに、赤鬚子を用ゐてはならぬ。眞によく似たものだが、

物名實圖考卷ノ十一
所載ノ圖ニ基イテい
わがらしナ其品ト定
メタ、然シ同シヤウ
ナ種子チ生ズルモノ
ハ他ノ近縁ノ草チモ
時ニ葶藶ト稱シタコ
トガアリハシナイカ
ト思フ、種子ニ甜イ
モノト苦イモノトガ
アルカラ其母植物ハ
必ズシモ一ツデハナ
イト謂ヘル。
木村（康）曰ク、朝鮮
ニ於テハたれずげば
ナノ種子チ葶藶トシ
テ用ヰルガ如シ。
石戸谷勲——朝藥・
大・一四、（三）一四七。
（一）藁城ハ漢ノ眞定
國中ノ一縣、今ノ直
隸省正定府ノ南ニ在
リ。
（二）彭城ハ石部石膏
ノ註チ見ヨ。
（三）曹州ハ滎慮ノ註
チ見ヨ。

〔五〕大觀亦葉端出角
トアレドモ葉ハ莖ノ
誤ナルユト必セリ。
〔六〕狗、大觀ニ苟ニ
作ル。



〔藤 葶〕

ただこの草は味が微し甘く苦いものだ。
葶藤子の苦は頂に入る。

時珍曰く、按ずるに、爾雅に『葶たんは葶

藤なり』とあり、郭璞の注に『實、葉はいづれも芥に似たもので、一名狗薺といふ』とある。然らば狗芥、即ち葶藤とな

るわけだが、蓋し葶藤には甜てんと苦の二種あるので、狗芥は味が微し甘い、即ち甜葶藤だ。或は甜葶藤とは荊葵子しやくみやうしのことだといふものもあるが、その功用から推して見るに、やはりさうではないやうだ。

子

修治

敷曰く、凡そ葶藤を用ゐるには、糯米と合はせて竈の上に置いて微し焙じ、米の熟するを待つて米を去り、搗いて用ゐる。

氣味

〔辛し、寒にして毒なし〕別錄に曰く、苦し、大寒なり。酒と配合す

るが良し。權曰く、酸し、小毒あり。藥には炒つて用ゐる。杲曰く、沈であつて陰中の陽である。張仲景曰く、葶藤を頭瘡に傅ければ、藥氣が腦に入つて死亡する。之

才○曰く、榆皮ゆひが使となる。酒と配合するが良し。白殭蠶はくきやうさん、石龍芮せきりゆうぜいを惡む。○時珍曰く、大棗だいさうと適合する。

主治 【瘕瘕ちやうが、積聚、結氣、飲食寒熱。堅を破り、邪を逐ひ、水道を通利す】

(本經) 【膀胱の水、伏留熱氣、皮間の邪水が上り、顔面に出でて浮腫するもの、身體にほが暴かに風熱に中つたために痺癢ふやうするものを下し、小腹を利す。久しく服すれば人をして虚せしめる】(別錄) 【肺壅、上氣欬嗽を療じ、喘促ぜんそくを止め、胸中の痰飲を除く】(七)(甄權) 【月經を通ず】(時珍)

(七) 甄權、當ニ弘景ニ作ルベシ。

發明 杲曰く、葶藶は大いに氣を降す、辛味、酸味と共に用ゐれば腫氣を導

くものだ。本草の十劑の章に『洩えいは閉を去るもので、葶藶、大黃のたぐひだ』とあり、この二味は皆大いに苦、寒であつて、一は血閉を洩し、一は氣閉を洩すものだ。蓋し葶藶の苦、寒の氣、味は俱ともに大黃に劣らない。又、性が諸藥よりも過激なもので、陽分、肺中の閉を洩し、また能く大便を洩す。その體たるや輕にして陽に象かたるものだからだ。

宗奭曰く、葶藶に甜てん、苦くの二種あるが、その形は同一だ。本經に既に『味辛く苦し』

とあるのだから、甜あまいものはやはり薬に入れないのだ。概して治功は皆水を行ひ、泄を走らす點を應用するのだから『久しく服すれば人をして虚せしめる』といったのだ。蓋し苦は泄するの意味に據つたのである。薬性論に『味酸し』とあるは當らない。

震亨〇曰く、葶藶は火に屬し、性が急激にして善く水を逐ふ。故に患者の虚する傾向のものには遠けるがよい。ともすれば人を殺すこと甚だ捷すみやかなものである。必ずしも久しく服して後に虚するといふやうなものではない。

好古〇曰く、苦、甜の二味は主たる治療の對症が同一でない。仲景の瀉肺湯しやばいとうには苦きものを用ゐてあるが、他の方には或は甜きものを用ゐるとあるもあり、或は甜、苦いづれをも指定してないものもある。しかし、概して苦は下泄し、甜は少し緩かなものなのだから、患者の虚、實を量はかつて用ゐべきであつて、大いに慎重を要することだ。たとひ本草に治功を同一といつてあるにしても、味に甜と苦との別ある以上、異りなしといかで言ひ得やうか。

時珍〇曰く、甘、苦の二種は、あだかも牽牛けんぎうに黒、白の二色あるやうなもので、急、

緩の不同がある。又、葫蘆に甘、苦の二味あるやうなもので、良、毒にも異りがある。概して甜は下泄の性が緩であつて、肺をば泄しても胃をば傷めない。苦は下泄の性が急激であつて、肺を泄するは勿論、更に胃をも傷め易いものである。故に大棗を以てこれを輔けるのだ。けれども、肺中の水氣臍滿（みぞみみ）の急なるものは、この薬以外では除き得ないのだ。ただ水が去れば服薬を止める、劑を過ごさぬといふことに深く注意する外はないのである。久しく服しさせねば、必ずしも人を殺すまでに至るわけではない。淮南子に『大戟は水を去り、葶藶は脹を癒すものだが、使用上に節度を守らねば反つて病となる』とある。やはり使用上の節度が肝要なのだ。

附方

舊十四、新六。

【陽水暴腫】

顔面赤く、煩渴し、喘急し、小便の澀るも

（八）大觀ニ一兩半ヲ
三兩ニ作ル。又二兩
ヲ四兩ニ作ル。

（九）大觀ニ經驗方ト
アリ。

のに神の如き效がある。葶藶（ひ）一兩半を炒つて研末し、漢防己末二兩、綠頭鴨（りよくづあひ）の血、及び頭と合はせ、一萬杵搗いて梧子大の丸にし、病甚しきには空腹に十丸を白湯で服す。輕きには五丸を服す。一日三四服、五日で止る。小便の利するが反應の現はれだ。ある方では猪苓末二兩を加へる。（九）（外臺秘要）【全身腫滿】苦葶藶を炒つて四兩を末にし、棗肉で和して梧子大の丸にし、一日三回、十五丸づつを桑白皮湯で

(二)大觀ニ三ナニ
作ル。

(二)治ノ字大觀ニヨ
リテ添加ス。

服す。この方は世間では甚だ信ぜぬが、實驗上有效が證されてある。【水腫で尿の
澀るもの】梅師方では、甜葶藶^{てんでいれき}二兩を炒つて末にし、大棗二十箇、水一大升を一升
に煎じて棗を去り、その末を入れて丸にし得る程度に煎じ、梧子大の丸にして飲で
六十丸づつを服し、漸次に増加して微し利するを度とする。○崔氏方では、葶藶^{ていれき}三兩を絹に包^つんで飯の上で蒸熟し、一萬杵搗き熟して梧子大の丸にする。蜜を和する
必要はない。それを毎服五丸から漸次に七丸まで増加する。微し利する程度で佳し。
患者の體力が堪へぬものだから多く服してはならぬ。若し氣發するときはこれを服
し、利して氣が下れば止める。水氣を^(二)治するに無比の藥であつて、蕭駙馬^{さうま}もこの
藥を服して水腫が瘥えた。○外科精義では、男、女、大人、小兒の頭部、面部、手、
足の腫を治す。苦葶藶を炒つて研り、棗肉で和して小豆大の丸にし、十丸づつを麻
子の煎湯で服す。一日三回、五七日繼續して小便が多くなれば腫れが引く。鹹味、
酸味、生物、冷物を忌む。【大腹水腫】肘後方では、苦葶藶二升を炒つて末にし、
雌、雄雞を割いた血、及び頭と合はせ、搗いて梧子大の丸にし、一日三回、十丸づ
つを小豆湯で服す。○又ある方では、葶藶二升を春酒五升到一夜漬け、少しづつ一

合を服す。小便が利する。○又ある方では、葶藶一兩、杏仁二十箇をいづれも黄色に熬つて搗き、十回に分服する。小便を排出して瘥えるものだ。【腹脹積聚】葶藶子

一升を熬り、酒五升到七日間浸して一日三合づつ服す。(千金方) 【肺濕痰喘】甜葶藶

を炒つて末にし、棗肉さうじくで丸にして服す。(摘玄方) 【痰飲欬嗽】含奇丸——曹州の葶藶

子一兩を紙の上で炒つて黒くし、知母一兩、貝母一兩と末にし、棗肉半兩、沙糖一

兩半と和して彈子大の丸にし、一丸づつを新しい綿に裹み、含んで津を嚥む。甚し

きものも三丸を過すことはない。(饌中方) 【欬嗽上氣】横臥し得ず、全身氣腫し、單

に顔面が腫鼓し、足が腫れる等にいづれも主效がある。葶藶子三升を微火で熬つて

研り、絹袋に盛つて清酒五升の中に浸し、冬は七日、夏は三日置き、初服には桃ほ

どの量を晝三回夜一回服す。冬季は晝二回夜二回服し、その氣力を量つて用ゐ、微

し利を取る。利するを度とする。若し危急の患者には、一定の日に滿つるを待つま

でもなく絞つて服するもよし。(崔知悌方) 【肺壅喘急】横臥し得ぬには、葶藶大棗瀉

肺湯が主效がある。(二)葶藶を黄に炒つて末に搗き、蜜で彈子大の丸にし、大棗(三)

二十箇、水三升を二升到煎じてその葶藶丸一丸を入れ、更に一升到煎じて頓服する。

(二)大觀葶藶下三兩
ノ二字アリ。
(三)大觀ニナ三ニ
作ル。

〔二四〕大觀ニ梅師方ニ作ル。

〔二五〕本草錢揮ニ汁ヲ汗ニ作ル。

〔二六〕大觀ニ千金翼ニ作ル。

また支飲^{しいん}で呼吸し得ぬものにも主效がある。〔二四〕(仲景金匱玉函方)「月經不通」葶藶一升を末にして蜜で彈子大の丸にし、綿で裹んで臍内^{ちつない}二寸深さに入れ、一夜で易へる。

〔二五〕汁が出れば止める。(千金方)

【突發した顛狂】葶藶一升を三千杵搗き、白犬の血

で和して麻子大の丸にし、酒で一丸を服す。三服で瘥える。(肘後)【頭風疼痛】葶藶

子を末にして湯で淋汁を取り、頭を三四回沐すれば瘥える。(六)(肘後方)【疳蟲の蝕

齒】葶藶、雄黃^{うわう}等分を末にして臘月の豬脂に和し、槐枝の端を綿で裹んでその藥を

蘸^つけて點ける。(金匱要略)【白禿頭瘡】葶藶末を塗る。(聖惠方)【已に潰^{つぶ}れたる瘰癧】

葶藶二合、豉一升を搗いて大さ錢ほど厚さ二分の餅にし、それを瘡孔の上に置き、

その上へ艾を炷けて灸して溫熱ならしめる。肉を破つてはならぬ。數々易へて灸す

る。但し、初起の瘡に灸してはならぬ。恐らく葶藶の氣が腦に入つて人命を傷^{きず}ふも

のだ。(永類方)【馬汗の毒氣】腹に入りたるには、葶藶子一兩を炒つて研り、水一升

に浸してその湯を服す。惡血を取り下す。(續十全方)

車 前 (本經上品)

和名 おはばい
學名 *Plantago major*, L. var. *asiatica*, Decne.
科名 おはばい科(車前科)

釋 名

當道(本經)

茅苳

音ほ浮以(フイ)である。馬𩚑

𩚑の音は昔(セキ)

である。牛遺(いづれも別錄)

牛舌(詩疏)

車輪菜(救荒)

地衣(綱目)

𩚑臺衣

(別錄)

時珍曰く、按ずるに、爾雅に『茅苳は馬𩚑、牛遺、車前なり』とあり、陸

機の詩疏には『この草はよく道邊、及び牛、馬の足跡中に生えるところから、車前、

當道、馬𩚑、牛遺などの名稱がある。𩚑は履き物だ。幽州地方ではこれを牛舌

といふ。𩚑臺がよくこの草の下に隠れてゐるところから、江東では𩚑臺衣と呼んで

ゐる』とある。また韓詩外傳には『直きを車前といひ、𩚑を茅苳といふ』とあ

るが、恐らくこれは牽強の説だ。𩚑とは兩旁に生えるものをいふ。

集 解

別錄に曰く、車前は、眞定の平澤、丘陵、阪道中に生ずる。五月五日

に採つて陰乾する。弘景曰く、人家、及び路邊に甚だ多い。韓詩に『茅苳とは李に

似た木のことで、その實を食へば子孫繁榮のためになる』といつてあるが、それは

(一)牧野曰フ、野外并ニ人家ノ近傍ナドニ生ズル普通ノ宿根草ヲ往々其嫩葉ヲ食用トスル、國ニヨリゲ一ろつばト稱スル𩚑(か)(る)葉ノ意デアアル、土地ノ子供等𩚑ヲ此葉ヲ伏セ苦メ置イテ其蘇ヘルヲ見テ興ズル、海ニ近キ處ニ生ズルモノヲたうおはばい、ト云ヒト、*Jap. nica*, *Er. cit Sw.* ノ學名ヲ有スル。

(二)牛遺、爾雅ニハ馮𩚑トアリ。

(三)幽州ハ山草類入參ノ註ヲ見ヨ。

(四)直キトハ直線ニ並列シテ生ズルヲ云フ、如此生青ノ有様ニ因リ名ヲ異ニスルハ非ナリトイフ意ナラン。

(五)眞定ハ紫苑ノ註

ナ見ヨ。

(六)開州ハ唐ニ置ケ、

今ノ四川省夔州府開

縣ソノ舊治ナリ。

(七)江湖ハ江西、湖

南兩者。

(八)淮甸ハ羅麥ノ註

ナ見ヨ。

(九)近汴ハ汴京ノ附

近、芳草類香薷ノ汴

洛ノ註參照。

ひうせつ
謬説だ。

恭曰く、今は(六)開州に出るものが勝れてゐる。

頌曰く、今は(七)江湖、(八)淮甸、(九)近汴、北地の處處にある。春初に苗が生え、葉

は匙のやうな形で地に布き、幾年かの宿い

ものは長さ一尺餘にもなり、中央から數本

の莖が抽き出て鼠尾のやうな長い穂にな

る。花は甚だ細密で青色に微赤を帶び、實

は葶藶のやうで赤黒い。今は一般に五月苗

を採り、七月、八月實を採る。人家の庭や

畑に或は種ゑるもあつて、蜀地方では尤も珍重してゐる。北方では根を採つて日光

で乾し、紫菀として賣つてゐるが、甚だ誤つた用ゐ方だ。陸機は『嫩苗を茹へば大

いに滑かなものだ』といつたが、今では一向に食ふものはない。

時珍曰く、王旻の山居錄に、車前を種ゑ、その苗を摘み取つて食ふ方法が書いて

あるほどで、昔は蔬にして常食としたものだ。今でも邊鄙の地の者はやはり採つて



〔前 車〕

食ふ。

子 修治

時珍曰く、凡そこれを用ゐるには、水で淘り洗ひ、泥沙を去つて晒し乾す。湯液に入れるには炒つて用ゐる、丸散に入れるには酒に一夜浸し、蒸熱して研り爛したものを餅にし、それを晒し乾し焙じ研つて用ゐる。

氣味

【甘し、寒にして毒なし】別錄に曰く、鹹し。權曰く、甘し、平なり。大明曰く、常山が使となる。

主治

【氣癰に痛を止め、水道、小便を利し、濕痺を除く。久しく服すれば、身體を軽くし、老衰を防ぐ】〔本經〕【男子の傷中、婦人の淋瀝で食欲不進のもの。肺を養ひ、陰を強くし、精を益し、子を儲けしめ、目を明かにし、赤痛を療ず】〔別錄〕【風毒、肝中の風熱毒、風が眼を衝いたために起る赤痛、障翳、頭痛、涙出を去り、丹石の毒を壓し、心胸の煩熱を去る】〔甄權〕

【肝を養ふ】〔蕭炳〕【婦人の難産を安全に分娩せしめる】〔陸機〕【小腸の熱を導き、暑濕瀉痢を止める】〔時珍〕

發明

弘景曰く、車前子は性冷にして利するものだ。仙經でも、人の身體を軽くして岸谷を跳び越え。老衰せず、長生するものとしてこれを服餌する。

〔二〕木村（根）曰く、おぼにこへ全草中ニ
アウクビン（配糖體）
チ含有ス（一）又アラ
シタギントイフ配糖
體ヲ分離セリトイフ
無ア（二）種子ハ油
脂（一〇％）（三）多量
ノ粘液ノ他アラデノ
ール酸、琥珀酸、アデ
ニン、シヨリン等チ
含有ス（四）。

〔一〕宿谷舜英——富
藥誌大・一三、藥誌、
大・二二（四九〇）一
一六。

〔二〕富橋純岡——岡
醫大・一一（三八五）
五九。

(H. W. F. 711; U. S. D. 135; A. J. P. 1886 (38) 418; 1898 (70) 189.

(四) 緒方榮、西大路隆憲——藥誌、大・一三、(五一四) 一〇四〇。

【藥州】葛橋氏ノ實驗ニヨレバブランギンハ呼吸中權ニ作用シ、呼吸運動ヲ擴大且ツ緩慢ナラシメ、且ツシキ氣管作用ヲ呈シ、又分泌腺等ヲ充塞セシメ、氣管及ビ氣管支ノ粘液消化液ノ分泌ヲ増加ストイフ、血液ノ溶解作用ハ無シ。

(一) 車前ハ目ノ腺病シテ痛ムモノナ云フハラン。

(二) 風濕ハ囊狀腺腫腫痛腫痛云々。

(三) 藥水草ニハ午ナ五ニ作ル。

頤曰く、車前子は最も多く藥に入れるものだ。駐景丸と稱し、車前、兔絲二物を室で丸にして飲み込む方は、古今の奇方となつてゐる。

好古曰く、車前子は、能く小便を利するが氣を走しない。功力は茯苓と同様だ。

時珍曰く、按ずるに、神仙服食經に「車前、一名地衣は雷の精であつて、これを

服すれば形化する、八月採收するものだ」とあるが、現に車前は五月には子が已に

老いるものだ。然るに七八月に採るとあるは、土地、氣候の異ふためであらう。し

かし唐の張籍の詩に「開州三月車前子。作藥人皆道有神。慚愧文君憐病眼。」

三千里外寄閑人」とある、これで觀れば、やはり五月開州で採つたものが良いといふことになり、又、この草が眼病を治する功力のあるものだといふことも窺ひ

得る。概してこれを藥に入れて服食するには、他の藥を佐とすることになつてゐる

ので、六味地黃丸に澤瀉を用ゐるやうにするがよいのである。單用しては甚だ過度

に泄するものだから、恐らく久しく服すべきものではない。ところが歐陽公が嘗て

劇しく下痢病に罹つたとき、同手大家も治療し得なかつたが、夫人が商人から買つ

て進めた一帖の藥で癒えた。特にその方を調べて見ると、それは「車前一味を末に

（二）穀藏下恐クハ脱字アラシ。

し、米飲で二錢匕を服す』といふのであつた。この薬は水道を利するが氣を動ぜぬ。水道が利すれば清、濁が分れて（二）穀藏が自から止むのである。

附方

舊七、新五。

【小便血淋】痛むには、車前子を晒し乾して末にし、二錢

づつを車前葉の煎湯で服す。（普濟方）

【石淋の痛むもの】車前子二升を絹袋に盛り、

水八升で三升に煮取つて服す。須臾にして石が下る。（肘後方）

【老人の淋病】身體熱

甚だしきには、車前子五合を綿に裹んで煮た汁に、青粱米せいりやうまい四合を入れて粥に煮て食

ふ。常服すれば目を明かにする。（壽親養老書）

【妊婦の熱淋】車前子五兩、葵根を切つ

て一升、水五升を一升半に煎じ、三回に分服して利するを度とする。（梅師方）

【胎を

滑し、分娩を容易にする】車前子を末にして方寸匕を酒で服す。酒を飲めぬものは

水で調へて服す。詩に『采芣苢』とあつて、能く婦人をして子有るを樂ましめる

といふことで、陸機の注に『婦人の産難を治す』とあるその意味だ。（婦人良方）

【横

産で分身せぬもの】車前子末二錢を酒で服す。（子母秘錄）

【陰冷悶疹ちんどう】

漸次に冷疹が

囊の内部に入つて腫滿するものは死に至る。車前子末方寸匕を飲で服す。一日二回。

（千金方）

【癰瘡いんそうの腹に入るもの】身體腫れ、舌強ばるには、車前子末をまぶすがよ

し（千金方）【陰下の痒痛】車前子の煮汁で頻りに洗ふ（外臺秘要）【内障の久患】車

前子、乾地黄、麥門冬（はくもんとう）等分を末にし、蜜で梧子大の丸にして服す。屢々實驗上有效であつた。（聖惠方）【虚を補し目を明かにする】駐景丸——肝、腎（じん）俱に虚し、眼昏し

て黒花を見、或は障翳を生じ、風に當つて涙の出るものを治す。久しく服すれば、

肝、腎を補し、目の力を増す。車前子、熟地黄を酒で蒸し焙じて各三兩、兔絲子を

酒に浸して五兩を末にし、煉蜜で梧子大の丸にし、一日二回、三十丸づつを温酒で

服す。（和劑局方）【風熱目暗】瀉痛（しやくつう）するには、車前子、宣州黃連各一兩を末にし、一

日二回、食後に一錢を温酒で服す。（聖惠方）

草 及び根

修 治

數曰く、凡そこれを用ゐるには、一株に葉が九枚あつて中

に蕊があり、莖の長さ一尺二寸ほどのものがよく、蕊、葉、根全部で土を去つて重

量（一匁）一鎰（いちちやく）あるものならば藥力が完全だ。藥を使ふときは、蕊、莖を使つてはならぬ。

細かに剉み、新しい瓦の上に攤（ひら）けて乾して用ゐる。

氣 味

【甘し、寒にして毒なし】土宿眞君曰く、硫黃を伏し、草砂を結し、

五礬、粉霜を伏し得る。

主 治

【金瘡に血を止め、衄血、瘀血（おけつ）、血癥（けつか）、下血、小

便赤を止め、煩を止め氣を下し、小蟲を除く〔別錄〕「陰瘰に主效がある」〔之方〕「葉は泄精の病に主效があり、尿血を治し、よく五臟を補し、目を明かにし、小便を利し、五淋を通ず」〔甄權〕

發明

弘景曰く、葉の搗汁を服すれば泄精を療ずるに甚だ效驗がある。宗奭曰く、陶氏の説は大なる誤だ。この葉は甘くして滑する。小便を利し、精氣を泄らすものだ。ある者が菜にして頻りに食つたために、小便がしまらなくなり、殆ど危い状態に陥らんとした實例がある。

附方

舊方、新七。

【小便不通】車前草一斤、水三升を一升半に煎じ、三回に分

服する。ある方では冬瓜汁とうかじゅうを入れ、ある方では桑葉汁を入れる。〔百一方〕【初生兒の

尿澀】通ぜぬには、車前の搗汁に蜜少量を入れて灌ぐ。〔全幼心鑑〕【小便尿血】車前

の搗汁五合を空心に服す。〔外臺秘要〕【鼻衄びさくの止まぬもの】生車前葉の搗汁を飲むが

甚だ善し。〔圖經本草〕【金瘡出血】車前葉を搗いて傅ける。〔千金方〕【熱痢の止まぬも

の】車前葉の搗汁ちせんじゅうに蜜一合を入れ、煎じて温服する。〔聖惠方〕【産後の血滲けつじん】血

が大、小腸に滲入するには、車前草汁一升に蜜一合を入れて和し煎じ、一沸して二

(二) 牧野曰フ、集解ノ恭ノ説ハ能クさはなぐるまト吻合ス一種乾地ニ生ズルモノ即チ *Senecio camp-
pestris*, L. デ和名ナかなぐるまト稱スル、植物名實圖考卷ノ十四ノ狗舌草ノ圖ハ粗圖デハアルガ、此モかなぐるまヲ描イタモノデアルト思フ。

同に分服する。(崔氏方) 【濕氣腰痛】罌蓂草を根共七株、葱白を鬚共七株、藁七箇を酒一瓶で煮て常服する。終身發らない。(簡便方) 【喉痺乳蛾】罌蓂衣、鳳尾草を搗り爛らし、酒で煮た霜梅肉各少量を入れて再び研り、汁を絞つて鷺翎で患部に刷く。手に隨つて痰を吐し、直ちに引くものだ。(趙澗養病漫筆) 【目赤で痛むもの】車前草の自然汁で朴硝末を調へ、就寢時に眼胞上に塗つて翌朝洗ひ去る。○小兒の目痛には車前草汁に竹瀝を和して點ける。(聖濟總錄) 【目中の微翳】車前葉、枸杞葉等分を手で揉んで汁を出し、桑の葉で二重に裹んで一夜陰暗の場所に懸け、その桑葉を破つて汁を取つて點ける。三五回を過ぎずして效がある。(十便良方)

(一) 狗舌草 (唐本草)



【草舌狗】

集解

恭曰く、狗舌は溝、濠などの濕地に生える叢生の草で、葉は車前に似てゐるが文理はない。莖が抽き出て黄白色の花を開く。四月、五月に莖を採つて暴乾

和名 さはなぐるま
學名 *Senecio campestris*, L. var.
subidentatus, Maxim.
科名 きく科(菊科)

する。

氣味

【苦し、寒にして小毒あり】

主治

【蠱疥、瘡瘡の小蟲を殺す。

末にし和して塗れば直ちに癒える】（蘇恭）

馬鞭草（別錄下品）

和名 くまじら
學名 Verbena officinalis, L.
科名 くまじら

校正

圖經の龍牙草を併せ入る。

釋名

龍牙草（圖經）

鳳頸草

恭曰く、穗が鞭の鞘に似てゐるから馬鞭と名

けたのだ。藏器曰く、この説明は事實に近くない。これは節に紫の花が咲いて馬鞭

のやうだといふ意味だ。

時珍曰く、龍牙、鳳頸はいづれも穗に因んで名けたものだ。蘇頌の圖經には、外

類の部に龍牙を重出してあるが、今はこの一條中に併記する。又、現に方士が諸種

の草に妄りに様様の名稱をつけるので、龍牙なる名稱も甚だ混亂されてゐるが、そ

れは信憑するに足らない。

（一）木村（康）曰く、さはなぐるまニ就テノ報文ハナイガ、
archo 屬ニハイスリ
ンセネシオ酸、セネ
シン酸或ハアルカロ
イド類等ノ成分報告
セラル。
W. P. 781—4; U.S.
D. 1602.

（二）牧野曰フ、諸州
野外ニ見ル雜草テ殊
ニ海ニ近キ地ニ多
イ。

龍牙草ハ此處ニハ馬
鞭草ニ合セテアレド
モ、是レハ別ノ草デ
キンミヅヒキト云フ
モノデアル。植物名
實圖考卷ノ十二ニ其
圖ガアルノデ能ク判
カル、又、救荒本草
卷ノ七ニハ龍芽草ト
シテ又其圖ガアル、
即チ山野ニ多キ宿根
草デイバラ科（薔薇

科)ニ屬シ Agri-
onia Turpatoria L.

ノ學名ヲ有スル。

(二)大觀ニ色ノ下ニ
葉字アリ。

(三)大觀ニ葉ヲ苗ニ
作ル。

集 解

弘景^〇曰く、村落に甚だ多い。莖は細辛に似て、花は紫^〇色、微に蓬蒿
に似てゐる。

恭^〇曰く、(一)葉は狼牙、及び茺蔚^{じゅういつ}に似たもので、三四本の穂が抽き出る。花は紫だ。

車前の穂に似て鞭鞘のやうなもの
だ。全然蓬蒿には似てゐない。

保昇^〇曰く、花は白色だ。七月、八

月に苗、葉を採り、日光で乾して用
ゐる。



〔草 馬 鞭 牙〕
——牙 龍——

頤^〇曰く、今は(一)衡山^{かうざん}、(二)廬山^{ろざん}、(三)江淮^{かうわい}の州郡にいづれもある。苗は益母に類して

莖が圓く、高さ二三尺のものだ。又曰く、龍牙草^{りゅうがそう}は(七)施州^{ししゅう}に生ずる。高さ二尺ばか

り、春、夏に苗、葉があり、秋、冬になると枯れる。根を採つて洗淨して用ゐるも

のだ。

時珍^〇曰く、馬鞭は低地に甚だ多い。春季中に苗が生え、莖は四角、葉は益母に似

て對生する。夏、秋に穂になつた細かい紫の花を開き、車前の穂のやうだ。その子

(四)衡山ハ石部礞石
ノ註ヲ見ヨ。
(五)廬山ハ石部菩薩
石ノ註ヲ見ヨ。
(六)江淮ハ山草類沙
疊ノ註ヲ見ヨ。
(七)施州ハ山草類部
管草ノ註ヲ見ヨ。

(ハ) 弘景ハ蓬蘽ニ似ルト云ツテ居リ、花トハ云ツテ居ラス。

(九) 木村(康)曰ク、全草中ニニベルベナリ(結晶性配糖體)ヲ含有ス。

It. Fritradier : Chem. Ztg. 10.8, April. 11. W. P. 638.
藥誌、四(三)一六、五九三。

蓬蒿子ほうこうしのやうで細かく、根は白くして小さい。陶弘景が『(ハ)花は蓬蒿に似てゐる』といひ、韓保昇が『花は白色だ』といひ、蘇恭が『莖は圓い』といつてゐるが、いづれも誤だ。

苗葉(九)氣味

【苦し、微寒にして毒なし】(保昇) 大明曰く、辛し、涼にして毒なし。權曰く、苦し、毒あり。丹砂、硫黃を伏す。

主治 【下部の膿瘡】かたぐさう

(別錄) 【瘰癧、血瘕、久瘡】(權) 【血を破り、蟲を殺すには、搗き爛らして汁を煎じ取り、飴のやうに熬つて一匕づつを空心に酒で服す】(藏器) 【婦人の血氣、肚脹、月經不順を治し、月經を通ずる】(大明) 【金瘡を治し、血を行らし、血を活かす】(震亨)

【搗いて癰腫、及び蠅虻尿瘡、男子の陰腫に塗る】(時珍)

附方

舊六、新十。

【瘡瘻寒熱】馬鞭草の搗汁五合、酒二合を二回に分服する。

(千金方)

【鼓脹煩渴】身體乾き、黒瘦するには、馬鞭草を細かに剉み、火氣に當てぬやうにして曝乾し、酒、或は水と共に味の出来るまで煮て、滓を去つて溫服する。六

月中旬の雷鳴時に採つたものが有效だ。(衛生易簡方)

【大腹水腫】馬鞭草、鼠尾草各

十斤、水一石を五斗に煮取つて滓を去り、再び煎じて粘ねばるやうにし、(二〇)粉(二〇)を和し

(二〇)粉ハ米粉ノコトナラン。

〔二〕大觀ニ血ヲ氣ニ
作ル。

〔三〕人疥馬疥ハ人ヤ
馬ニ發スル疥癬ノコ
トナラン。

て大豆大の丸にし、二三丸乃至四五丸づつを服すれば神效がある。(肘後方) 【男子の陰腫】大さ一升ほど實^みてたやうに腫れて痛み、手當の方法なきには、馬鞭草を搗いて塗る。(集驗方) 【婦人の疝痛】小腸氣と名ける。馬鞭草一兩を酒で煎沸して服し、湯にして身體を浴し、汗を取るが甚だ妙である。(藥要奇方) 【月經閉止】癥塊^{やうかい}を結成し、肋が脹大して死せんとするには、馬鞭草の根、苗五斤を細かに剉み、水五斗で一斗に煎じて滓を去り、熬つて膏にし、一日二回、半匕づつを熱酒に溶かして服す。(聖惠方) 【酒積下血】馬鞭草灰四錢、白芷灰一錢を蒸餅で梧子大の丸にし、五十丸づつを米飲で服す。(摘玄方) 【魚肉癥瘕】凡そ魚鱸^{ぎょくわい}、及び生肉を食ひ、それが胸脇に在つて消化せず、ために作つた癥瘕には、馬鞭草の搗汁一升を飲めば消する。(千金方) 【馬喉痺風】頰まで躁腫し、數ば吐^{くは}血するには、馬鞭草一握を風に當てぬやうにして兩端を截り去り、その搗汁を飲むがよし。(千金方) 【乳癰腫痛】馬鞭草一握、酒一椀、生薑一塊を搗つてその汁を服し、渣を傅ける。(衛生易簡方) 【白癩風瘡】馬鞭草を末にし、一日三回、一錢づつを食前に荊芥薄荷湯^{けいかいほうたう}で服す。鐵器を忌む。(太平聖惠方) 【人疥、馬疥】馬鞭草を鐵器に觸れずに搗いた自然汁半盞を飲む。繼續

して服すれば、十日間以内で癒え、神效がある。(重効集驗方) 【赤、白下痢】龍牙草五錢、陳茶一撮を水で煎じて服す。神效がある。(醫方摘要) 【發背癰毒】痛み忍び難きには、龍牙草を搗いて汁を飲み、滓を患部に傅ける。(集簡方) 【楊梅惡瘡】馬鞭草の煎湯で先づ薰じ後に洗ふ。氣が滲み透れば快く感じ、痛腫が随つて減ずる。(陳嘉謨本草蒙筌)

根 氣味

【辛く濇し、溫にして毒なし】

主治

【赤、白下痢の初期には、

焙じ搗き篩つて末にし、一錢匕づつを米飲で服す。忌むものなし】(蘇頌)

(一) 蛇 含 (本經下品)

和名 をへびうち
學名 *Potentilla Kieimuna*, Wright et Arn.
科名 いばら科(薔薇科)

校正

圖經の紫背龍牙を併せ入る。

釋名

蛇銜(本經) 威蛇(大明) 小龍牙(綱目) 紫背龍牙 恭曰く、陶氏の

本草に蛇合と書いてあるが、合の字は含の字の誤だ。含と銜とは同意義であつて、古本草にはさうも書いてある。

(一) 牧野曰フ、姑ク先輩ノ見ニ從フテ蛇含ヲなへびうちトシテ置ク、植物名實圖考卷ノ十一ノ圖略ハ其形狀ヲ示シテ居ル。

時珍曰く、按ずるに、劉敬叔の異苑に『ある農夫が、一匹の蛇が負傷すると、他

の一匹の蛇がある草を銜くはんで來て瘡上に著けたが、數日の後、負傷したその蛇が何

處へか往つて了つたのを見て、その草を蛇瘡

に傳けて見ると、果して效驗があつたので、

それから蛇銜草と呼ぶやうになつたのだ』と

ある。その葉は龍牙に似て小さく、背面が紫

色だ。故に俗に小龍牙、又は紫背龍牙と呼ぶ。

蘇頌の圖經には紫背龍牙を重出してあるが、



〔含 蛇〕

本書は一條に併記した。

集解

別錄に曰く、蛇含は益州えきしゅうの山谷に出る。八月に採つて陰乾する。弘

景曰く、蛇銜は處處にある。兩種あつて、いづれも石上に生え、また黄土の上にも生える。薬には細葉で黄花のものをを用うべきものだ。

頤曰く、興州こうしゅうに産するとなつてゐるが、今は近い處にもあつて、土石の上、或は

下濕の地に生える。蜀地方の民家では、やはりこれを栽培して蛇を辟しりぞける。一莖に

(二) 益州ハ金部金ノ註ヲ見ヨ。

(三) 興州ハ今ノ甘肅省寧夏府ノ地ナリ。

五葉、或は七葉の兩種がある。八月に根を採つて陰乾する。日華子は「莖、葉俱に用ゐる、五月採收する」といつてある。又曰く、紫背龍牙は蜀地方に生ずるもので、春夏葉が生える。採收に一定の時期はない。

時珍曰く、此に二種とあるは、細葉のものを蛇衛と名け、大葉のものは龍衛と名けるのであるが、龍衛もやはり瘡の膏に入れて用ゐる。

攷曰く、蛇衛は葉のみを用ゐ、晒乾する。火氣に觸れてはならぬ。根、莖は用ゐない。誤つてある藥の尖葉を用ゐてはならぬ。それは竟命草と呼び、味の酸く澀いものだ。誤つて服すれば吐血して止まぬ。その場合には速かに知時子を服すれば解す。

(註) 知時子ハ藥知子ノ一名ナリト云フ。

氣味

【苦し、微寒にして毒なし】 攷曰く、毒あり。頤曰く、紫背龍牙は辛

し、寒にして毒なし。

主治

【驚痢の寒熱邪氣に熱を除く。金瘡、疽痔、鼠瘻

瘡、頭瘍】(本草) 【心腹の邪氣、腹痛、濕痺を療じ、胎を養ひ、小兒を利す】(別錄)

【小兒の寒熱丹毒を治す】(甄權) 【血を止め、風毒、癰腫、赤眼を協す。汁を蛇、虺、

蜂の毒に傳ける】(大明) 【紫背龍牙は一切の蛇毒を解す。咽喉中痛を治するには、含

み嚙めば效がある」(蘇頌)

發明

藏器曰く、蛇じやう咬かうを治するもので、現に蛇の口中へこの草を納れると、たとひ人を傷けても害毒を及ぼさぬ。これを栽ふればやはり蛇がゐなくなる。頌曰く、古今の丹毒、瘡腫を治する方に通じ用ゐられ、古今錄驗には『赤瘰せきろうを治するには、蛇銜草を十分に搗爛して傅ければ瘰癒る』とある。赤瘰は冷濕が肌中を搏つに由つて起るもので、それが甚しければ熱となり、ために赤瘰となつて現はれるものだ。天候が熱すれば劇しく、冷れば減ずるはそのためだ。

時珍曰く、按ずるに、葛洪の抱朴子に『蛇銜膏は、已に切斷された指を繼ぐ』とあるが、現に葛洪の肘後方を調べて見るに、蛇銜膏の説明に『瘰腫の瘰血、産後の積血、耳目の諸病、牛の頰や馬の鞍下の瘡を治するに、蛇銜、大黃、附子ぶし、芍藥、大戟、細辛、獨活、黃芩、當歸、莽草、蜀椒各一兩、薤白けいひく十四箇を末にして苦酒に一夜漬け、豬膏二斤を入れて七星火上で煎沸し、膏にして取り收め、一彈丸づつを溫酒で服し、日毎に再服する。病の外部に在るには摩つて傅け、耳の中に在るには綿で裏つんで塞ぎ、目に在るには點ける。また龍銜藤一兩を入れたものをば龍銜膏と

(五) 按ズルニ七星下
蟻字ヲ脱スルナラ
ン。

名ける』とある。所謂、斷きれた指を繼ぐといふはこの膏のことかも知れない。

附方

舊三、新一。

【産後の瀉痢】小龍牙根一握を濃く煎じて服す。甚だ效がある。即ち蛇含のことだ。(斗門方)

【金瘡出血】蛇含草を搗いて傅ける。(肘后方)

【身體面部の惡癬】紫背草に生礬を入れ、研つて二三回傅ければ根を斷つ。(直指方)

【蜈蚣の螫傷】蛇銜を揉んで傅ける。(古今錄驗)

(一) 女青 (本經下品)

和名 ひめいよかつら 蘿摩に似たるといふもの
學名 *Gymnoloma silvaticum*, R. Br.
科名 ががいも科(蘿摩科)

釋名

雀瓢(本經)

集解

別錄に曰く、女青むすせいは蛇銜じのげんの根である。(宋匡そうかうに生ずる。八月に採つて

陰乾する。弘景曰く、これが蛇銜の根とすれば、朱厓しゆがいのみに生ずると限るべき筈はない。世間一般に用ゐるものは草の葉だから、別の一植物で、蛇含ではないと思ふが、正確には斷定し兼ねる。が、方術に『この物の一層一兩を帶びれば疫癘えきれいがその身を犯さぬ。それには眞物を撰ばねばならぬ』とある。又、今の藥種商の用ゐる一

(一) 牧野曰フ、女青ニツアツテ其一ハ上ノ蛇含ノ根だト謂ハレテ居ル、今一ハ下ノ植物ト思フ、救荒本草卷ノ七ニハ地梢瓜ノ名デ出テ居ル然シ是レハ藤本デハナイガ能ク伸長シタモノハ莖ガヒヨロヒヨロシテ稍ヤ蔓ノヤウニナツテ居ル、サレバ我が日本ニハ無イ草デ我がいよかつらト同屬ノモノデア

ル、本草綱目啓蒙デハ女青ノ藤本ノガナ
あかれ科(茜草科)ノ

へくそかづらニ充テ
アルガ穩當デハナ
イ。

(二) 朱厘ハ石部扁青
ノ註ヲ見ヨ。

(三) 大觀ニ屑字アル
ニ據ル。

種は、根の形狀が續斷のやうで、莖、葉は至つて苦い。これが荊州産の女青根だと
いふことだ。

恭曰く、この草は即ち雀瓢じやくへうである。平澤に生ずるもので、葉は蘿摩らまに似て兩兩相
對し、子は瓢の形に似て大さ棗ほどのものだ。故に雀瓢と名ける。根は白微に似て、
莖、葉は共に臭い。蛇銜そのものとは全然類しない。又、別錄に『葉は嫩わかい時は蘿
摩に似て正しく圓く、莖は太く、實は黒く、莖、葉の汁は黃白色だ』とあるも、や
はり右の説明のものに相似てゐる。これが蛇銜の根だとすれば、苗は益州に生じ、
根は朱厘しゆりに在り、根と苗と相去ること萬里餘といふ滑稽な話になる。蘿摩の葉も女
青に似てゐるので、やはり雀瓢と呼ばれてゐる。

藏器曰く、蘿摩は白環藤のこと、雀瓢は女青のことで、この二物は區別が付かぬ
ほど相似てゐるが、事實は同一植物でない。

機曰く、蘿摩とは子に對する稱呼、女青とは根に對する稱呼、蛇銜とは苗に對す
る稱呼だが、この三者は氣味、功用に於いて大いに異なるところがある。諸家の註説
は、それ等のものが齊ひとしく雀瓢と呼ばれるところから、同一の植物だらうと疑ひ、

又、産地がそれぞれ州郡を異にするところから、また二種の植物だらうと疑つてゐるのだが、本草に明かに『女青は蛇銜の根なり』と斷言してある以上、根と苗の産地が異つたところが、それは疑問とすべき理由にはなるまい。靡蕪びぶと芎藭きうきうの如き、産地が異ふからといつて二種の植物といはれようか。赤箭と徐長卿の如き、共に鬼督郵きとくゆうなる名稱を呼ばれてゐるが、それ故に合して同一植物だとは云はれまい。

(19) 藤生ハ藤莖莖ヲ有スルモノ。

時珍曰く、女青には二種あつて、一は(藤)藤生のものだ。蘇恭のいふ蘿摩らまに似たものがそれである。一は草生のもので、即ち蛇銜じつげんの根であつて、蛇銜にも大、小の二種あり、葉の細いものは蛇銜で、苗、莖を用ゐる。葉の大なるものは龍銜で、根を用ゐる。それ故に、王蕪の外臺祕要の龍銜膏は龍銜根を煎膏したもので、癰腫ようしゅ、金瘡を治するとある。即ちこの女青のことだ。陳藏器が『女青と蘿摩は區別し兼ねる』といひ、張揖の廣雅に『女青は葛類だ』とあるはいづれも藤生の女青を指したのだ。此にいふ女青を指したのではない。別錄に、明かに『女青は蛇銜の根なり』と斷じた一言が根據とすべきものである。既往の諸家が、朱厓に生ずるとあるただ一句に抗泥かうていして疑惑を抱いたが、それは甚だ感心しない。地方の言傳ひにはそれぞれ同じ

(五) 羅浮山ハ廣東省增城縣ニ在リ。

からぬ點のあるものだ。況やそれ等の疑惑の論者は、女青に兩種あることをさへ承知してゐなかつたのだ。又、(五)羅浮山記には『この山に男青といふがある、女青に似たものだ』とあるが、これは草生のものか、或は藤生のものか判然しない。

根 氣味

「辛し、平にして毒あり」權曰く、苦し、毒なし。蛇銜が使とな

主 治

【蠱毒】邪惡の氣を逐ひ、鬼、溫瘡を殺し、不祥を辟ける(本經)

附 方

舊二、新二。

【頓死】女青を屑に搗いて一錢を咽中に入れ、水、或は酒で

送下すれば立ろに活さる。(南岳魏夫人內傳)

【吐下急死】及び大人、小兒の突然腹皮が

青、黒、赤色となり、呼吸不能となりたるには、急に女青末を口中に入れて酒で送

下する。(子母祕錄)

【瘟疫の辟穰】かんたき正月上寅の日に女青を搗いて末にし、三角の紅絹

袋に入れて帳中に懸ける。大いに吉し。(肘後方)

(一) 鼠尾草

(別錄下品)

和名未詳
學名未詳
科名未詳

(一) 牧野曰フ、鼠尾草ハ救荒本草ニハ鼠菊ト出テ居ル、其草狀頗ル能クまつづら即チ馬鞭草ニ似テ屠トイフヨリモ同

釋 名

勛

音は勛(ケイ)である。

山陵薺(吳普)

烏草(拾遺)

水青(拾遺)

物デアルト言ヒタイ
程同シ形状ヲ呈シテ
居ル、我が邦ノ先輩
ハ此鼠尾草ヲあきの
たむらさう (Salvin
chinesis Benth.) ナ
ドニ充テ居レドモソ
レハ中ツテ居ナイ。

(一) 大觀ニ赤白ノ下
ニ二ノ字アルニ據
ル。

時珍曰く、鼠尾そびとは穂の形を形容した名稱で、爾雅に『勤は鼠尾なり』とある。黒色に物を染め得るところから烏草と名ける。また水青といふ。蘇頌の圖經に所謂、鼠尾、一名陵時とあるは陵翹りようけうの誤だ。

集解

別錄に曰く、鼠尾は平澤中に生ずる。四月葉を採り、七月花を採つて

陰乾する。弘景曰く、田野に甚だ多い。

世間ではこれを探つて液にし、黒染の染料にする。

鼠尾草



保昇曰く、所在の下濕の地にあるも

のだが、ただ黔中けんちゆう地方では採つて薬に

する。葉は蒿のやうで、莖端に夏車前のやうな穂が四五本生え、花に赤、白の二種がある。

藏器曰く、花は紫のもので、莖、葉俱に黒染の染料になる。

花葉

氣味

【苦し、微寒にして毒なし】

藏器曰く、平なり。

主治

【鼠瘻寒熱、下痢膿血の止まぬもの。白花のものは白下に主效があり、赤花のもの

は赤下に主效がある【別錄】「瘧疾、水蠱に主效がある」(時珍)

發明

弘景曰く、古今に、痢を治療するに多くこれを用ゐ、丸にし得るほど濃く煮て服し、或は飴のやうに煎じて服した。今も一般に用ゐて飲にする。或は末にして服してもよし。一日に三服する。

附方

舊一、新三。

【大腹水蠱】

方は馬鞭草の條を見よ。【久しきに互る休息

痢】或は止み、或は發するには、鼠尾草の花を搗いて末にし、飲で一錢を服す。(聖惠方) 【連年の下血】鼠尾草、地榆二兩、水二升を一升到煮て頓服する。二十年の久しき者も再服に過ぎずして效がある。末にし飲で服するもよし。(千金方) 【反花惡瘡】内側に飯粒のやうな惡肉を生じ、破ればまた生じて反つて外側へ出るものには、鼠尾草根を切つて豬脂と共に搗いて傅ける。(聖濟總錄)

(二) 狼把草 (拾遺)

和名 たうぎ(?)
學名 *Jidens tripartita*, L. (?)
科名 きく科(菊科)

校正

拾遺の郎耶草を併せ入る。

(一) 牧野曰フ、我邦ノ先輩此狼把草ヲたうぎニ充テテ居レドモ信ヲ措キ難イ、御手集解ノ文ヲ熟讀シテモ果シテ其レガ

たうこぎニ當ルカ否
カ充分ニ吞ミ込メヌ
ノデアル。

釋名

郎耶草

時珍曰く、

この草は即ち陳藏器本草の郎耶草であつて、閩地

方では爺(オヤデ)を郎罷らうはいといふから、狼把らうはいは郎罷と書くが正しいのだといふが、それで意味は通じる。又、方士の言に『此の草は即ち鼠尾草だ』といひ、功用もやはり近いのだが、的確な據があるわけではない。

集解

藏器曰く、狼把草は山道の傍に生ずるもので、秋穂子といづれも物を

(三) 鷹齒ハ鋸齒ノコト。

黒色に染め得る。又曰く、郎耶草は山澤の間に生ずる。高さ三四尺、葉に(三)鷹齒が



〔草 把 狼〕

形状だ。

こと、その葉は極があつて鋸脚のやうな
あつて鬼針の苗のやうだ。鬼針とは鬼鋸きさの
禹錫うき曰く、狼把草は近道に出る。古方には用ゐられなかつた。ただ陳藏器だけが功
用に就いて言つてゐるが、それも詳かでは

ない。文宗皇帝の御書に『この草は、主として血痢を療するに甚だ至精なものだ』と記されてあるから、謹んでそれに據つて本草圖經外類の篇首に掲載する。

(三) 木村(康)曰ク、
文獻、上野金太郎一
藥誌明、三七(二六
五)一八三。
高橋増次郎一藥誌、
明、三七(一七三)九
〇一。
U. S. D. 488.

(一) 牧野曰フ、狗尾
草ハえのころぐさと
きんえのころトノ兩
者ヲ指シタ名デア
ル。

氣味

【苦し、平にして毒なし】

主治

【頭髮を黒くし、老衰せしめぬ。

又曰く、郎耶草は、赤、白久痢、小兒の大腹痛滿、丹毒寒熱に主效がある。根、莖を取つて煮汁を服す【藏器】「狼把草は、男子の血痢に主效があつて、婦人の血痢には效がない。根は積年の疳痢を治す。草二斤を搗いて汁一小升を絞取り、白麪を雞子半箇ほど入れて、むらなく和し、空腹に頓服する。極めて重病のものも三服を過ぎずして效がある。或は苗を取り收め、陰乾して末に擣き、蜜水半盞で一方寸匕を服す【圖經】「鬚髮を染めるによし。積年の癰で曇天の際に痒く、搔けば黄水を出すものを治するには、擣いて末にして摻る【時珍】

狗尾草

(綱目)

和名 えのころぐさ、井、きんえのころ
學名 *Setaria viridis*, Beauv. et S. glutin., Beauv.
科名 禾本科(禾本科)

釋名

莠

音は酉(イウ)である。光明草(綱目)

阿羅漢草

時珍曰く、莠と

は、草が秀でて實らぬをいふ。故にその文字は秀に従ふのだ。穂の形が狗の尾のやうな形狀だから、俗に形容して狗尾と名けかのだ。その莖は目痛を治するところか

ら、方士は光明草、阿羅漢草あらかんそうといふ。

集解

時珍曰く、原野や土塀などに多く生える。苗、葉は粟に似て小さく、

穂も粟に似て黄白色のものだが、實がない。莖を採つて筒に貯ひ、目痛を治するに用ゐる『莠が苗を亂るを惡む』といふはこの草のことだ。

主治

【疣目いもうも】には、髮毛でその疣目を



〔草 尾 狗〕

反してこの莖一二本で水を蘸ける。惡血を憂去くわつきよして甚だよし【時珍】

鱧腸こ (唐本草)

和名 たかさぶらう
學名 *Eclipta alba*, Husbk.
科名 きく科(菊科)

釋名

蓮子草(唐本) 旱蓮草(圖經) 金陵草(圖經) 墨煙草(綱目) 墨頭草

(綱目)

墨菜(綱目)

獼孫頭(必用)

豬牙草

時珍曰く、鱧とは烏魚のことで、そ

(こ) 牧野曰フ、普通ノ雜草デ諸處ニ生ズル、莖ノ立ツモノト臥スモノトガアルガ其レハタダ生エル場處ノ狀況ニヨツテ異ナルノミデ、敢テ別種ノモノデハナイ。

の腸も黒い魚だ。この草は莖が柔かく、断てば墨のやうな汁が出るところからかく名けたのだ。俗に墨菜と呼ぶがこの草だ。實が細くして頗る蓮房の形狀に似たところから、その名稱に蓮を付けて呼ばれるのだ。


集解

恭曰く、鱧腸は下濕の地に生ずるもので、所在の溝、濠などに多い。

苗は旋覆に似たものだ。二月、八月に採つて陰乾する。

頤曰く、處處にあるが、南方に就中多

い。この草には二種あつて、一種は、葉が柳に似て光澤があり、莖は馬齒莧に似て高さ一二尺、花は細くして白く、實は



〔腸 鱧〕
——蓮 旱——

小さい蓮房のやうだ。蘇恭のいふ『旋覆に似たもの』とはこのものだ。また一種は、苗梗が枯瘦し、頗る蓮花に似て黄色だ。實もやはり房になつて圓い。南方地方でいふ連翹だ。二種共に、その苗を折れば汁が出て、須臾にして黒くなる。俗に旱蓮子といひ、また金陵草ともいふ。



〔蓮 早 翹 連 小〕

時珍曰く、旱蓮は二種ある。一種は苗が莖葉に似て花は白く細い。それが鱧腸だ。一種は、花が黄紫色で蓮房のやうな房を結ぶ。これは小連翹だ。爐火家でも用ゐる。連翹の條參照。

〔二〕牧野曰フ、小連翹ハ本草綱目啓蒙ニ云ヘルヤウニおとぎり^リニ^ニ (Hypericum erectum, Thunb.)ニアラウ。

〔三〕鐵樹ハ樹瘡ノ類ナルベシ、一種膿漿を益す。

〔四〕通油器詳ナラズ、油銅ノ類ナラン。

草 氣 味

【甘く酸し、平にして毒なし】

主 治

【血痢、鍼灸瘡が發洪し

て血の止まぬものに傅ければ立ろに止まる。汁を眉髪に塗れば發生も速く、且つ毛が多くなる】〔唐本〕【髭髪を黒くし、腎陰を益す】〔時珍〕【血を止め、膿を排し、小腸を通ずる。一切の瘡、并に鐵樹に傅ける】〔大明〕【膏にして鼻中に點ければ腦の力を益す】〔蕭炳〕

附 方

舊一、新九。

【金陵煎】髭髪を益し、白きを變じて黒くする。金陵草一秤

——六月以後に採收して青嫩の泥土の著かぬものを揀り取る——を洗はずに黄葉を摘み去り、搗き爛らして新しい布で汁を絞り取り、紗絹で濾過して通油器に入れ、鉢に盛つて五日間日中に煎じ、又、生薑一斤の絞汁と白蜜一斤を合和して日中に煎

(五)大製ニ據リテ且
字ヲ補入ス。

(六)麻姑餅ハ胡麻ノ
條ニ出ヅ。

じ、柳木篋で手を休めず攪きまぜながら煎じ、稀飴きだうのやうになつて完成する。それを毎旦及び午後各一匙づつを溫酒一盞に溶かして服す。若し丸にして用ゐるならば、日中再び煎じて丸になるまで煎じ、梧子大の丸にして三十丸づつを服す。用ゐんとする時に多く合せらるが佳いのである。その效甚だ速だ。(孫真人千金月令方)「鬚を黒くし、齒を固める」攝生妙用方では、七月に旱蓮草を取り、根のまゝ一斤を無灰酒で洗淨し、青鹽四兩に三晝夜漬け、その汁と共に油鍋中に入れ、炒つて性を存し、研末して日毎に牙に擦り、津と共に嚥む。○又ある法では、旱蓮の汁を取り、鹽と共に煉り乾かして研末し、牙に擦る。○奉親養老書では、旱蓮散——髭を黒くし、牙を固める。溫尉の言に『納合相公は、此の方を用ゐて年七十にして鬚髮が白くならなかつた。そこで大いに手を盡して始めて方を得、後に張經に遇つて始めて分量の詳細を傳授したものである。旱蓮草一兩半、(方)麻姑餅三兩、升麻、青鹽各三兩半、訶子を核のまゝ二十箇、皂角三挺、晚蠶沙二兩を末にし、薄醋麪糊で彈子大の丸にして晒し乾し、泥瓶中に入れて火で煨き、烟を出し盡して性を存して取り出し、研末して日毎に牙に揩する』とある。【偏、正頭痛】鱧腸草の汁を鼻中に滴

（七）手首ノ脈ノ搏ッ
處。

らす（聖濟總錄）【一切の眼疾】（さいしやくやんぢやく） 瞖膜遮障、（さいしやくやんぢやく） 腦を涼し、頭痛を治し、よく髪を生ずる。五月五日の朝この藥を合はせる。蓮子草一握、藍葉一握を油一斤と共に浸して四十九日間密封し、就寢時に鐵匙でその藥を點け、頂上を四十九回摩する。久しく繼續するが甚だ佳し（聖濟總錄）【臂に繋けて瘡を截る】早蓮草を搥き爛らし、男は左、女は右の（七）寸口の上へ置き、その上を古文錢で押へて帛で縛り付けて置く。良久して小泡が起つものだ。これは天灸と稱する方法で、瘡は直ちに止まる。甚だ有效なものだ。（王執中資生經）【小便尿血】金陵草、一名墨頭草、車前草各等分を杵いて自然汁を取り、空心に三盃づつを服し、瘡えれば止める（醫學正傳）【腸風膿毒】下血して止まぬには、早蓮子草を互の上で焙じて研末し、二錢づつを米飲で服す（家藏經驗方）【痔漏瘡發】早蓮草一把を根鬚のまま洗淨し、石臼で泥のやうに搗り、極熱した酒一盞を注ぎ込み、その汁を取つて飲み、滓を患部に傳ける。重きものも三服に過ぎずして平安になる。大僕少卿王鳴鳳は、この病を患つて杖に絶つて漸く歩むほどだったが、この藥を服して平癒した。屢々治療上の實驗がある（劉松石保壽堂方）【疔瘡惡腫】五月五日に早蓮草を採收し、陰乾して一夜露らして取收め、病ある毎に、一葉

(一)牧野曰フ、連翹ノ根本ノ品ハ蓋シ下ニ記入セルとも云々ナナル草本デアラホバナラスト私ハ考定スル、此品ハ植物名實圖考卷ノ十一ニハ湖南連翹ノ名デ出テ居ル、是ニ由テ觀テモ連翹ガ Hypericum 屬ノモノデアラネバナラヌ事ガ首肯セラシル今日デハひいらぎ科ニ屬スル木本ノ類名れんげう(普通ニ觀賞用トシテ庭園ニ植エラレテヤウモノデ)Forseythia suspensa, Yail. ノ學名モ有スモ此處ノ連翹ニ充テ居レドモ、ソレハ固ヨリ誤リテ是レハ厥トモ誤リ誤ツタモノデアアル、即チ集解ノ文中ニアキ椿ノ實ノマダ開カヌモノニ似タアルモ

を嚼んで腫上に貼り、その上を消毒膏で押へる。二三日で疔が脱するものだ。(聖濟總錄) 【風牙疼痛】 獼猴頭草に鹽少量を入れ、掌の心で揉み擦れば直ちに止まる。(集玄方)

(二) 連 翹 (本經下品)

和名 ともろこし
學名 Hypericum Ascyron, L.
科名 おとこりむら科(金絲桃科)

校正 有名未用、本經の翹根を併せ入る。

釋名 連(爾雅) 異翹(爾雅) 旱蓮子(藥性) 蘭華(吳普) 三廉(別錄) 根

を連翹と名ける、(仲景) 竹根(別錄) 恭曰く、その實が蓮に似て房になり、多く

の草の中で(三)翹出するものだからかく名けたのだ。宗奭曰く、連翹も多くの草の中

で特に翹出するわけではない。太山(たいざん)の山谷に甚だ多く、果實を拆けば、その子が一

枚一枚相竝んで(三)翹のやうだから、それで翹なる名稱が生じたものだらう。

時珍曰く、按ずるに、爾雅に『連は異翹なり』とあるところから見ると、この草

本來の名稱は連であるが、また異翹なる別名もあるので、それを合せて世人が連翹

ノテ畢竟一ノ偽物デ
アル、植物名實圖考
卷ノ十一ニアル連翹
ノ圖ハ想像デ描イタ
モノト斷ズル、右ノ
ともゑさうガ即チ集
解ニアル大翹デ其小
翹トアルノハおとぎ
ミ^ミヲウ

Hypericum
erectum, Thunb. カ

或ハ之レニ似タシな
おとぎり (H. atten-
uatum, Oh. isy.) カ
デアアラウト思フ。

木村(康)曰ク、從來
漢藥連翹ニれんげう
ヲ充テ、本邦和漢藥
商ハれんげうノ果實
ヲ以テ、商品トナセ
ドモ實ハ誤ニシテ、
元來ともゑさう或ハ
其近縁ノモノナルベ
ク、現ニ其成熟セル
蒴果ヲ著ケタル全草
ノ商品ヲ支那市場ニ
於テ見ル。

白井曰ク、牧野、木

と呼んだのだ。連翹^{れんせう}は連翹^{れんせう}とも書く、これは本經下品の翹根のことだ。唐の蘇恭が
本草を纂修するに方^{あた}つて、退けて有名未用の部に編入したが、本書では一條中に併
記した。早蓮といふは小翹のことで、一般にこれを鰾腸^{れんちやう}といふところから、同じく
早蓮と呼ぶ。

集 解


別錄に曰く、連翹は太山の山谷に生ずる。八月に採つて陰乾する。弘
景曰く、處處にあるもので、今は莖と花、實と共に用ゐる。

恭曰く、この草には、大翹、小翹の兩種あつて、大翹は下濕の地に生え、葉は狭
く長く、水蘇のやうだ。花は黄色で風情^{ふうぜい}がある。子は椿の實のまだ開かぬもののや
うで房になる。多くの草に翹出するものだ。小翹は岡、原の上に生え、葉、花、實
いづれも大翹に似てゐるが、小さく細かだ。(山^{さん}南^{なん}地方ではいづれも用ゐるが、現
に長安では、ただ大翹の子のみを用ゐて莖、花をば用ゐない。

頤曰く、今は(五^ご津^{じん}京^{きやう}の附近、及び河中、江寧、潤、澠^{しん}、澤、兗^{けん}、鼎^{てい}、岳^{えつ}、利の
諸州、南康軍、いづれにもある。大、小二種あつて、大翹は下濕の地、或は山岡上
に生え、葉は青く狭く長く、榆葉^{ゆえふ}、水蘇などに似てゐる。莖は色赤くして高さ三四

村雨君共ニ連翹ニレ
 んげうチ充ツルハ誤
 デアルト斷言セラレ
 テ居ルハ、陶弘景ノ
 説ニ莖ト花實ト共ニ
 用キルトアルニ據ラ
 レタルモノナレドモ
 唐ノ蘇恭ノ説ニ大翹
 小翹ノ二種ヲ舉ゲ、
 宋ノ蘇頌モ大小ノ二
 種アル事ヲ云ヒ、大
 翹ノ方が效能ガ多イ
 事ヲ説イデ居リ、救
 荒本草ニモ木本ノ圖
 ガ連翹トシテ出デテ
 居レバ、強チ誤リト
 云フベキデハ無イト
 思フ、現在我邦漢方
 醫ノ處方ニ用キテ數
 果ヲ收ムルモノハ木
 本ノモノ、即れんげ
 うノ種子ヲ決シテお
 とざりさうデハ無イ
 藥材ハ效能ヲ本トス
 ベキモノデ、人命ニ
 關スルモノデアルカ
 ラ、大家ノ説ニ反對

尺、獨莖で梢の間に黄色の花を開く。秋蓬に似て内が房瓣になつた實を結ぶ。根は黄色で蒿根かうこんのやうだ。八月房を採る。小翹は岡、原の上に生え、花、葉、實いづれも大翹に似て細かい。南方の地に生ずるものは、葉は狭くして小さく、莖は短くし



〔翹 連〕

て高さ纔わづかに一二尺、花はやはり黄色だ。實の房は黄黑色で、内側に粟粒のやうな黒子を含む。また旱蓬とも呼び、南方では花、葉を用ゐる。現に南方の醫家の説に依ると、連翹には兩種あつて、一種は、まだ開かぬ椿實ちんじつに似て殻が小さく堅い。

外部は全く、跗萼ふかくがなく、剖けば中が裂開して甚だ芳馥だ。その實は纔に乾いたとき振れば皆落ちて、莖に著いてゐない。一種は、茵蒿いんこうのやうで殻が柔かく、外部に跗萼があつて抱いてゐるが、裂開線がなく、また香氣もない。久しく乾いても莖に著いてゐて落ちない。この點が甚だ異つてゐるといふ。現にこの種しゆのものは江南の下澤の間に極めて多い。椿實のやうなものは蜀中から來るのだが、藥用としては

江南のものより勝れてゐる。本草に據れば、やはり蜀中の者勝れりとしてあるが、しかしその莖、葉はまだ實見しない。

（二〇）氣味

【苦し、平にして毒なし】元素曰く、性は涼、味は苦、氣味俱に薄い。輕、清であつて、浮、升であり陽である。手で磨り揉んで用ゐる。好古曰く、陰中の陽であつて、手、足の少陽、手の陽明の經に入り、また手の少陰の經に入る。時珍曰く、微し苦く辛し。

主治

【寒熱鼠瘻、瘰癧、癰腫、惡瘡、癭瘤、結熱、蠱毒】〔本經〕【白蟲を去る】〔別錄〕【五淋、小便不通を通利し、心の病の客熱を除く】〔甄權〕【小腸を通じ、膿を排し、瘡癰を治し、痛を止め、月經を通ずる】〔大明〕【諸經の血結、氣聚を散じ、腫を消す】〔李杲〕【心の火を瀉し、脾、胃の濕熱を除く。中部の血證を治するにこれを使つとする】〔震亨〕【耳聾してコンコンジュンジュンたるを治す】〔好古〕

莖葉

主治

【心、肺の積熱】〔時珍〕

發明

元素曰く、連翹の効用に三種あつて、心の經の客熱を瀉するが一、上焦の諸熱を去るが二、瘡患者の聖藥として用ゐらるるが三である。

スル機ナレドモ敢テ一言ヲ挾ム次第デア
ル、紹興校定證類本
草卷ニ五種ノ連翹
ヲ採録セラレテアル
中澤州連翹ト記名アル
モノ、今日ノ木本
連翹ニ近クおとざり
さう、ともゑさうニ
似タルモノ見エザル
ハ不審ナリ。
（一）翹出ノ翹ハ秀テ
掲ルノ意ナリ。
（二）相竝ア翹ノ翹ハ
婦人ノ一種ノ髮飾チ
イフ。
（三）山南ハ漏盧ノ註
チ見ヨ。
（四）汴京ハ芳草類
黃汴都ノ註參照、河
中府ハ石部石中黃子
ノ註、江寧ハ芳草類
當歸ノ註、潤州ハ山
草類薺萐ノ註、淄州
ハ石部代赭石ノ註、
澤州ハ石部不灰木ノ
註、兗ハ石部雲母ノ

註、鼎州ハ山草類石
菴ノ註、利州ハ金部
鉛ノ註、南康軍ハ石
部隸石ノ註ヲ見ヨ。

(二) 岳州ハ隋ニ置ク
今ノ湖南省岳陽縣ハ
ソノ舊治ナリ。

(三) 附姜ハ果實ノ根
本ニアル附屬器。

(四) 薑ハ果實ノ中軸
ナラン。

(五) 蘭語ハ蓮花。

(六) 木村(康)曰ク、
れんげうノ葉ハフイ
リシ若クハ此ニ類似
ノ配糖體ヲ含有ス。

Eijkman: Rec.
1386(5) 127;

W. P. 550.

(一) 鼠粘子ハ牛蒡ノ
種子。

(二) 脂麻ハ胡麻ノ一
名。

(三) 唾液ハ顔ノ髮際
ヨリ少し上ニテ、目
ヨリ直上ニ中ル位
置。

呆曰く、十二經の瘡藥中には無くてならぬものだ。それは結するものを散ずるが
目的である。

好古曰く、手、足の少陽の藥である。瘡瘍、癰癭、結核を治するに神效があつて、
柴胡の功力と同様だが、ただ氣に對すると血に對するとの相異點で區別する。(一)鼠
粘子と共に用ゐて瘡瘍を治するに特殊な神效がある。

時珍曰く、連翹は、形狀が人の心臓に似て兩片合成し、その中に仁があつて甚だ
香しい。乃ち少陰、心の經、厥陰、包絡の氣分の主藥であつて、諸痛癢、瘡瘍はい
づれも心の火に屬する。故にこの藥は十二經の瘡の患者の聖藥なると同時に、手、
足の少陽、手の陽明の三經の氣分の熱を治す。

【附方】

舊一、新二。

【瘰癧、結核】連翹、(三)脂麻等分を末にして時時に食ふ。

(簡便方)

【頭上の馬刀瘡】少陽の經に屬する。連翹二斤、瞿麥一斤、大黃三兩、甘草

半兩を用ゐ、一兩づつを水一盃半で七分に煎じて食後に熱服し、十餘日後に臨

泣穴に二七壯灸する。六十日で必ず效がある。(張潔古活法機要) 【痔瘡腫痛】連翹の煎

湯で熏し洗ひ、後に綠礬を刀上で飛過して麝香を入れて貼る。(集驗方)

翹根

氣味

【甘し、寒、平にして小毒あり】 普曰く、神農、雷公は甘し、毒ありといひ、李當之は苦しといふ。好古曰く、苦し、寒なり。

主治

【熱氣を下し、陰精を益し、顔色を好くし、目を明かにする。久しく服すれば、身體を輕くし、老衰を防ぐ】（本經） 【これを蒸して酒病の人に飲ます】（別錄）

【傷寒の瘵熱で黃を發せんとするものを治す】（時珍）

發明

本經に曰く、翹根は（二）嵩高（一）の平澤に生ずる。二月、八月に採收する。

弘景曰く、醫方の藥には用ゐない。世間でも識らぬものだ。好古曰く、これは連翹の根であつて、能く熱氣を下すものだ。故に、張仲景は、傷寒の瘵熱の裏に在るものを治する麻黃連翹赤小豆湯にこれを用ゐ、その説明に「連翹の根だ」といつてある。

附方

新一。

【癰疽腫毒】 連翹の草、及び根各一升を、水一斗六升で煮汁三升を取つて服し、汗を取る。（外臺秘要）

（二）嵩高ハ石部五色石脂ノ註ヲ見ヨ。

(一) 牧野曰フ、次條ノ蒴藋ト同一物デア
ルコト集解ニ説イテ
アル。

(二) 熊耳ハ山名、今
ノ河南省盧氏縣ノ南
ト同宜陽縣ノ西、陝
西省商縣ノ西ニ在
リ。

(三) 宛句ハ山草類沙
參ノ註ヲ見ヨ。

大觀ニハ樹字接
骨ノ下ニアリ。

陸英 (本經下品)

釋名

解説は次項を見よ。

集解

別錄に曰く、陸英りくえいはくわんこう熊耳くわんこうの川谷、及びみんこう宛句みんこうに生ずる。立秋に採收

する。

恭曰く、これは蒴藋のことだ。古方には蒴藋とはなく、ただ陸英といつてある。



〔蒴 蒴 英 陸〕

後世一般人は、それを識らずして漫然と更に蒴藋なる一條を設けたのだ。この草の葉は芹きん、及び接骨花せつこくに似たもので、その三植物はやはり同一類のものだ。故に芹をば水英と呼び、この草をば陸英と呼び、接骨をば木英もくえい、樹じゆと呼ぶのであつて、この三種の英なる植物は、

和名 そくづ
學名 *Sambucus chinensis*, Lirall.
科名 すひかつら科(忍冬科)

花、葉いづれも相似てゐる。

志曰く、蘇恭は、陸英、薺を一物だといつてゐるが、今詳細に研究して見るに、陸英は、味が苦く、寒にして毒がない。薺は、味が酸く、温にして毒がある。かやうに同一ならぬ點がある以上、同一種とはいひ難いが、蓋しその類のものには相違ない。

宗奭曰く、薺と陸英とは、性も味も産地もすべて同一でない。治療上の效力も異ふ。全然異なる二植物なることに斷じて疑ひ無い。

(五) 今字大觀ニ據リ
補入ス。

頌曰く、本草には、陸英の條に『熊耳の川谷、及び冤句に生ずる』とあり、薺の條には生産する地方を記載してない。今は田野に生じ、所在にあつて、春苗が抽出で、莖に節があり、節の間から枝が生え、葉は水芹によく似たものだ。春、夏葉を採り、秋、冬根、莖を採る。陶氏、蘇氏は、いづれも同一物といひ、馬志は、性、味の不同を理由として同一種であるまいと疑つてゐるが、やはり精細なる辨別は付いてゐない。但し、爾雅に『木はこれを華と謂ひ、草はこれを榮と謂ふ。榮せずして實るを秀と謂ひ、榮して實らざるを英と謂ふ』とある。この物には英なる名稱がある以上、當然花を指すものでなければならぬ。故に本經にも『立秋に採る』

とあつて、正にこの物の開花期を指してゐる。

時珍曰く、陶氏、蘇氏の本草、甄權けんの藥性論は、いづれも『陸英、即ち蒹藿』といつてある。これには必ず根據があるものと思はれる。馬志、寇宗奭はその説を論破したものの、的確な根據があるわけでない。やはりこれは同一物とすべきであらう。根、莖、花、葉を區別して用ゐることは蘇頌のいつた通りである。

氣味

【苦し、寒にして毒なし】權曰く、陸英、一名蒹藿。味苦く辛し、小

毒あり。

主治

【骨間の諸痺、四肢の拘攣こうれん、疹酸、膝の寒痛、陰痿いんゐ、短氣、不足、

脚腫（本經）】

【よく風毒を將す。脚氣上衝の心煩、悶絶、水氣虚腫、風瘙、皮膚の

惡痒あくやうには、湯に煎じ、少量の酒を入れて浴するが妙である】（甄權）

（六）金陵本持ニ作ル。

蒹藿

音は（二）朝弔（サク）（別錄下品）
テウ）である。

和名 そくづ

學名 *Sambucus chinensis*, Thunb.
科名 すひかづら科（忍冬科）

釋名

葦草（別錄） 葦（別錄） 接骨草

集解

別錄に曰く、蒹藿は田野に生ずる。春、夏葉を採り、秋、冬莖、根を

（二）牧野曰フ、性性
野外ニ見ル宿根ノ大
草木ヲアル、其地下
莖ヲ採テ民間藥ニ供
スルコトガザル、そ
レノ名ハ蒹藿ノ字
音カラ來タモノデア
ルガ又クさたづ或ハ

くさにはとこの名がアル、昔ハつちひとがたと稱シタ。

(二) 音朔弔トアル弔ハ卓デハナキカ、藿ニハテウノ音モアルガ、ダクノ音モアル。

康熙字典ニハ「又直角切音濯藿藥草」トアル。音テウノ時ハ別ノ意味ノヤウナリ。又、本草綱目以

原本ニハ「音朔草」トアリ、弔ニハナツテ居ナイ。又和名鈔ニハ「蘇敬注云藿藿。朔濁二音此間音尙久止久」トアリ。此處ニハタクトスル方宜シキヤウニ思ハル。

(牧野) 譯者曰ク、段注說文ニハ「藿壘艸也从艸翟聲。徒弔切」トアリ。支那ノ近代音ニテモ、辭源藿ノ註ニ「葎切音調藿頭」ト

採る。弘景曰く、田野、村落に甚だ多い。

恭曰く、この草は陸英のことであつて、この一條は餘分なものだ。爾雅に「葎は葎草なり」とあり、郭璞の注に『烏頭の苗だ』とある。三種の葎の別名を調べて見てもこの草はない。別録にこの草を一名葎草としてあるが、出處が判らない。

宗奭曰く、藿藿は、花は白く、子は初は青くして緑豆の類のやうだ。毎朵の大きさは蓋の面ほどある。また大抵は一二百粒の子を有つもので、十月になれば熟して紅くなる。

時珍曰く、枝毎に五枚の葉がある。解説は陸英の條を参照せよ。

氣味

【酸し、溫にして毒あり】大明曰く、苦し、涼にして毒なし。

主治

【風癢癰瘡、身癢濕痺。湯にして浴するがよし】(別錄) 【癰癰、風痺を浴す】(大明)

附方

舊十二、新七。【手、足の偏風】藿藿の葉を火で燎いて牀の上へ厚く鋪

き、熱い處へ横臥して眠り、冷えればまた換へる。冬期には根を取つて舂き碎き、熬り熱して用ゐる。(外臺秘要)

【風濕冷痺】方は上に同じ。【寒濕腰痛】方は上に同じ。【脚氣脛腫】骨の疼くには、藿藿根を研り碎き、酒、醋共に三分を和し、根

アレバ、テウト發音
シツツアルモノノ如
シ。康熙字典ニ博雅
ヲ引イテ「音濯藥草」
トアリ、濯モ支那ノ
近代音ニテハヤハ濁
ツテテウト發音ス。
又、豆字、頭字ノ如
キモ、吾邦ニテハト
ウ、テウ、ヱト轉ジ
ツツアレバ、此草ノ
和名モくづモ或ハテ
ウノ發音ヲ轉セルモ
ノニハ非ズヤトモ想
像セラル。

(一) 藕ハ膿藥膏。

(二) 一分ノ文字大觀
本草ニ據ル。

(三) 草子ハ草木、長
サ一寸五分位。

(四) 大觀ニ黃ニ作ル。

(五) 大觀ニ連用ヲ連
用ニ作ル。

一分を下して蒸熟し、腫れた部分を封裏すれば一兩日で消す。また不仁をも治癒す
る。(千金方) 【全身の水腫】坐臥し得ぬには、蒴藿根を取り、皮を去つて搗き、汁一合
に酒一合を和して煖服する。微し吐き下すものだ。(梅師方) 【頭風の痛み】蒴藿根二
升を酒二升で煮て服す。汗が出て止まる。(千金方) 【頭風旋運】時嫌はず起ち眩みす
るには、蒴藿、獨活、白石膏各一兩、枳實を炒つて七錢半を用ゐ、三錢づつを酒一盞
で六分に煎じて服す。(聖惠方) 【産後の血運】心悶、煩熱するには、接骨草、即ち蒴
藿を(五)算子ほどに打ち碎き、一握を水一升で半升到煎じて二回に分服する。或は小
便出血する者もこれを服すれば瘥える。(衛生易簡方) 【産後の惡露】下り盡きぬには、
續骨木二十兩を剉み、水一斗で三升到煮て三回に分服すれば直ちに下る。(千金方)
【瘡疾の止まぬもの】蒴藿一大握を(六)赤色になるまで炙つて水で濃く煎じ、發作せ
んとする直前に一盞を服す。(斗門方) 【突然の暴しき瘡塊】石のやうに堅く、死せん
とする痛みには、蒴藿根一小束を洗淨して細かに擘き、酒二升到三晝夜漬け、一日三
回、五合乃至一升を溫服する。若し(七)引き續いて服用するには、熱灰中で温めて藥
味を出して服す。この方は毒がない。已に十六人に用ゐて治效を擧げ、神驗を得た。

藥を服し盡したときは再び作つて用ゐる。(古今錄驗) 【堅硬なる鼈瘕】盆のやうに腫起して臥寢し得ぬには、蒴藿根白皮一握の搗汁を水に和して服す (千金方) 【下部の閉塞】蒴藿根一把の搗汁に水を和し、絞つて滓を去り、壯年者は一升づつを服す。(外臺祕要) 【一切の風癰】蒴藿を煮た湯に少量の酒を入れて塗る。瘰癧ぬものなし。(梅師方) 【小兒の赤遊】上部、下部に遊動し、心臓に至れば死亡する。蒴藿の煎汁で洗ふ。(子母秘錄) 【五色丹毒】蒴藿葉を搗いて傅ける。(千金方) 【癰腫惡肉】消せぬには、蒴藿灰、石灰の各淋汁を取り、膏のやうに合煎して傅ける。能く惡肉を蝕し、また瘰癧も取れる。この藥は十日以上用ゐる必要がない。(千金方) 【手足の疣目】蒴藿の赤子を揉み爛らして疣目の上に塗る。(〇〇(聖惠方) 【熊羆の傷】蒴藿一把を水一升に漬け、少時して汁を取つて飲み、滓で傷を封ずる。(張文仲備急方)

(心) 赤字大觀ニヨリテ補入。
(〇) 大觀ニ張文仲ニ作ル。

(一) 牧野曰フ、水英ハ何ノ草カ分ラズ、然シ織形科ノゼリ (Oenanthe strictifera DC.) テクナイ、或ハ唇形科ノみづにこるな (Dysophylla

水 英 (宋圖經)

和名無し
學名未詳
科名未詳

釋 名

魚津草 頤曰く、唐の天寶單方圖に『この草は、もと永陽の池澤、

verticillata, Benth.)

テモナカラウカト
々々空想スルバカリ
テ、少シモ形状が書
イテナイカラ見當が
付カヌ。

(一) 永陽ハ唐ニハ今
ノ安徽省滁州市來安
縣ニ治ス。

(二) 臨汝ハ唐ノ郡、
汝州ニ屬ス。今ノ河
南省臨汝縣ノ舊治
ナリ。

(三) 信都ハ石部石瞻
ノ註ヲ見ヨ。

(四) 河内ハ菊ノ註ヲ
見ヨ。

(五) 内黄ハ漢ノ縣、
今ノ河南省内黄縣ノ
地ナリ。

(六) 劍南ハ芳草類牡
丹ノ註ヲ見ヨ。

(七) 遂寧ハ漢ノ縣、
晉ノ郡、宋ノ時、今ノ
四川省遂寧府遂寧縣
ノ南ニ故城アリ。

及び河、海の邊に生えてゐたものだ』とある。(三) 臨汝地方では牛薺草と呼び、河北、

(四) 信都地方では水節と名け、(五) 河内から(六) 内黄附近までの地方では水棘と呼び、(七)

劍南、(八) 遂寧等の郡では龍移草と名け、淮南の諸郡では海荏と名ける。嶺南にもあ

つて、土地が就中適して居ると見えて莖、葉

が大きく肥える。この地方では海精木とも、

また魚津草とも名ける。

時珍曰く、この草に就ては、形状、氣味の

記載がないので、考證すべきものがない。芹

菜もやはり水荑と呼ぶが、果してこの草のこ

となりや否や判然せぬ。



水

〔英

氣味

(缺)

主治

〔骨風〕〔蘇頌〕

發明

頌曰く、蜀地方では、その花を採つて、ろくに合せる。凡そ男子、

婦人が故なくして兩脚腫滿し、膝、脛の中に連つて痛み、屈伸につり強ばるは骨風

と名けるものだ。その疾は、針灸、及び服藥は宜しくない。ただ毎日この草五斤を

(九) 粉ハ米粉ナラン。

取り、水一石で三斗に煮取つて熱して浸し、并に膝上に淋そそぐ。一晝夜三四回試れば五日を過ぎずして瘡える。數々實驗して神效があつた。この藥は、春は苗を取り、夏は葉、及び花を採り、冬は根を用ゐる。腫の甚しきには、生椒目せいしょうもく三升、水二斗を加へ、用ゐ畢つたとき(九)粉を擦り付けて風に當らぬやうにする。油膩あし、生菜、猪、魚等の物を忌む。

(一) 藍

(本經上品)

和名 あ ぬ
學名 Polygonum tinctorium, Lour.
科名 たゞ科(蓼科)

釋名

時珍曰く、按ずるに、陸佃りくでんの埤雅に『月令に「仲夏は、民をして藍を刈つて以て染むることなからしむ」とあり、鄭玄は「恐らく長養の氣を傷ふからだ」といつてある。これで見ると、藍を刈ることに就いて、上古の統治者は禁制を設けてあつたものだ。文字を監に従ふて書くはその故だ』とある。

集解

別錄に曰く、藍實らんじつは河内の平澤に生ずる。その莖、葉は物を青色に染め得る。弘景曰く、この草は現に絲を紺、碧色に染める染料にしてゐるもので、尖

(一) 牧野曰フ、あゐハ即チ蓼藍デ我邦ニハ野生ハナク往時支那カラ渡シタモノデアアル、世人ノ知ルヤウニ其葉カラあゐヲ採ル爲メニ栽培セララル、葉ニ長ガ形ノモノト圓ル形ノモノトガアル。

(三) 牧野曰フ、下ノ
 恭ノ云フ木藍ハ其葉
 ノ徑カ二寸ホドテ厚
 サカ三四分アルトイ
 フ、昨珍ハ此レハ馬
 藍デアツテ木藍デハ
 ナイト云ツテ居ル、
 此時珍ノ云フ木藍ハ
 即チまめ科(豇科)ノ
Indigofera tinctoria
L. ヲ一ニ槐葉藍
 ト云ヒ和名チキアハ
 又ハまめアハト稱ス
 カ、我邦ニ多キコマ
 シナギ(*I. pseudo-ti-*
nectria, *Mitsum.*)
 ハ之レニ似テ全ク別
 種ニ屬シ此モノヨリ
 ハあハカ取レヌ。
 (三) 不堪ノ二字大觀
 ニヨル。



〔藍 蓼〕



〔藍 馬 葉 大〕

葉のものが勝れてゐる。

恭曰く、藍に三種あつて、一種は、葉が圓く、徑二寸ほど、厚さ三四分、染料となる。

嶺南に産し、太常では木藍子と呼んで取扱ふ。陶氏所説のものは菴藍のことで、その汁を沈澱し、錠にしたものは甚だ青いものだ。

本經の所用するところのものは蓼藍の實のことで、苗は蓼に似て味は辛くなく、澱を取るに不堪へない。ただ碧色に染まるだけだ。

頌曰く、藍は處處にある。民家では蔬圃に畦を作つて種ゑるが、三月、四月になると苗が生える。高さ二三尺ばかり、葉は水蓼に似て花は紅白色、實はやはり蓼の子のやうだが、色が非常に黒い。五月、六月に實を採る。但しこれは碧色を染め得るだけで、澱錠には

(四)大觀ニ福ニ作ル。



〔藍吳葉蒿〕

があつて、これは馬藍ともいふ。爾雅に所謂『しん茂は馬藍なり』とあるがこの草だ。また(魯)揚州の一種の馬藍は、四季を通じて葉があり、苦くはいさい賣菜に類するものだ。土地の人民は、敗血



〔藍木葉桃〕

を治するにこの草を根のまま採つて服する。江寧の一種の吳藍なる草は、二月の内に生えて蒿のやうなものだ。葉は青く花が白い。やはり熱毒を解す。この二種は、類似さへ點はないが俱に藍なる名稱がある。且つ、古方に多く吳藍を用ゐるとあるは、或はこの草を指すのではあるまいかと思ふ。故に并に附記して置く。

宗奭曰く、藍實とは大藍の實のことだ。これを蓼藍だといふは事實と違ふ。乃ち爾雅に所謂『馬藍』なるもので、諸藥毒を解するに缺く可からざるものだ。實、葉、

(五)牧野曰フ、菘藍
 へたいせい(原ト江
 南大青ト稱シテ支那
 カラ渡シタ名ニ基イ
 タモノト思フ)即チ
 十字科ノ *Isatis ob-*
longata DC. (或ハ
I. indigotica, For-
 tune. カ)チアル、時
 珍ガ菘藍、馬藍チ二
 物トセルチ小野蘭山
 ハ其レハ非デ、之レ
 ハ蘇頌ノ説ニ從ヒ一
 物ト爲スベシト唱ヘ
 テ居ルガ、救荒本草
 ニモサウ出テ居ル、
 吳藍ハ果シテきつね
 のまこ科(爵床科)ノ
 りうきゅうあ(*Stro-*
bilanthus flacellif-
eris, Kries.) カ判然
 ト分ラヌ、此りき
 うあぬノ花ハ紫色デ
 ヤウカラ集解ノ文ノ

兩^{ふたつ}ながら用ゐる。註に、實の説明だけあつて葉の説明のないのは不十分だ。

時珍曰く、藍に凡そ五種あつて、各、主治に特長があるが、ただ藍實といへば特
 に蓼藍に限るのだ。蓼藍は、葉が蓼のやうで、五六月に穂になつた細かい浅紅色の花
 を開く、子も蓼のやうだ。一年に三回刈り取れる。故に上古の統治者はそれに制限を
 設けたのだ。(五)菘藍は、葉が白菘^{はくそう}のやうだ。馬藍は、葉が苦賣^{くまい}のやうだ。即ち郭璞
 の所謂、大葉の冬藍であつて、俗に所謂、板藍と呼ぶものだ。この菘藍、馬藍の二
 者は、花も子も共に蓼藍のやうである。吳藍は、莖長く、蒿^{こう}のやうで、花は白い。
 吳の地方で栽培する。木藍は、莖長く、決明のやうで、高いものは三四尺になり、
 枝が分れて葉が廣がり、その葉は槐^{かい}葉^{えい}のやうだ。七月淡紅色の花を開いて角^{さく}を結ぶ。
 その角は長さ一寸ばかり、累累として小豆の角のやうだ。子はやはり馬蹄決明子の
 やうだが微し小さい。前記四種の藍とは形狀に於いて遙かに異なるが、澱^{でん}錠^{じやう}になる點
 は同一だ。この外、甘藍といふ食し得る草があるが、それは別に一條を掲げてある。
 蘇恭は、馬藍を木藍といひ、蘇頌は、菘藍を馬藍といひ、宗奭は、藍實を大葉藍の
 實だといつてあるが、いづれも誤だ。左にそれぞれ列記する。

白色トハ合ハヌ、植物名實圖考卷ノ十一ノ藍ノ處ニリウキウあゐノ圖が出テ居ルが單ニ藍ノ二トアルノミテ特名が署シデナイ、松村任三博士ノ改訂植物名彙、前編ニリウキウあゐチ馬藍トシテアルノハ穩當デナイ。

(六) 蚊ハ蟲豸ノ通稱ナレドモ下註ニ據レバ小兒ノ鬼チ云フモノナリ。

(七) 木村(廉)曰ク、全草申インザカンチ含有ス、インザカンチハ加水分解ニヨリテ葡萄糖トインドキシルチ生ズ、インドキシルハ空氣ニヨリ酸化サレテインザチチ生ズ。

N. S. D. 888; W. P. 176; Ber. Ch. Ges. 1870(23) 231. T. C.

藍實

氣味

【苦し、寒にして毒なし】權曰く、甘し。主治 【諸毒を解

し、蠱、^(六)蚊、^(六)疰鬼、^(六)螫毒を殺す。久しく服すれば、頭髮が白くならず、身體を輕

くする】^(本經)蚊は其(キ)と發音する。小兒の鬼である。【骨髓を填充し、耳、目を

明かにし、五臓を利し、六腑を調へ、關節を通じ、經絡中の結氣を治し、人體を壯

健にし、睡眠を少くし、心力を益す】^(靈樞)【毒腫を療ず】^(蘇恭)

藍葉汁

これは蓼藍である。

氣味

【苦く甘し、寒にして毒なし】主治

【あらゆる藥の毒を殺し、狼毒、射罔の毒を解す】^(別錄)弘景曰く、解毒として、生

藍の汁がない場合には、青染の絲や布を漬けた汁を用ゐても善し。【汁を五心に塗

れば、煩悶を止め、蜂の螫毒を療ず】^(弘景)【斑蝥、^(七)芫青、^(七)樗雞の毒、朱砂、砒石の

毒】^(時珍)

馬藍

主治

【婦人の敗血には、根付きのまま焙じ搗いて下篩し、酒で一錢ヒ

を服す】^(蘇恭)

吳藍

氣味

【苦く甘し、冷にして毒なし】主治 【寒熱頭痛、赤眼、天

行熱狂、^(八)疔瘡、遊風、熱毒、腫毒、風癰、^(八)煩を除き、渴を止め、疳を殺し、毒藥、

毒箭、金瘡、血悶、毒刺、蟲蛇の咬傷、鼻衄、吐血を解し、膿を排す。産後の血運、小兒の壯熱。金石藥の毒、狼毒、射罔の毒を解す】(大明)

發明

震亨曰く、藍は水に屬し、能く敗血をして經絡に分歸せしめる。

時珍曰く、諸種の藍は、形狀に相異はあるが、性、味は遠からぬものだ。故にいづれも能く毒を解し、熱を除く。ただ木藍だけは力が少し劣るやうだ。藍子といふときは専ら蓼藍を用ゐる。澱錠や青布を用ゐることだが、これは藍を刈取つて水に浸し、石灰を入れて澄まして成つたものだから、性、味に多少の相異あるを免れぬので、藍汁と一樣に論ずるわけには行かぬのである。ある者が嘔吐を病んで、玉壺等諸種の丸藥を服して效がなかつたとき、藍汁を用ゐて口に入ると直ちに定つたことがある。これはやはり、この草の蟲を殺し、火を降す力の應用だ。かやうな事柄も心得て置くべきことである。

(八) 蟲豸ハ昆蟲。

頤曰く、藍汁は蟲豸の傷を治す。劉禹錫の傳信方に、その法を記述して『大藍汁一盞を取り、雄黃、麝香の二物少量を入れ、咬傷の患部へ點け、同時にその汁を少しづつ服す。その效驗神異の極である。張薦員外が劍南に在つて、張延賞の部下

(九)大觀ニ項ニ作ル。

(一〇)相字大觀ニ據ル
即チ延賞ヲ指ス。

に判官を勤めてゐた頃、突然斑蜘蛛（ま）に頭上を咬まれ、一夜にして咬まれた處へ細い箸ほどの赤筋が二筋現はれ、（一）頂部を繞つて胸前から心の經まで波及し、二日經つと頭部、面部が腫れ疼き、數升入れる盥のやうに腫大して漸次に肚まで腫れ、殆ど絶望の狀態に陥つた。その時張延賞は錢五百千を出し、薦の家からも錢數百千を提供して、治療を能くするものを懸賞で募集すると、必ず治療するといふものが一人應募した。しかし張（二）相は甚だ信賴しかねたので、その方を試問しようとする、その人物は『方は諸記してゐない。ただ人間の生命を救療するだけだ』といつて、やがて大藍汁一盥を取つて蜘蛛をそれに投げ込むと、汁につかると直ちに死んだ。又、藍汁に麝香、雄黃を加へて一匹の蜘蛛をそれに投げ込むと、汁に浸る部分から次第に溶けて水になつた。これを目の當り見た張相は大いに驚嘆して、それを咬傷の患部に點けさせると、二日にして悉く平安になり、小さい瘡になつて全癒した』とある。

附 方

舊十一、新六。

【小兒の赤痢】青藍の搗汁二升を四回に分服する。（子母秘

錄）【小兒の中蠱】（ちうこ）下血して死せんとするには、青藍の搗汁を頻りに服す。（聖惠方）

（二）欬脈白睛ノ上ニ
生ズ、之ヲ飛血ト云
フ。

（三）大觀ニ升ヲ斤ニ
作ル。

【陰陽易病】傷寒の癒えた直後に房事を行ふと、必ず陰陽の病となり、手、足、拳が拘急し、小腹が急熱し、頭が舉らなくなる。これは陰陽易と名ける。手當としては發汗せしむべきものだ。發病後滿四日經過すれば治療の方法がない。藍一把、雄鼠屎二十一箇を水で煎じて服し、汗を取る。（聖惠方）【驚癇の發熱】乾藍、凝水石等分を末にし、水で調へて頭上に傅ける。（聖惠方）【上氣欬嗽】呼吸毎に喉中に音があり、唾液の粘るには、藍葉を水に浸して搗いた汁一升を空腹に頻りに服し、少頃して杏仁の研汁で煮た粥を食ふ。かくて一兩日經過を見て、更に前記の方法で再服する。痰を吐き盡せば瘥える。（梅師方）【飛血赤目】熱痛するには、乾藍葉を切つて二升、車前草半兩、淡竹葉を切つて三握、水四升を二升到煎じて滓を去り、溫めて洗ふ。冷えれば再び煖めて洗ひ、瘥えるを度とする。（聖濟總錄）【腹中の鼈瘕】藍葉一（二）升を搗き、水三升を入れて絞り、その汁一升を一日二回に服す。（千金方）【應聲蟲病】腹中に物があつて、人が物言ふ毎にそれに隨つて聲を出す。これを應聲蟲病と名ける。板藍汁一盞を五回に分服すれば效がある。（夏子益奇疾方）【突然の水の中毒】藍を搗いた青汁を頭部、身體の全面に傅ける。（肘後方）【過量の服藥】煩悶する

〔三〕大靛ニ唇邊ヲ背
上ニ作ル。

〔四〕糞藍ハ藍葉ヲ搗
キタル滓ノコトナラ
シ。
〔五〕天泡瘡ハ俗ニと
びヒト云フモノ。

もの、及び中毒で煩悶し、死せんとするには、藍の搗汁數升を服す。(肘後方) 【縊死
自殺者】藍汁を灌ぎ込む。(千金方) 【毒箭の負傷】藍青を搗いて飲み、并に傳ける。
藍のないときは青布を漬けた汁を飲む。(肘後方) 【〔三〕唇邊の瘡】連年瘡えぬには、八
月の藍葉一斤の搗汁で洗ふ。三回以内で瘡える。(千金方) 【齒齲腫痛】一日五回、紫
藍の焼灰を傳ける。(聖惠方) 【白頭禿瘡】〔四〕糞藍の煎汁で頻りに洗ふ。(聖濟錄) 【〔三〕天
泡熱瘡】藍葉を搗いて傳けるが良し。(集簡方) 【瘡疹で不快なるもの】板藍根一兩、
甘草一分を末にし、毎服半錢、或は一錢を雄雞冠血二三滴入れた溫酒少量で調へて
服す。(錢氏小兒方)

藍 澱 (綱 目)

和名 あめのおり
英名 Indigo.

釋 名

時珍曰く、澱とは殿の義であつて、藍の滓を澄ませて下に沈澱したも
のだ。淀おやうとも書き、俗に靛せやうとも書く。南方地方では、地に坑を掘つて藍を入れ、一
夜水に浸して石灰を入れ、千回攪かき廻まはしてそれを澄し、水を去つて作る。かくすれ
ば青黒色に沈澱するのであつて、やはり乾し取收めて青碧色を染める染料になる。

(一) 木村康口ク、
インデゴ。

Sh. 318. 藥誌、明、一
八(三九)二〇三
N. S. D. 838.

その攪き廻す際に起つ浮沫を掠め出し、それを陰乾したものを酸苦といふ。即ち青黛である。下に説明する。

(二) 氣味

【辛く苦し、寒にして毒なし】

主治

【諸毒を解す。熱瘡、小兒

の禿瘡、熱腫に傳ける】
【瘰癧】
【血を止め、蟲を殺し、噎膈を治す】
【時珍】

發明

時珍曰く、澱は藍と石灰とで作成するもので、氣味は藍と稍同じからぬ

點があつて、血を止め、毒を抜き、蟲を殺す功力は藍に勝る。按ずるに、廣五行記に『唐の永徽年間、絳州のある僧侶が噎を病み、食物が喉を通らず、數年にして死亡した。その臨終に、徒弟を喚んで「死んだ後でこの喉、胸を切開し、何物がかやうに此の身を苦しめたかを確めてくれ」と遺言したので、死後、徒弟は遺言に違つてその胸中を切開して見た。すると果して一箇の物を發見した。その物は形が魚のやうで、頭が二箇あり、全體悉く肉鱗のやうに見え、鉢に入れて置くと絶えず跳ね躍る。戯れに様様の食物を投げ與へると、果してその物を食ふとも見えぬが、しかし皆溶けて水になつた。また種種の毒物を投げ入れても、やはり同様に銷化して了ふ」ところがある時、僧侶達が藍澱の作製を始め、あり合す澱を少しばかりそ

の鉢の内へ投げ込むと、蟲は忽ち怖れ惑えて逃げ廻り、須臾にして溶けて水になつた。世間に、澱水は噎疾を治すと言ひ傳へてあるが、蓋し此に起因するのだ」とある。現に方士達が、染料甕の水を飲ませて噎膈を治するといふも、やはり殺蟲の功力を取るのである。

【附方】

新開

【時行熱毒】心神煩躁するには、藍澱一匙を新汲水一盞で服す。

(聖惠方)

【小兒の熱丹】藍澱を傳ける。(〇〇〇秘錄方)【口、鼻の急疳】數日續いて死せん

とするには、日中十回、夜間四回、藍澱を全面に傳ける。(千金翼)

【誤つて水蛭を吞

みたるとき】青靨を水で調へて飲めば瀉出する。(普濟方)

青 黛 (宋開寶)

和名 あめらふ(藍靨)
英名 blue cosmetic for painting the eyebrows.

【釋名】

靨花綱目

青蛤粉

時珍曰く、黛とは眉の色のことだ。劉熙の釋名

に『眉毛を剃り去つてこの物で代へる。故に之を黛といふ』とある。

【集解】

志曰く、青黛は波斯國から輸入する。今は(〇〇〇太原、并に(〇〇〇廬陵、南康

等の地方の藍甕の沫の紫碧色なるものを用ゐるが、青黛と功力は同一だ。

(〇〇〇太原ハ今ノ山西
省太原ノ地ナリ。
(〇〇〇廬陵ハ漢ノ縣、
三國ノ郡、舊治ハ今
ノ江西省吉水縣東ニ
在リ。南康ハ石都縣
石ノ註ヲ見ヨ。

(〇〇〇大觀ニ秘錄ノ上
ニ子母ノ二字アリ。

時珍曰く、波斯の青黛といふも、やはり外國の藍龍花のことで、この物が手に入らぬときは中國の靛花を用ゐてもよい。或は已むを得ぬ場合は青布を浸した汁を代用する。商品には乾澱を青黛としてあるが、しかしそれには石灰が入つてゐるから、服餌の藥中に入れるには、詳細の吟味を要する。

氣味

【鹹し、寒にして毒なし】 權曰く、甘し、平なり。

主治

【諸藥

の毒を解す。小兒の諸熱、驚癇發熱、天行の頭痛寒熱には、いづれも研つて服す。

また磨つて熱瘡、惡腫、金瘡、下血、蛇、犬等の毒にも傅ける】（開寶）【小兒の疳熱

を解し、蟲を殺す】（甄權）【小兒の丹熱には、水に和して服す。雞子白、大黃末と共に

瘡癰、蛇、虺の蝮毒に傅ける】（藏器）【肝を瀉し、五臟の鬱火を散じ、熱を解し、

食物の停滯を消化する】（雲亨）【熱煩、吐血、咯血、斑瘡、陰瘡を去り、惡蟲を殺

す】（時珍）

發明

宗奭曰く、青黛なるものは藍で作るものだ。ある一婦人患者は、臍下

から腹の上が（三）熱し、下の方陰部から肛門まで一面に（四）馬瓜瘡のやうな形狀の濕瘡

が生じ、他の部分はずべて痒くはないが痛み、大、小便が澀つて黃汁を出し、食慾

（三）熱字大觀ニヨリ
（四）馬瓜瘡詳カデナ
イ。

(五) 發風ノ食物トハ
風毒腫物ヲ生ゼシメ
ル食物。

(六) 心口ハ胃ノ口邊
ノ事カ。

が減退して身體、面部が微し腫れた、醫師はこれを惡瘡として治療し、鰻鱺魚、松脂、黃丹などの藥を塗つたが、熱痛は更に甚しくなつた。そこで患者に平生の嗜好を訊ねると、酒も飲み、好んで魚、蟹、魚發風等の物を食つたといふ。そこで急にそれ迄用ゐてゐた膏藥を洗ひ落させ、馬齒莧四兩を杵き爛らした中へ青黛一兩を入れ、再び研勻して塗つて見ると、熱は即時に減じ、痛痒は悉く去つた。そこで八正散を一日三回服ませて客熱を分散せしめ、藥が乾けばまか塗り換へさせて二日間繼續すると、病は三分の一を減じ、五日にして三分の二を減じ、二十日にて平癒した。これは蓋し中、下焦に風熱の毒氣を蓄へたものであつて、若しこれを外に排出せねば、當然腸癰、ちゆうおういゆう内痔となるものだ。そこで患者には酒色、發風の物を禁ずるやうに注意したが、しかしその禁を守れなかつたので、後に果して内痔を患つた。

【附 方】

舊六、新七。

【心口の熱痛】薑汁で青黛一錢を調へて服す。(醫學正傳)

【内熱吐血】青黛二錢を新汲水で服す。(聖惠方) 【肺熱咯血】青餅子——青黛一兩、杏

仁を牡蠣粉を用ゐて炒つて一兩を研りませ、黃蠟に溶和して三十箇の餅にし、一日三回、この餅一箇を、乾柿半箇に挟んで濕紙に堅く裹み、香しく煨いて嚼み、粥飲

（七）癰ハ不隨ノコト。

（八）大瀝ニ可キ欲ニ作ル。

（九）大瀝ニ豌豆拵ノ上ニ傷寒熱ノ三字アリ、萬字ナシ。

（一〇）大瀝ニ一束ヲ大瀝ニ作ル。

（一一）乾野田フ、我部ノ本草家集翹ヲ以テ

たて科（翹科）ノうな

ぎづる即チうなぎつ

かみ（Polygonum
sibiricum, Meisn.）

ニ充ツレドモ、私ハ
今之ニ同スルニ

で服す。（華佗中藏經）【小兒の驚癇】年齢、體格の大小に應じ、青黛を水で研つて服

す。（生生編）【小兒の夜啼】方は上に同じ。【小兒の疳痢】宮氣方の歌に『孩兒の雜

病變じて疳と成るは、強、羸と女、男とを問はず、煩熱して毛焦れ鼻口燥き、皮膚

枯槁して四肢癱し、腹中時時に更に下痢し、青、黄、赤、白一般般にして、眼還

り而黄に鼻孔赤く、穀道は開張して看る可からず、此の方は便ち是れ青黛散、孩

兒の百病は之を服すれば安し』とある。【汁の出る耳疳】青黛と黄蘗の末を乾かし

て搽る。（談楚翁方）【爛弦風眼】青黛、黄連を湯に漬けて日毎に洗ふ。（明目方）【産後

の發狂】四物湯に青黛を加へ、水で煎じて服す。（摘玄）【傷寒赤斑】青黛二錢を水で

研つて服す。（活人書）【豌豆拵毒】まだ化膿せぬには、波斯青黛（一）一束ばかりを水

で研つて服す。（梅師方）【療瘰のまだ孔の明かぬもの】訶花、馬齒莧を共に搗き、日

毎に塗傳して效を取る。（簡便方）【諸毒蟲の螫傷】青黛、雄黄等分を研末し、新汲水

で二錢を服す。（古今錄驗）

附 錄

（一）雀翹 別錄

有名未用に曰く、味鹹し。氣を益し、目を明にする。

藍の中に生ずるもので、葉は細くして黄色、莖は赤くして刺がある。四月黄色で鏡

躊躇スル。

(一)牧野曰フ、此ノ甘藍ハ其種ノ中ノ一變種ナル Var. acephala, DC. ナ指シタモノデアラウ、即チ今日普通ニ見ル結球ノモノ (Var. capitata, L.) となん(デハナイ、植物名實圖考卷ノ四ニ甘藍トシテ圖スルモノハ別ノ植物デ、恐ラク本書ニアル甘藍ヨリ後ニ世ニ明ニナツタモノデアラウト思フ、其狀酷ダかぶらにはぼたん即チ Var. caulobata, DC. ニ似テ居ル、今日支那でかぶ様ノ肉質ノ根チたうがらし粉チ加ヘテ鹽藏シ食料ニ供スル一品ハ或ハ此圖ノ品デハナイカト思ハレル。

く中の黒い實を結ぶ。五月に採つて陰乾する。一名去母、一名更生といふ。

甘 藍 (拾 遺)

和名 はぼたん
學名 Brassica oleracea, L.
科名 十字科(十字科)

校 正 菜部より此に移し入る。

釋 名 藍菜(千金)

集 解

藏器曰く、この草は西方の國の藍である。葉が闊いもので、食料になる。



甘 藍

時珍曰く、この草もやはり大葉冬藍の類のものだ。按ずるに、胡治居士は『河東、隴西、羌、胡の地方では、多く栽培してこれを食ふ。漢地には稀だ。その葉は長大で厚く、煮て食へば甘美なものだ。冬を経ても枯れず、春また新たな苗も生える。花

(二) 河東ハ山草類甘草ノ註、鹽四、羌ハ石部、南石類、消石ノ註、胡ハ同、戎鹽ノ胡ノ鹽山ノ註參照。
(三) 漢トハ當時ノ中央部ヲ指スモノノ如シ。

(一) 牧野曰フ、此ニ蓼ハヤなぎタテ (Polygonum Hydropiper L.) ノ二群ヲ指シタモ、ノデ皆葉ニ辛辣ヲ有スルモノデアル、辛辣アルモノハ此一種ニ限り他種ノモノハ辛辣ナイ、其野生シテ通常食用ニ供セヌモノヲヤなぎタテト稱シ、其變種ニシテ食用ニ供スルモノハ鐵扇シテまたテトモほんたデト

ハ黃色で角になる子を結ぶ。功力は藍の功力に近い」といつてある。

氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【久しきに互つてこれを食へば、

大いに腎を益し、髓腦を填て、五臟、六腑を利し、關節を利し、經絡中の結氣、心下に結伏せる氣を通じ、耳目を明にし、身體を壯健にし、睡眠を少くし、心力を益し、筋骨を壯にする。茹にして一夜置き、色の黄になつたものに鹽を和して食へば、黃毒を治す】(藏器)

子

主治

【多眠症】(思邈)

蓼

(本經中品)

和名 たて
學名 *Polygonum Hydrophyllum L. et var.*
科名 たて科(蓼科)

校正

菜部より此に移し入る。

釋名

時珍曰く、蓼類の草は皆高く揚るものだ。故に文字は蓼に従ふ。音は料(レウ)である。高く飛ぶ有様の形容だ。

集解

別錄に曰く、蓼實は雷澤の川澤に生ずる。弘景曰く、この草は類が

モ稱^{ホウ}ル、之^レニ數品ガアル、あゐたて、あかあゐたてハ紫團^{シロ}タ、むらさきたてハ紫色暗赤紫あきぶた^{シロ}てハ紫葉ノ如ク、ほそばたてハ葉極メテ狭長ナル集^{シロ}中ノ青紫ハあゐたてモ其一^{シロ}て紫^{シロ}ハむらさきたてデアラウ。小野蘭山ニ從^{シロ}ヘバ香^{シロ}ハかんたて一名ふりたてデ赤^{シロ}ハとうたて一名あかたてデ木^{シロ}ハまたたびダト云ツテ居ル、植物名實圖考卷ノ十一ノ夢ノ圖ハおほいなたてデ夢ノ正品デハナイ。
(一) 雪^{シロ}澤ハ今ノ山東省濰縣ノ東南ニ在^{シロ}リ、雪澤縣ノ界ニ接ス。水經注ニ「雪澤在咸陽城西北、昔華胥偃大跡處也。其城東西二十餘里。南北十五里。即舜所漁也」トアリ。


多く、人の食ふものだ。三種あつて、一種は青^{シロ}蓼といひ、人家で常用する。その葉は圓いものも尖つたものもあるが、圓いものが勝れてゐる。薬用とするはこのものだ。一種は紫^{シロ}蓼といひ、相似たものだが色が紫だ。一種は香^{シロ}蓼といひ、相似てゐるが香^{シロ}しい。いづれも甚だ辛くはなく食料として好適だ。

保昇^{シロ}曰く、蓼は類が甚だ多く、青^{シロ}蓼、香^{シロ}蓼、水^{シロ}蓼、馬^{シロ}蓼、紫^{シロ}蓼、赤^{シロ}蓼、木^{シロ}蓼の七種あつて、紫、赤の二蓼は、葉が小さく狭くして厚い。青、香の二蓼は、葉はやはり似てゐるが俱に薄^{シロ}い。馬、水の二蓼は、葉が俱に濶く大きく、表面に黒點がある。木^{シロ}蓼は、一名天^{シロ}蓼といひ、蔓生のもので、葉は柘^{シロ}葉に似てゐる。前の六蓼は、花はいづれも紅白色、子はいづれも大さ胡麻ほどの赤黒色で尖^{シロ}扁だが、木^{シロ}蓼だけは、葉は黄白色、子は皮が青くして滑かだ。これ等諸蓼はいづれも冬は枯死するが、香^{シロ}蓼だけは宿根から再び生え、生菜として食料になる。

頤^{シロ}曰く、木^{シロ}蓼にも大、小の二種あつて、いづれも蔓生である。陶氏^{シロ}は、青^{シロ}蓼を藥に入れるものとし、他は用ゐないといふ。三茅^{シロ}君の傳に、白^{シロ}蓼醬を作る方といふがあるが、藥譜の中には、白^{シロ}蓼なるものがないから、これは青^{シロ}蓼を指したのではない

かと思ふ。

宗○護曰く、蓼實とは、草部下品にある水蓼の子のことだ。下品の部で水蓼とあるは莖を用ゐる意味に據り、この中品の部で蓼實といふは子を用ゐる意味に據つて取



〔蓼 赤 蓼 青〕

扱つたのだ。春初に瓢箪へうたんに水を入れてこの實を浸濕し、火の上の高い處に懸けて晝夜暖氣を與へると、やがて紅い芽が生える。その芽を取つて蔬にし、五辛ごしん盤ばんに使ふ。

時○珍曰く、韓保昇の所説は甚だ明瞭だ。古代には蓼を栽培して蔬にし、子を取り收めて

藥に入れたものだ。故に禮記に、雞、豚、魚、鼈べつを烹るには、いづれも蓼をそのものの腹中に詰めて煮て、羹かう、膾かいなどを調理するとあつて、やはり蓼は必要な調理材料だつたのだ。後世では飲食の料としては用ゐず、世間でも一向栽培せぬが、ただ酒の麴を製るにだけはこの汁を用ゐてゐる。現在では、平澤に生ずる香蓼、青蓼、紫蓼を藥用に良しとしてある。

（一）五辛盤ハ楚人ガ
元日ニ作リ備ヘルモ
クア、其五辛ハ葱、
蒜、薑、蓼、蒿芥ノ
類ナリ。

(註) 目字大觀ニ據リ
テ補入ス。

實 氣 味

【辛し、溫にして毒なし】 權曰く、多く食へば、水を吐し、氣を壅し、陽を損ずる。

主 治

【目を明かにし、中を溫め、風寒に耐へ、水氣を下す。面、目の浮腫、癰、瘍(木經)】 【鼻に歸するもので、腎氣を除き、癰瘍を去り、霍亂を止め、小兒の頭瘡を治す】 (甄權)

附 方

舊一、新三。

【傷寒勞復】 房事が原因で後に羣(かうぐわん)丸が腫れ、或は腹に縮み入つて痛むには、蓼子一把を水で揉み、その汁一升を飲む。(肘后方) 【霍亂煩渴】 蓼子一兩 香薷二兩(いっじゆ)を用ゐ、二錢づつを水で煎じて服す。(聖惠) 【小兒の頭瘡】 蓼子を末にし、蜜を和して雞子白と共に塗る。蟲が出て痕が残らない。(藥性論) 【蝸牛の咬毒】 毒が全身に行つたものには、蓼子を煎じた水で浸せば立ちに癒える。陰部に近づけてはならぬものだ。近づければ力を弱くする。(陳藏器本草)

苗 葉

氣 味

【辛し、溫にして毒なし】 思邈曰く、黃帝は『蓼を多く過食すれば、中毒して心痛を發する。生魚に和して食へば、脱氣し、陰核が痛み、死を願ふやうになる。二月蓼を食へば、胃を傷める』といつてある。扁鵲は『久しく食

へば、寒熱を起し、髓を損じ、氣を減じ、精を少くする。婦人が月經來潮時に蓼、蒜さんを食へば、よく淋を起し易い。大麥麴と適合するものだ』といつてある。

主治

【舌に歸するものであつて、大小腸の邪氣を除き、中を利し、志を益す】（別錄）【乾して酒に醸したものは、風冷の主藥として大いに良し】（弘景）【生菜に

（五）食物本草ニ按テ
持ニ作ル。

（五）大觀ニ、刺ニ作
ル、狐ノ尿ノ爲メニ
發スル瘡。

して食へば、能く腰、脚に入る。煮た湯で脚を（五）捻り揉めば霍亂轉筋を治す。煮汁を日毎に飲めば、瘰癧げんきを治す。擣き爛らして狐六尿瘡に傅ける】（藏器）【脚の俄かに軟するには、赤蓼を灰に燒き、淋汁を取つて浸し、桑葉で蒸じようらんする。立ろに癒える】（大明）【蟲を殺し、礬ひを伏す】（時珍）

附方

舊四、新三。

【蓼汁酒】胃脘の冷で飲食不能となり、耳、目が明かならず、四肢に氣があり、冬季就寢中足の冷えるを治す。八月三日に蓼を取つて日光で乾かし、五升ほどに束つかねたもの六十把、水六石を一石に煮取つて滓を去り、米飯に拌せて普通の酒を醸す法の如くして熟するを待ち、日毎に飲む。十日後には、目が明かになり、氣が壯になる。（千金方）【肝虛の轉筋】吐瀉するには、赤蓼の莖、葉を切つて三合を、水一盞、酒三合で四合までに煎じ、二回に分服する。（聖惠方）【霍亂

〔七〕大觀ニ把ニ作ル。

〔八〕大觀ニ一盞服ヲ三升瀝之ノ四字ニ作ル。

〔一〕牧野曰フ、やなぎたてノ水中ニ生エシモノテ水ニ靡キテ流レ、其莖ガ水面ニ出ヅレバ花穂ヲ出シテ花ヲ開ク、此ノ様ニ水中ニ沈在スルモノハ冬モ生キテ居ツテ年ヲ越シ、多年生ノモノトナツテ居ルノハ面白キ現象デアール、之ニ反シテ陸上ニ生ズルモノ（やなぎたて）ハ全ク一年生本ヲナシ秋ニナレバ枯レ果ゲル。

〔二〕家蓼ハ家園ニ栽培スル普通ノ蓼。

轉筋】蓼葉一〔八〕升、水三升を二升に煮た汁に香豉一升を入れ、更に一升半に煮取つて三回に分服する。（藥性論）【夏季の咽死】蓼の濃煮汁（一盞を服す。（外臺）【小兒の冷痢】蓼葉の搗汁を服す。（千金）【血氣の攻心】痛み忍び難きには、蓼根を洗つて剉み、酒に浸して飲む。（斗門）【惡犬の咬傷】蓼葉を泥に搗いて傅ける。（肘後）

水 蓼（唐本草）

和名 かはたて みづたて
學名 *Polygonum Hydropiper*, L. form
aquaticum, Makino.
科名 たて科（蓼科）


釋名

虞蓼（爾雅） 澤蓼 志曰く、水の浅い澤中に生ずるから水蓼と名けるのだ。時珍曰く、按ずるに、爾雅に「薺は虞蓼なり」とある。山が水を挾んだ地形を虞といふのだ。

集解

恭曰く、水蓼は下濕の水傍に生ずるもので、葉は馬蓼に似て〔三〕家蓼よりも大きく、莖は赤い。水で揉んで食へば蓼子に勝る。

宗奭曰く、水蓼は大體水薺と似たもので、ただ枝が低いだけだ。現に酒を造る時に、その葉を取つて水に浸し、その汁を麴に和して麴にする。これもやはりその辛



味を利用するのだ。

時珍曰く、この草は水際に生える蓼

のことで、葉は長さ五六寸、水紅の葉

に比較すれば稍狭く、家蓼の葉に比較

すれば稍大きく、功力も彷彿たるもの

【水 蓼 馬 蓼】

だ。寇氏が『蓼實は水蓼の子のことだ』と謂ふはこれを根據としたものだ。

莖葉氣味【辛し、毒なし】

大明曰く、冷なり。主治【蛇傷にこれ

を搗いて傅ける。絞汁を服すれば、蛇毒が腹に入つて心悶するを止める。又、脚氣で腫痛し、瘡と成つたものには、水で煮た汁に漬けて捻り揉む】(唐本)

(一) 馬 蓼 (綱 目)

和名 はるたて

學名 Polygonum Persicaria, L.

科名 たて科(蓼科)

釋名

大蓼(綱目) 墨記草

時珍曰く、凡そ物の大なるものは皆馬を冠して

〔一〕牧野曰フ、馬蓼ハはるたてが主品デス、尙他ノ一屬品ノ別種ヲモ同シク馬蓼ト呼ブコトガ集解ニ出テ居レドモ何たてカ分ラヌ、本草綱目啓蒙ニ之レチいねたてトシテアルガ、此名ハ今日吾人ノ使用シツアルいねたて即チ草木圖説卷ノ

七ニアルいわたて
(*Polyspermum khun-*
si. Meisn.) デハナ
ク、何ンデモ辛クナ
イたてノ總名デア
ル。

(一) 牧野曰フ、我邦
ニ野生ナシ、大形品
デタタ觀賞用ニ人家
ニ栽培セラレテ居ル
ノミデアル。

呼ばれる。俗に大蓼と呼ぶはこの草だ。高さ四五尺のもので、大小二種ある。葉毎
に中間に墨で點を記したやうな黒い跡あとがあるところから、方士は墨記草と呼ぶ。

集解

弘景曰く、馬蓼は下濕の地に生ずるもので、莖に斑があり、葉は大き
く、黒點がある。やはり兩三種あつて、その最も大なるものを龍鼓りゆうこと名ける。即ち

水薺だ。

莖葉

氣味

【辛し、溫にして毒なし】 時珍曰く、丹砂、雌黃を伏す。

主治

【腹中の蛭蟲を去り、身を軽くする】 本經

(一) 紅 草 (別錄中品)

和名 おほけなぐ
學名 *Lythrum orientale*, L., var. *pliosum*, Meisn.
科名 なぐ 科(蓼科)

校 正

有名未用、別錄の天蓼を併せ入る。

釋 名

鴻蘼 蘼の音は纈(ケツ)である。龍古 あるひは鼓と書く。遊龍(詩

經) 石龍(別錄)

天蓼(別錄)

大蓼

時珍曰く、この蓼は甚だ大きく、花はやはり紅


くして多數だから、薺ささぎといひ、鴻といふ。鴻はやはり大いなるの意味だ。別錄には、有

名未用草部の中に天蓼なる一條を掲げて『一名石龍。水中に生ずる』とあり、陳藏器の解に『天蓼、即ち水茺、一名遊龍、一名大蓼』とある。これに據れば、この二條は、一はその實を指し、一は莖葉を指したものである。ここには一條に併記した。

集解

別錄に曰く、茺は水旁に生ずる。馬蓼のやうで大きい。五月實を採る。弘景曰く、現に下濕の地に甚だ多く生えてゐる。極めて馬蓼に似て甚だ長大だ。詩に『隰に遊龍あり』とあり、郭璞は『龍古のことだ』といつてある。

頌曰く。茺、即ち水茺である。蓼に似て葉が大きく、赤白色で高さ一丈餘のもの



〔茺〕

〔草〕

だ。爾雅に『茺は龍古なり、その大なるは歸なり。音は詭(キ)』とある。陸機は『遊龍、一名馬蓼』といつてあるが、馬蓼おのづは自から別の一種だ。

時珍曰く、莖は粗く、拇指ほどのもので毛があり、葉は大さ

商陸の葉のほどで色は淺紅だ。穗が出て秋深くして子が實り、その子は扁たく、酸棗仁のやうで小さく、色は赤黒くして肉が白い。甚だ辛くはない。煮れば食へる。

實 氣味

【鹹し、微寒にして毒なし】

主治

【消渴に熱を去り、目を明

にし、氣を益す】別錄

附方

舊一、新一。

【瘰癧】

水荭子を多少に拘はらず、一半は微し炒り、一半は

生で用ゐて共に研末し、食後に二錢を好き酒で調へて服す。日毎に三服すれば破れたものも治癒する。久しく續用すれば效がある。效が現れたときは服藥を止める。

（寇宗奭本草衍義）

【瘰癧瘰癧】

及び盃や盃ほど堅硬になつたものには、水荭花の子

一升を別に研り、獨顆蒜三十箇を皮を去り、新狗腦一箇、皮硝四兩と石臼で搗き爛

らして患部に攤し、上に油紙を當てて縛帶し、午後六時に貼つて翌朝六時に取る。

なほ效なきときは再び貼り、二三回試みる。膿潰することがあつても氣遣ふに及ばぬ。

そこで患者の虚實を看て、逐日錢氏の白餅子、紫霜丸、翳氣丸、消積丸を間服

して通じを付け、病を消磨する。これは半月間服するのであるが、甚しきものも一

箇月繼續すれば必ず瘥える。虚實を看るの注意として、喘滿するは實、喘せぬは虚

（註）瘰癧ハ腹ニ積聚アツテ塊ヲナスモノ、瘰癧トイフモノ是ナリ。

である。(前氏驗方)

花 主治

【血を散じ、積を消し、痛を止める】(時珍)

附 方

新三。

【胃脘の血氣】痛むには、水紅花一大撮、水二鍾を一鍾に煎じて

服す。百戸毛菊庄が屢々實驗した方である。(重刊遊水集驗方) 【心氣汚痛】水紅花を末

にして熱酒で二錢を服す。またある法では、男は酒、水各半で煎じて服し、女は醋、

水各半で煎じて服す。年齡三十歳のある婦人が、この病に罹つて一服で立ろに效が

あつた。(摘玄方) 【腹中の痞積】水紅の花、或は子一盞、水三盞を桑柴の文武火で煎

膏し、痞の大、小を量つて攤して貼り、同時に酒で膏を調へて服す。腥、葷、油膩

の物を忌む。(劉松石保壽堂方)

天葵(別錄)

時珍曰く、これは莖、葉を指す。

氣 味

【辛し、毒あり】

主 治

【惡瘡。痺氣を去る】(別錄) 【根、莖は、惡瘡腫、水氣、脚氣を除く。煮た濃汁に漬ける】(蘇頌)

附 方

新二。

【肌肉を生ずる】水紅花の根を湯に煎じて淋ぎ洗ひ、同時にその

葉を晒し乾して研末し、毎日一回瘡上に撒る。(談楚翁試驗方)

(一) 毛 蓼 (拾遺)

和名 みづひき
學名 Polygomon filiforme, Thumb.
科名 たてこ(蓼科)



〔蓼 毛〕

集解

藏器曰く、毛蓼は(三)山
足に生える。馬蓼に似て葉上に毛が
あり、冬も根が枯れぬ。時珍曰く、
この草は、即ち蓼の山麓に生ずるも

ののことだ。澤や湿地の蓼とは異ふ。

葉 莖

氣 味

【辛し、溫にして毒あり】

主 治

【癰腫、疔瘻、癰癰には、

杵き碎いて瘡中に入れて、膿血を引き、肌を生ずる。また湯にしても洗ふ。足を濯
へば脚氣を治す】(藏器)

(二) 海 根 (拾遺)

和名 無
學名 未
科名 未
詳

(一) 牧野曰フ、毛蓼
ハ植物名實圖考卷ノ
十四ニ據レバみづひ
きデ、此品ナレバ山
足ニ生エテ冬モ根ガ
殘リ春萌發シ葉ニ毛
ガアル、本草綱目啓
蒙ニ原野ニ生ズル一
年生本ノけたて(此
けたてニ三アリテ一
ハさなへたてノ變種
一ハおほいぬたてノ
變種、一ハはるたて
ノ變種デアル)ニ充
ツレドモ中ラヌ。
(二) 山足ハ山ノ麓ト
イフガ如シ。

(一) 牧野曰フ、ドン
ナ草カ分ラヌ。

(一) 會稽ハ石部禹餘糧ノ註ヲ見ヨ。

(二) 大觀ニ胡チ海ニ作ル。

(三) 食物本草ニ用チ食ニ作ル。

(一) 牧野曰フ、是レハ正ニつるそばデア

ル、其莖赤ク柔カク

其葉末尖ツテ葉ノ底

部ガ方形ナシ、白

花、黒實ノ狀文簡ナ

レドモ能ク其實狀チ

捕提シテ居ル。

(二) 大觀思上南字ア

リ。恩州ハ今ノ山東

省恩縣ノ地ナリ。然

レドモ此ニハ南恩州

ナ正シトス。南恩州

ハ石部石蛇ノ註ヲ見

ヨ。

(三) 大觀ニ藪ニ作ル。

集解

藏器曰く、(一) 會稽の海岸の山谷に生ずる。莖は赤く、葉は馬蓼に似たもので、根は蕤薺に似て小さい。(二) 胡人は蒸して用ゐる。

根氣味

【苦し、小温にして毒なし】

主治

【霍亂中惡、心腹痛、鬼氣、

疰忤、飛尸、喉痺、蠱毒、癰疽、惡腫、赤、白遊癰、蛇咬、犬毒。酒、及び水に磨

つて服し、竝に傳ける】(藏器)

火炭母草 (宋圖經)

和名 つるそば
學名 *Lythrum chinense*, L.
科名 たて科(蓼科)

集解

頌曰く、(一) 恩州の原野中に生ずる。莖は赤くして柔かく、細蓼に似て

葉の端が尖り、葉柄に近い所は四角である。夏白

い花が咲き、秋實る。その實は(二) 椒のやうで色は

青黒色だ。味甘し、食ひ得るものだ。

葉氣味

【酸し、平にして毒あり】

主治

【皮膚の風熱が骨節に流注するを去



〔火炭母草〕
——南恩州——

る。癰腫疼痛には、時期に拘はらず采つて罌器中で搗き爛らし、鹽、酒で炒つて、腫痛の箇所に傳け、一夜經つて一回易へる」蘇頌

三白草 (唐本草)

和名 はんげしやう、かたしろぐさ
學名 Scutellaria Toxifolia, Deane.
科名 はんげしやう科(三白草科)

釋名

弘景曰く、葉上に三箇の白點があるので、俗にそれに因んで名けたものだ。又、下文を見よ。

集解

恭曰く、三白草は池澤の畔りに生ずる。高さ一尺ばかり、葉は水薺のやうでもあり、また蕺のやうでもあり、又蕺菜にも似たもので、葉上に三箇の黒點がある。白點ではない。古代の人は、これを祕するために黒いといふ事實を隠して白といつたのだ。根は芹の根のやうで黄白色だが、粗く大きい。

藏器曰く、この草は初生には白い部分はないが、夏に入ると葉の端の半が、ろいを傳けたやうに白くなる。農家ではその時を測つて田に種を蒔き、三葉白くなつた時に蒔けば雜草がはびこるとしてある。故にこれを三白といふのであつて、三黒

(一) 牧野曰フ、我邦ニモ野生シ諸州ノ水邊又ハ濕地ニ生ジ、夏秋ノ候梢葉ノ面白色ヲ呈スルノ殊性ガアル、花ハ穗ヲナシ小形ヲ裸花ヲナシ、花辦ガナクダニ雌雄蓋ガアルノミデア

(一) 襄州ハ石都理石ノ註ヲ見ヨ。
(二) 本草彙言ニハナニ作ル。

點などといふは、蘇恭がその事實を識らないのだ。その草は薯蕷しよゐのやうなもので、一向水薺には似てゐない。

保昇ほしょう曰く、今は、ニ襄州に出る。二月、八月に根を採つて用ゐる。

時珍曰く、三白草は田や澤の畔りに生えるもので、三八月苗が生え、高さは二三


尺、莖は蓼のやう、葉は章陸、及び青稻せいせうの

やうだ。四月にその頂部の三葉の表面が三

白 回に変色して白くなるが、他の葉は相變ら

ず青色だ。俗に、一葉白くなつた時は小麦

が食へ、二葉白くなつた時は梅、杏が食へ、



〔草〕

三葉白くなつた時は黍子ししが食へるといふ。五月穂になつた花を開く。形状は蓼花のやうで、色は白く、微し香しい。細かい實を結ぶ。根は長く白く、虚軟で節鬚があり、形状は泥菖蒲でいしょうまの根のやうだ。造花指南に『五月花を採つて雄黄を制すべし』とある。蘇恭の、水薺に似て三黒點があるといふそのものは、馬蓼のことで三白ではない。藏器の説が正しいが、しかし葉だけはやはり薯蕷には似てゐない。

氣味

【甘く辛し、寒にして小毒あり】

主治

【水腫、脚氣、大、小便を

利し、痰を消し、癖を破り、積聚を除き、丁腫を消す】〔唐本〕【搗いて汁を絞つて服すれば、吐逆させ、瘡、及び胸脇の熱痰、小兒の痞滿を除く】〔藏器〕【根は脚氣風毒の腫を療ずる。酒で搗いて服するも甚だ效驗がある。又、湯に煎じて癰瘡を洗ふ】

（時珍）

蠶繭草

（拾遺）

和名 しろばなしろばなくらたくらた
學名 *Polygonum japonicum*, Moisan.
科 學 名 たて科（蓼科）

集解

藏器曰く、濕地に生ずる。蓼ほどの大さで、莖は赤く、花は白い。東方の土地にもある。

氣味

【辛し、平にして毒なし】

主治

【諸蟲。蠱類に咬まれて毒が腹に入る處あるには、これを煮て服す。また搗いて諸瘡に傅ける】〔藏器〕

蛇繭草

（拾遺）

和名 いねいたいねいた
學名 *Polygonum Reynoutrian*, Makin.
科 名 たて科（蓼科）

（一）大觀ニ繭草莛ニ作ル。

牧野曰フ、姑ク小野

（二）繭草大觀本草ニ繭ニ作ル。

牧野曰フ、是レ我邦先輩ノ充テタルさく

らなて乎、集解ノ文餘ニ繭草ニ能ク考ヘ

難。ガ今姑ク盲目助ニ之レニ從ヒ置タ、

然シサウトスレバ其品中ノしろばなしろばなくらたくらたニ近イ

ヤウデアル。

關山ニ從ヒ置クガ之
レガ果シテ正シイ説
カ分ラヌ、此ノ如ク
瘦セタモノヲ土佐デ
ハ葉いたづりト呼
ブ、是レハ固ヨリい
たどリト別種デハナ
イ。
(三)關東ハ函谷關以
東ノ古稱、今ノ河南
地方ヲ指ス。
(四)大觀ニ苳ニ作ル。
(五)大觀ニ苳ニ作ル。
此書十七卷莽草ノ釋
名ニ鼠莽、弘景曰ク、
莽本作苳字俗訛呼爾
ノミトアリ。

(一)教訓曰フ、虎杖
サいたどリトスルハ
正シイ事デアラ、集
解ニハ茶、保昇、頌
恭ニ龍々其影狀ヲ觀
イテ居ル、宗爽ノ言
フ所ノモノハ何物カ
分ラヌ、いたどリハ

集解 藏器曰く、平地に生ずる。葉は苦杖に似て小さく、節が赤い。高さ一

二尺のものだ。これを種えれば蛇を辟ける。また一種、莖が圓くて芋に似た草があ
るが、これも蛇毒に傳ける。

慎微曰く、按ずるに、百一方に『關東に、形狀が芋に似て、莖が四角で節の赤
い草がある。これを揉んで蛇毒に傳ければ、毒を摘み取つて棄てるやうに顯著なも
のだ。これは蛇じや（けんさう）蘭草と名ける草だ』とある。また鼠そ（けんさう）蘭草といふ草がある。即ち
後章に掲げる莽草のことだ。

氣味（缺）**主治** 【蛇、虺、毒蟲に螫されたときは、根、葉を取つて搗
き、咬まれた箇所へ傳ける。黄水を下すものだ】（藏器）

(一) 虎 杖 (別錄中品)

和名 いたどり
學名 *Polygonum korymbosum*, Makino,
(= *Polygonum cuspidatum*, Sieb. et Zucc.)
科名 たて科(蓼科)

校 正 木部より此に移し入る。

釋 名 苦杖(拾遺) 大蟲杖、藥性) 斑杖、日華) 酸杖 時珍曰く、杖とはそ

我邦民間デモ其地下
莖ヲ解熱劑トシテ使
用シテ居ル處ガア
ル。

(二)大觀ニハニ作ル。

(一)汾州ハ石部石膏
ノ註、越州ハ石部蛇
黃ノ註、滁州ハ山草
類人參ノ註ヲ見ユ。

の莖を形容したもの、虎とはその斑を形容したものだ。或は一名杜牛膝ともいふが、誤だ。それは一種の斑杖で莖頭に似たものだ。同名異物である。

集解

弘景曰く、田野に甚だ多い。形状は大馬藟のやうで、莖に斑があり、葉が圓い。

保昇曰く、所在にある。下濕の地に生え、樹になつて高さ一丈餘になる。その莖は赤く、根は黄色だ。二月、(三)三月に根を採つて日光で乾す。


頤曰く、現に(三)汾州、越州、滁州に産し、處處にある。三月苗が生え、莖は竹筴のやうな形状で、表面に赤い斑點がある。初生から枝が分れ、葉は小杏葉に似たものだ。七月花を開き、九月實を結ぶ。南方諸地の産には花がなく、根は皮が黒く、破り聞けば黄色で柳根に似たものだ。また高さ一丈餘のものもある。爾雅に『葑は虎杖なり』とあり、郭璞の注に『葑草に似て粗く大きく、細刺があり、物を赤く染め得る』とあるがこの物だ。

宗奭曰く、これは草藥である。蜀本草に『木になり、高さ一丈餘になる』とあるは誤だ。大體皆寒菊に似たものだが、花、葉、莖、蕊のやや大なる點が異ふ。そし

て莖、葉には淡黒斑がある。六七月に次第に花を開き、九月になると花が咲かなくなる。花瓣は四出で色は桃花のやう、やや大きくて外面の色が微し深い。陝西地方の山麓や水の邊に甚だ多い。

數曰く、凡そこれを用ゐるには、誤つて天藍、及び斑袖根はんしゅうこんを用ゐてはならぬ。こ

の二味はいづれもよく似たものだ。



〔虎〕

〔杖〕

機曰く、諸家の註は、或は蕊に似たといひ、杏に似たといひ、寒菊に似たといひ、各々相合致しない。産地の相異に依つてかやうな不同があるのかもしれない。

時珍曰く、この草は、莖は葦、蓼に似てゐる。葉は圓くして杏に似てゐる。自根は黄で柳に似てゐる。花の形狀は菊に似て、色は桃花に似てゐるものだ。これを綜さう合がして觀れば、決して同じからぬといふことはない。

根 修 治

數曰く、これを採取したならば、細かに剉んで葉に包み、一夜置いて出だし、晒し乾して用ゐる。

〔考〕金陵本ニ根字之
ニ作ハ誤ナルコト必
セリ。

〔五〕出、大觀ニ據テ
補入ス。

(六) 木柯(廉)曰ク、

いたどりハクスピダ
チン、ホリゴニンノ
他一種ノ配糖體ヲ含
有シ、此物ハ加水分
解ニヨリエモゲン、
メチルエモゲン等ヲ
生成ス。

藥誌、明、四一(三一
四)三四九。

W. P. 175, P. J.
1836:56) 84, J. chin
Soc. 1895.(67)1084;
Bull. Sci. Pharm.
1907 (14) 638.

氣味

【微溫なり】權曰く、甘し、平にして毒なし。宗奭曰く、味は微し

苦い。今一般に、暑季に多く根の煎汁を飲にするが、甘草を配合すればこそであつて、さなくば飲むに堪へないものだ。別録の本文には味の説明がない。藥性論に『甘し』とあるが、それは甘草の味で、虎杖の味ではない。主治 【月水を通利し、

留血、癥結を破る】(別錄) 【酒に漬けて服すれば暴癥に主效がある】(弘景) 【風が骨節

の間にあるもの、及び血瘀には、煮て酒に作つて服す】(藏器) 【大熱煩躁を治し、渴

を止め、小便を利し、一切の熱毒を壓す】(甄權) 【産後の血運、惡血下らずして心腹

脹滿するを治し、膿を排し、瘡癰、撲損瘀血を治し、風毒、結氣を破る】(大明) 【灰

に焼いて諸惡瘡に貼る。焙じ研り、煉蜜で丸にして陳米飲で服すれば、腸痔下血を

治す】(蘇頌) 【研末して酒で服すれば、産後の瘀血、血痛、及び墜落撲損の昏悶を治

するに有效である】(時珍)

發明

權曰く、暑季に、根と甘草とを共に煎じて飲にすれば、琥珀のやうな愛すべき色になり、味も甚だ甘美だ。瓶に入れて井戸に入れ、冷を徹らせて水のやうにしたものを、當世一般に冷飲子と呼び、茗よりも貴重な飲料として用ゐてゐる。

(七) 食物本草ニ米下
ニ麴字アリ。

(八) 麴醃ハ乾菓子ノ
コトカ。

(九) 鄞縣ハ漢ニ置ケ、
故城ハ今ノ浙江省奉
化縣ノ東ニ在リ。五
代ノ梁ニ今ノ浙江省
鄞縣ノ地ニ移ス。

極めて暑毒を解すものだ。(七) 米をその汁で浸して(八) 麴醃にすれば更に美味だ。搗いて末にし、酒に浸して常に服すれば、婦人の經脈不通を破る。妊婦は服してはならない。

時珍曰く、孫真人千金方に、婦人の月經不通で腹内積聚し、虚脹して雷鳴し、四肢沈重するを治し、また男子の積聚をも治する虎杖煎といふがあつて、それは、高地の虎杖根を取り、剉んで二斛、水二石五斗を一斗半に煮取つて滓を去り、醇酒五升を入れて錫のやうに煎じ、一合づつを服して反應あるを程度とする。又、許學士の本事方には『男子、婦人の諸般の淋疾を治するに、苦杖根を洗淨し剉んで一合、水五合を一盞に煎じて滓を去り、乳香、麝香少量を入れて服す。(九) 鄞縣の尉耿夢得の内室が、沙石淋を患つて已に十三年を経過し、排尿する毎に忍ぶべからざる楚痛を感じ、便器に小便が落ちると共に沙石の音がサラサラと聞える程で、あらゆる方も效驗がなかつたが、この方を得て服してから一夕にして癒えた。これは予が目撃した事實だ』とある。

附方

舊三、新三。

【小便五淋】苦杖を末にし、二錢づつを飯飲で服す。(集驗方)

（二〇）絲ハ稻ノ別名。

【月水不利】虎杖三兩、凌霄花、沒藥一兩を末にし、一錢つづを熱酒で服す。○又ある方では、月經不通で腹が硬のやうに大きくなり、呼吸が短く、死せんとするを治す。虎杖一斤を頭を去つて暴乾して切り、土瓜根汁、牛膝汁二斗を用ゐ、虎杖を水一斛に一夜間浸して二斗に煎じ、前記の二汁を入れて共に煎じて餲のやうにし、晝二回、夜一回、一合づつを酒で服す。宿血が下るものだ。（聖惠方）【時疫流毒】毒が手、足を攻めて腫痛し、斷れんとするほど痛むには、虎杖根を剉んで煮出した汁に漬ける。（肘後方）【腹中の暴癥】石のやうに硬くして痛刺するは、治療を加へねば百日以内に死亡する。これには、虎杖根を水の上に影を映さぬやうにして一石餘を採り、洗ひ乾かして末に搗き、（二）絲米五升を炊いた飯に入れて攪きまぜ、好き酒五斗に漬けて封じ、薬が溶けて飯が上に浮ぶを待ち、一升半を飲む。鮭魚、及び鹽を食つてはならぬ。ただ虎杖を乾したもの一斗を取つて薄酒に浸し、始めは少量づつ日毎に三回服するもよし。癥はそれで下る。癥を治するには、この方が非常に他の諸薬に勝るものだ。（外秘要）【氣奔怪病】全身の皮膚の裡に、突然混混として波浪の如き感覺を生じ、耐へ難く痒く、抓けば出血して治效の加へやうなき病を氣奔と

いふ。苦杖、人參、青鹽、細辛各一兩を一服とし、水で煎じて少量づつ飲み盡せば瘡
 える。(夏子益奇疾方) 【消渴引飲】虎杖、焼いた海浮石、烏賊魚骨、丹砂等分を末にし、
 一日三回、渴した時に麥門冬湯で二錢を服す。酒色、魚、麪、鮓、醬、生物、冷物
 を忌む。(衛生家寶方)

(二) 薺 (拾遺)

和名無し
 學名未詳
 科名禾本科(禾本科)

校正

有名未用、別錄の馬唐を併せ入る。

釋名

馬唐(別錄) (三) 馬飯(別錄) 羊麻(別錄) 羊粟(別錄) 蔓子(爾雅)

軒子 藏器曰く、馬が餵かうのやうに飯のやうにこれを食ふ。それで馬唐、馬飯と名け
 たのだ。

時珍曰く、羊もこれを食ふところから、羊麻、羊粟といふ。その臭氣に穢臭いりしうがあ
 るところから薺うといふのであつて、薺とは穢の意味だ。朽木の臭氣のことである。
 この草は、葉が頗る葱ねぎに似て臭い。故に左傳に「一薰一薺、十年尚ほやはり臭があ

(一) 大觀ニハ薺下ニ
 草字アリ。
 牧野曰フ、薺ハ何カ
 禾本科ノモノデア
 ルカ能ク明ラヌ雖イ、
 先茲猶チくまつつら
 科(馬唐草科)ノカ
 り。されど(Onopordi-
 tis divaricata Maxim-
 y)ニ充ツルハ非デ
 ず、是レハオダ臭
 イトイフノミデア
 ヨイ加減ニ幅マ
 デモノデア
 り。

(二) 馬飯ノ名別錄ニ
 見エズ、大觀本草ニ
 爾雅チ引テ馬唐馬飯
 ナリトアレドモ、爾
 雅釋草ニ此支テグシ
 テ爾雅ニ此文アリ。



〔草〕

〔葉〕

る』といふのはこの草のことだ。孫升の談圃に、これを香薷かうじゆとしてあるのは誤だ。これは別錄の馬唐のことである。茲には一條に併記した。

集解

別錄に曰く、馬唐は下濕の地に生じ、莖に節があつてそれに根が生える。五月に採收する。

藏器曰く、南方諸地の荒廢した田畑に生える。節毎に根が生えて土に著くさまは結縷草けつろそうのやうだ。馬の飼糧になる。又曰く、薺は水田中に生え、形状は結縷草のやうで葉が長い。馬が食ふ。

氣味

〔甘し、寒にして毒なし〕藏器曰く、大寒なり。

主治

〔馬唐は、

中を調へ、耳、目を明にする〕別錄〕煎じて取つた汁は、目を明にし、肺を潤ほす。又曰く、薺は、水氣を消す。濕痺、脚氣、頑痺、虚腫、小腹痛、小便赤澀には、いづれも赤小豆と合せて煮て食ふ。鹽を入れてはならぬ。絞汁かうじゆを服すれば消渴を止める。葉を搗いて毒腫に傳ける〕〔藏器〕

(一)牧野曰フ、普通ニ路傍ナドニ多キ一年生木ヱアル。

(二)東萊ハ漢ノ郡名。今ノ山東省登州、萊州ノ地ナリ。披縣ニ治ス。

蕭 蓄

音は編蓄(ヘンチク)である。

(本經下品)

和名にはやなぎ みちやなぎ
學名 Polygonum aviculare, L.
科名 たて科(蓼科)

釋 名

扁竹(弘景)

扁辨(吳普)

扁蔓(吳普)

粉節草(綱目)

道生草

時珍

曰く、許慎の説文には、扁筑と書いて、筑は竹と同音としてある。節間に粉があり、道旁に多く生える。故に方士は粉節草、道生草などと呼ぶ。

集 解

別錄に曰く、蕭蓄は東萊の山谷に生ずる。五月に採つて陰乾する。

弘景曰く、處處にあるもので、地に布いて花を生じ、節間が白く、葉が細くして綠色だ。一般に扁竹と呼んでゐる。



〔蓄 蕭〕

頤曰く、春季中に道旁に地に布いて生える。苗は瞿麥に似たもので、葉は細く緑で竹のやう、莖は赤く、釵股のやうで節間に花が出る。花は甚だ細微で青黄色、根は蒿根のやうなものだ。四五月に苗を採つて陰乾する。蜀圖經には『二月に日光

(三) 或ヨリ以下ノ文大觀ニハ衛詩綠竹猗猗說者曰綠王芻也竹扁竹也即釋此篇著也云云ニ作ル、時珍ノ引用ハ文意ヲ誤解セリ。

(四) 木村(康)曰ク、にはやなぎハ全草中糖二—三%及少量ノ單寧、蠟等ヲ含有ス。Med. Woche 1903 (4) 381.

(五) 魁洞トハ和名ナトミスアリ、小兒未ダ乳ヲ離レザル中母復孕ミ兒病ヲ致スモノ。

で乾す』とあり、郭璞注爾雅には『小藜に似て莖節が赤く、よく道旁に生える。食つて蟲を殺し得るものだ』とあるがこの草である。(三) 或は爾雅にある王芻がこの草だともいふ。

時珍曰く、この草は、葉は落帚葉らくしうように似て尖らず、莖は弱くして蔓を引き、節間が迫つてゐる。三月蓼藍花れうらんくわいのやうな細かな紅花を開き、細かな子を結ぶ。爐火家では、燒灰、煉霜に一種の水扁筑を用ゐ、それを瀝と呼んでゐる。瀝の音は督(トク)である。説文に出てゐる。

氣味

【苦し、平にして毒なし】 權曰く、甘く瀝じふし。

主治

【浸淫疥

瘰、疽痔。三蟲を殺す】(本經) 【婦人の陰蝕を療す】(別錄) 【煮汁を小兒に飲ますれば、蚘蟲いづちうを療ずるに有效だ】(甄權) 【霍亂、黃疸を治し、小便を利し、小兒の魁洞こけいどうを治す】(時珍)

附方

萬六、新三。

【熱淋瀝痛しんりん】 扁竹の煎湯を頻りに飲む。(生生編)

【熱黃疸】

扁竹の搗汁一升を頓服する。多年に互るものは一日に再服する。(藥性論) 【霍亂吐利】 扁竹を鼓汁の中に入れ、五味を投じて羹に煮て食ふ。(食醫心鏡) 【丹石の反動が眼に

(一) 牧野曰フ、蕺草
ハテウセンガリヤス
カアルト植物名實
圖考卷ノ十一ニ著ハ

現はれたもの』丹石を服した毒が眼に發して腫痛するには、扁竹根一握を洗ひ搗いて汁を服す。(食療本草) 『蚘咬心痛』食療に『小兒が蚘咬で心痛し、顔色青く、口中に沫を出し、瀕死なるには、扁竹十斤を取つて剉み、水一石で一斗に煎じ、滓を去つて飴のやうに煎じ、食事を取らずに一夜隔てて空心に一升を服すれば蟲が下る。かくて常に煮汁で飯を炊いて食ふ』とある。○海上歌には『心頭急痛して當る能はざるには、我に仙人海上方あり。蕭蕭を醋煎して通口に嚙む。されば一時間位にして便ち安康なり』とある。『蟲が下部を食ふ病』蝸牛のやうな形狀の蟲が下部を食つて痒さには、扁竹一把を水二升で煮熟し、五歳の小兒ならば三五合を空腹に服す。(楊氏產乳) 『痔の腫痛』扁竹の搗汁一升を一二服する。なほ瘡えぬときは再服する。また汁を取つて麴に和し、餠飴にして一日三回煮て食ふ。(藥性論) 『惡瘡の癩痒』痛むには、扁竹を搗いて封ずる。癩が落ちて瘡える。(肘後方)

(二) 蕺草

蕺の音は蠟(ジ
ン)にある。(本經下品)

和名 テウセンガリヤス
學名 *Diphena scortim*, Link.
科名 禾本科(禾木科)

〔釋名〕 黃草吳普 葦竹唐本 葦蔭唐本 葦草綱目 葦葦の音は

戻ルキである。王芻爾雅 鵝脚莎 時珍曰く、この草は緑色の草で、物を黄に染め得るものだから、黄といひ、緑といふ。葦、葦といふのは、北方地方で緑の字

シテアル如クデア
集解中ノ文ノ竹ニ似
テ居ルト記シテアル
事ハ能ク此草狀ニ符
佛セシメタモノデア
ル、我輩ノ學者從來
之レヲ不ナクヤ

(Arthonon cilicis,
Heav.)ニ充テ居
レドモ誤リデアル。



〔葦〕 草

を讀む發音の轉訛だ。古代には、官の物を染める染料としてこの草を朝廷に貢納し、これを王芻と稱して進獻したものだ。葦は進むの意味と忠の意味とがあつて、忠に進む者を葦葦臣しんといふ。詩に『終朝綠を採る、一掬に盈た

ず』といひ、許慎の説文に『葦草は以て黄を染むべし』といひ、漢書に『諸侯は葦葦綬』とあり、同書音灼しやくの注に『葦草は三瑞らう瑯らうに出る。艾に似たもので、物を染め得る。それでその色と葦の名稱として葦綬と呼んだのだ』とある。いづれもこの草をいふのだ。

禹錫曰く、爾雅に『葦は王芻なり』とあり、孫炎の注に『これは葦蔭草のことだ、今は鵝脚莎と呼ぶ』とある。詩に『葦竹猗猗たり』とあるはこの草のことだ。

(一) 葦ハ石部雲母ノ註ヲ見ヨ。本書ニハ瑞瑯平昌縣ニ出ヅトアリ。當時ノ平昌縣ハ今ノ山東省青州府安丘縣ノ南六十支里、大清河ノ上流ニ在リ。即チ漢ノ葦瑯二屬ス。

(三) 青衣、葦藜ハ益州ニ在リトイフ。即チ今ノ四川省雅安縣ノ北ニ故城アリ。漢ニ縣ヲ置ク。當時ノ羌國ナリ。
(四) 荆襄ハ山草類實衆ノ註ヲ見ヨ。

集解

別錄に曰く、葦草ハ(三)青衣の川谷に生ずる。九月、十月に採る。物を金色に染める。普曰く、太山の山谷に生ずる。恭曰く、青衣は縣の名で、益州の西に在る。この草は今は處處の平澤、溪澗の邊りに皆ある。葉は竹に似て細く薄く、莖もやはり圓く小さい。(四)荆襄地方ではこれを煮て物を黄色に染めるが、その色は極めて鮮かに染め上る。俗に葦藜草と名けるものだ。

氣味

【苦し、平にして毒なし】。權曰く、神農、雷公は苦しといふ。之才曰く、

鼠負を畏る。

主治

【久欬の上氣喘逆、久寒の驚悸。癰疥、白禿、瘍氣。皮

膚の小蟲を殺す】(本經) 【身熱の邪氣、小兒の身熱を治す】(吳普) 【一切の惡瘡を洗ふに有効である】(甄權)

蒺藜

(本經上品)

和名 はまびし
學名 *Tribulus terrestris* L.
科名 はまびし科(蒺藜科)

釋名

蒺藜

旁通(本經)

屈人(本經)

止行(本經)

休羽(本經)

升推

(一) 牧野曰フ、我邦ニモ蓬シ海邊ニアツテ長ク莖ヲ砂碣面ニ曳テ居ル一年生草本ナアル、漢ニ在ワデ其實ハシ(菱)ノ實ノヤウニ刺ガアルカウハまびしト謂フ者也

弘景曰く、道路や牆上に多く生え。葉は地に布き、子に小さい菱のやうな刺がある。

ノデアル。

長安に最も多く、通行人の木屐に多く著く。現に軍隊では鐵でこの果實の形を鑄造して敵の通路に布き、それを鐵蒺藜と呼んでゐる。易に『蒺藜に據る』とあるは、

その凶銳にして物を傷けるの意味をいつたのだ。詩に『墻に茨あり』とあるは、掃ひ清めることが出来ぬといふことで、頑迷で鄙しく穢れたことを諷刺したものだ。方に用ゐることは甚だ稀だ。



蒺藜

人を刺し傷けることが甚だ疾く利いといふことだ。屈人、止行は、いづれもこの草が人を傷めることを表はした名稱だ。

集解

別錄に曰く、蒺藜子は三馮翊の平澤、或は道旁に生ずる。七月、八月

實を採つて暴乾する。

頤曰く、冬季にも採る。黄白色のものだ。郭璞の爾雅注に『地に布いて蔓生し、細葉で子に三角があり、人を刺す』とあるがこのものだ。又、白蒺藜なる一種があ

(二)馮翊ハ石部孔公
藤ノ註ヲ見ヨ。

(三) 同州沙苑ハ麻黄ノ註ヲ見ヨ。

(四) 馬藟子ハ山扁豆ノ一名。

つて、現に(三)同州沙苑どうしゅうしゃあんの牧場に最も多く生えてゐるが、近道にもある。葉は綠色で

蔓が細く、沙上一面に布いて生え、七月に豌豆の花のやうで黄紫色の小さい花を開き、九月に莢さやの實を結ぶ。その實を採るのである。味は甘くして微し腥く、褐綠色

で、蠶種子に似てやや大きく、また(四)馬藟子ばべうしに甚だ似てゐるが馬藟子の方が微し大きい。これは藥には入れられぬものだから、精細な識別を要する。

宗奭そうしやく曰く、蒺藜には二種あつて、一種は杜蒺藜といふ。

即ち今の道旁に地に布いて生え、小さい黄花を開き、芒刺ぼうしを結ぶものだ。一種は白蒺藜といふ。同州沙苑の牧場に生える。子は羊内腎のやうで、黍粒ちりゅうほどのものだ。補腎の藥



〔藥 蒺 藜 沙〕

として今一般に多く用ゐる。風患者にはただ刺蒺藜のみを用ゐる。

時珍ときちん曰く、蒺藜の葉は、初生の皂莢そうがふの葉のやうに正しく整つて愛すべきものだ。

刺蒺藜は、形狀が赤根菜の子のやうで、また細菱の三角に四箇の刺があり、實に仁がある。白蒺藜といふは、長さ一寸ほどの莢を結び、その中の子は大きな脂麻ほど、

形狀は羊腎のやうで綠色を帯びてゐる。今は一般にこれを沙苑蒺藜と呼んで他のものと區別してゐる。

子 修 治

穀曰く、凡そこれを使ふには、揀り淨めて正午から午後六時まで蒸して日光で乾し、木臼で搗いて刺を全部落し、酒を拌せて再び正午から午後六時まで蒸し、日光で乾して用ゐる。大明曰く、藥に入れるには、丸と散とに拘はらず、いづれも炒つて刺を去つて用ゐる。

氣 味

【苦し、溫にして毒なし】別錄に曰く、辛し、微溫なり。權曰く、

甘し、小毒あり、志曰く、その性は宣通するもので、久しく服しても冷えずして壅熱のないところを見れば、これは性溫なりといふが正しい。之才曰く、烏頭が使となる。【主 治】【惡血。結癥積聚を破る。喉痺、乳難。久しく服すれば、肌肉を

（子）結字大觀ニヨリ
テ補フ。

（子）木村（康）曰ク、
はまびしの成分ハタ
ンニンヲ含有ス。
Y. S. D. 1211; L.
M. P. 2230.

長じ、目を明にし、身を軽くする。【本經】【身體の風癢、頭痛、欬逆、傷肺、肺痿。

欬を止め、氣を下す。小兒の頭瘡、癰腫、陰瘡には、粉ぶし摩るがよし。【別錄】【諸

風、癰瘍を治し、吐膿を療じ、燥熱を去る。【甄權】【奔豚腎氣、肺氣の胸膈滿を治し、

分娩を催ほし、胎を墮し、精を益し、水臟が冷えて小便の多きものを療じ、尿の遺

(セ) 發乳ハ婦人ノ乳
ニ癰疽ヲ發スルヲ云
フ。
(ハ) 風濕ハ秘結ノ一
種ナラン。

癰、泄精、尿血腫痛を止める【大明】「痔漏、陰汗、婦人の(セ)發乳、帶下【蘇頌】」
風秘、及び蛇蟲の心腹痛を治す【時珍】

白蒺藜

氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

「腎を補し、腰痛、泄精、

虚損、勞乏を治す【時珍】

發明

頤曰く、古方には、いづれも刺あるものを用ゐ、風を治し、目を明にするに最も良しとしてあり、神仙方にも、蒺藜を單服する法があつて『黒、白を問はず、ただ堅く實するものを取り、舂いて刺を去つて用ゐる』といつてある。

時珍曰く、古方では、補腎、治風に皆刺蒺藜を用ゐたが、後世では、補腎には多く沙苑蒺藜を用ゐ、或は熬膏して藥に和す。恐らくその功力も甚だ相遠からぬものと見える。刺蒺藜は黃に炒つて刺を去り、麪に磨つて餅にし、或は蒸して食へば、饑饉の際の代用食になる。

附方

舊方、新八。

【服食法】蒺藜子一碩を、七八月のよく熟した時に採收して日光で乾し、舂いて刺を去つて末に杵き、二錢づつを、一日三回、新汲水で調へて服す。中絶せずに繼續すれば、穀食を斷つて長生する。これを服すること一年の

後には、冬も寒からず夏も熱からぬやうになり、二年にして老いたるは少くなり、白髪は黒に復し、落ちた齒が生え更り、三年繼續すれば、身體が輕くなつて長生する。(神仙秘旨) 【腰脊の引痛】蒺藜子を搗いて末にし、蜜で和して胡豆大の丸にし、

一日三回、酒で二丸づつを服す。(外臺祕要) 【全身の浮腫】杜蒺藜を湯に煎じて毎日

洗ふ。(聖惠方) 【突然五尸に感染したもの】蒺藜子を搗いて末にし、蜜で胡豆大の丸

にし、一日三回、二丸づつを服す。(肘後方) 【大便風秘】蒺藜子を炒つて二兩、豬牙

皂莢を皮を去り酥で炙いて五錢を末にし、一錢づつを鹽茶湯で服す。(普濟方) 【月經

不通】杜蒺藜、當歸等分を末にし、三錢づつを米飲で服す。(儒門事親) 【分娩を催し、

胞衣を下す】難産で胎兒が腹中に在るもの、并に胞衣の下らぬもの、及び胎兒の死

亡せるものには、蒺藜子、貝母各四兩を末にし、米湯で三錢を服す。少頃して下

らぬときは再服する。(準師方) 【蛻蟲の心痛】清き水を吐くには、七月七日に蒺藜子

を採つて陰乾し、方寸匕づつを一日三回服す。(外臺祕要) 【萬病積聚】七八月に蒺藜

子を探收し、水で煮熟して曝乾し、蜜で梧子大の丸にし、七丸づつを酒で服し、反

應のあるを度とする。その汁をば飴のやうに煎じて服す。【三十年の失明】補肝散

(九)大綱二三錢チ一
匙二作ル。

二〇大觀ニ熬搗ヲ作
灰ニ作ル。

——蒺藜子を七月七日に採つて陰乾し、搗いて散にし、一日二回、方寸匕を食後に

水で服す。（外臺祕要）【牙齒の動搖】疼痛するもの、及び動くものには、杜蒺藜を角

を去り、生で研つて五錢を淡漿水半盃に蘸し、鹽を入れ温めて漱げば甚だ效がある。

また根を灰に焼いて牙に貼れば固くなる。（御藥院方）【牙齒の出血】出血止まずして

動搖するには、白蒺藜末を毎早朝擦る。（道藏經）【牙が動いて疼くもの】蒺藜の子、

或は根を末にして日毎に揩（瑞竹堂方）【鼻塞で水を出すもの】多年嗅覺を失へる

には、蒺藜二握を道路に置いて車に碾かせ、水一大盞で半盞に煮取り、仰臥して先

づ口一ぱいに飯を含み、その汁一合を鼻から灌ぐ。二回灌いだけで嚏を出し、其

に赤蛹蟲に似た息肉一兩箇を噴出して癒える。（聖惠方）【顔の癰痕】蒺藜子、山梔子

各一合を末にして醋に和し、夜塗つて朝洗ふ。（救急方）【白癰風】白蒺藜子六兩を生

で搗いて末にし、一日二回、二錢づつ湯で服す。一箇月で根を絶ち、半箇月で白い

處に紅點が現はれる。神效あるものだ。（孫真人遺思）【一切の丁腫】蒺藜子一升を、〇

熬つて搗き、醋で和して腫の頭を封ずれば根が抜ける。（外臺祕要）

花【主治】【陰乾して末にし、温酒で二三錢づつを服すれば白癰風を治す】（宗奭）

苗 主 治 【煮た湯で疥癬、鼠瘡の瘻を洗ふ】（時珍）

附 方

舊二、新一。

【鼻から清涕を流すもの】 蒺藜苗二握、黃連二兩、水二升を一升到煎じ、少しづつ鼻から灌いで嚏を出す。再服を過ぎずして效がある。（聖惠方）

【諸瘡腫毒】 蒺藜の蔓を洗つて三寸に截ち、水五升で二升到煮取つて滓を去り、銅器に入れてまた一升到煮取り、小さい器で煮て飴のやうにし、腫れた處へ塗る。（千金方）

【蠅螬尿瘡】 瘡が全身に瀾漫すれば死亡する。蒺藜葉を搗いて傳ける。葉が無ければ子を用ゐる。（二）（備急方）

（一）大觀ニ外臺祕要ニ作ル。

穀 精 草 （宋 開 寶）

和 名 はしくさ、みつたせむつ
學 名 Eriogonon Sieboldianum, Steud.
科 名 はしくさ科（穀精草科）

釋 名

戴星草（開寶） 文星草（綱目） 流星草 時珍曰く、田に生ずる穀物の

餘氣から生えるといふので穀精といふ。志曰く、白い花が星に似てゐるところから戴星などの諸名がある。

集 解

頤曰く、處處にある。春穀物を作る田に生え、葉、莖俱に青く、根、

（一）牧野曰フ、此ニ舉ゲタ穀精草ハ今日吾人ノ品種ヲ定ムルヤウナ微チ穿ツ的ノモノデナク、凡ソ同様ナ姿チシテ居ルモノナ一様ニ見做シテノ名デアラウ。其レ故コレハ必ズシモ一種ニ限ラレタ名デハナイト思フノガ穩カナ見デアル、今植物

名實圖考卷ノ十四ノ
圖ヲ參考トシテ、先
ヅ我邦ニモ又支那ニ
モ産スルはしくさ即
チ下ニ記スル學名ノ
モノト定メテ置ク
E. australis, T. Jir.
ハ支那南方所産ノ種
ユエ今之レヲ避ケテ
置ク。
(一) 秦州、隴州ハ山
草類胡黃連秦隴ノ註
參照。
(二) 江湖ハ山草類薺
胡ノ註ヲ見ヨ。
(三) 稻草ノ初生ヲ云
フ。



〔草 精 穀〕

花はいづれも白色だ。二月、三月に花を採る。花は
白く、小さく圓くして星に似たものを用ゐる。この
草で馬を飼へば肥え、虫類毛焦の病に主效がある。
又、莖梗が長く、節があり、根の微し赤い一種があ
つて、(三) 秦州、隴州地方に出る。

時珍曰く、この草は穀物を刈取つた後の荒田に生えるもので、(三) 江湖の南北に多
い。一種叢生のものがあつて、葉は、嫩穀秧に似て細い莖が引き出で、高さ四五寸
になり、莖の端に點點として星の亂れたやうな小さい白花がある。九月花を採つて
陰乾するものだ。二三月に採るといふは誤である。

花 氣味

〔辛し、溫にして毒なし〕 藏器曰く、甘し、平なり。大明曰く、
水銀を砂子に結晶せしめ得るものだ。主 治 〔喉痺、齒風痛、諸瘡疥〕 〔開寶〕 〔頭

風痛、目盲翳膜、痘後の生翳。血を止める〕 時珍

發 明

時珍曰く、穀精は、體輕く、性浮であつて、能く陽明の分野に上行す
る。凡そ目中の諸疾を治するに加へて用ゐるが甚だ良し。目を明かにし、翳を退け

る功力は、菊花以上のものであるらしい。

附方

舊一、新七。

【腦痛、眉痛】穀精草二錢、地龍三錢、乳香一錢を末にし、

半錢づつを煙に燒き、その痛の左右に隨つて筒で鼻を薰ずる。（聖濟錄）【偏正頭痛】

集驗方では、穀精草一兩を末にして白麪糊で調へ、切つて紙に攤のして痛む箇所へ貼

り、乾けば換へる。○聖濟方では、穀精草末、銅綠各一錢、硝石半分を、痛の左右

に隨つてその方の鼻から嚙くふ。【鼻衄】止まぬには、穀精草を末にし、熟麪湯で二

錢を服す。（聖惠方）【目中の翳膜】穀精草、防風等分を末にして米飲で服す。甚だ效

驗がある。（明目方）【痘後の目翳】隱澀して涙を出し、久しく退かぬには、穀精草を

末にし、柿、或は豬肝片ちよかんへんにつけて食ふ。ある方では、蛤粉等分を加へ、共に豬肝中

に入れて煮熟し、日毎に食ふ。またある方は夜明沙の條に載せてある。（邵真人濟急方）

【小兒の雀盲】日暮になると忽ち物が見えなくなるものである。羯羊肺けつやうはい一頭分を水

で洗はずに竹刀で剖開し、穀精草一撮を入れて瓦罐で煮熟し、日毎に食ふ。屢々效

驗を舉げた。鐵器を忌む。もしそれが食へぬものは、炙熟して搗き、綠豆大の丸に

して三十丸づつを茶で服す。（衛生家寶方）【小兒の暑氣中しきちゆうり】吐し、泄し、煩渴する

には、穀精草を焼いて性を存し、器を覆^{かぶ}せて置いて冷し、末にして冷米飲で半錢づつを服す。(保幼大全)

(一) 海金沙 (宋嘉祐)

和名 つるしのぶ、かにくさ
學名 *Lygodium japonicum*, Sw.
科名 ふさした科(海金沙科)

(一) 牧野曰フ、我邦ニモ多キ蔓生羊齒デアル、藥用ニハ其胞子ヲ用ヅル。

釋名


竹園萎^〇 時珍曰く、その色が黄で細沙のやうなものだ。その名稱に海

なる文字を冠したのは、神聖視した意味である。俗に竹園萎^{ちくふんすゐ}と名けるのは葉の形の形容だ。

集解

禹錫曰く、(一) 黔中郡に産し、湖南にもある。(二) 初生は小さい株にな

(一) 黔中ハ山草類白及ノ漢黔ノ註參照。
(二) 初生、大觀ニ據テ補フ。



(沙 金 海)

り、高さは一二尺のものだ。七月その草の全科を日中に暴し、少し乾いた時、紙の上に置いて杖で叩^{たた}けば細沙が紙に落ちる。落ち盡さるまで幾度も暴して叩く。

時珍曰く、江浙、湖湘、川陝にいづれもあ

(四) 砂トハ丹砂チイ
フカ。賀トハ錫チイ
フ。

る。山の林下に生えるもので、莖は線のやうに細く、竹や木の上に引き掛り、高さ一尺ばかり、葉は細く、團菱の葉のやうで甚だ薄い。表裏共に青く、表面に皺文が多く、その皺に蒲黃粉のやうな黄赤色の沙子がある。花は開かない。根は細くして堅く強い。その沙、及び草は皆薬用になる。方士はその草を採つて汁を取り、(四)砂を煮、賀を縮する。

氣味

【甘し、寒にして毒なし】

主治

【小腸を通利する。厄子、馬牙硝、

蓬沙を配合すれば、傷寒熱狂を療す。或は丸にし、或は散にして用ゐる。】(葉祐) 【濕熱腫滿、小便熱淋、膏淋、血淋、石淋、莖痛を治し、熱毒氣を解す】(時珍)

發明

時珍曰く、海金沙は、小腸、膀胱の血分の薬であつて、熱が二經の血分にあるものに適する。

附方

舊一、新五、

【熱淋急痛】海金沙草を陰乾して末にし、生甘草の煎湯で二

錢を調へて服す。これは陳繼領の方である。あるひは滑石を加へる。(夷堅志) 【小便

不通】臍下の滿悶するには、海金沙一兩、臘ろう茶なんぢや半兩を搗う碎さいき、一日二回、三

錢づつを生薑、甘草の煎湯で服す。末にして服するもよし。(綱鑑本草) 【油のやうな

(五) 南、大觀ニ面ニ
作ル。

膏淋】海金沙、滑石各一兩、甘草梢二錢半を末にし、一日二回、二錢づつを麥門冬の煎湯で服す。(仁存方) 【痛み澀る血淋】ただ水道を利すれば清濁自から分れて出る。海金沙末一錢を新汲水、或は砂餅水で服す。(普濟方) 【脾濕腫滿】腹が鼓のやうに脹り、喘して横臥し得ざるには、海金沙散——海金沙三錢、白朮四兩、甘草半兩、黑牽牛の頭末一兩半を末にし、一錢づつを倒流水で煎調して服す。利を得ること妙である。(東垣蘭室秘藏) 【黒く變じた痘瘡】腎に歸したものだ。竹園荑草ちくゐんすいそうを酒で煎じ、その身體に傅ければ直ちに發起する。(直指方)

(一)牧野曰フ、集解ノ文甚ダ簡略デアアル故ニ能クハ分ラナイガ故ニ先輩ノ充テシモノニ從ツテ置テ、植物名實圖考卷ノ十四ニモ地楊梅ノ圖ハ別ノモノデアアル。(二)大觀ニ衰ニ作ル。



(一)地楊梅 (拾遺)

和名 すずめのやり、すずのひえ(同名がある)
學名 *Luzula campestris*, DC. var. *capitata*, Miq.
科名 め 科(燈心草科)

集解

藏器曰く、江東の濕地に生ずる。苗はさ沙

〔梅 楊 地〕

草さうのやうなものだ。四五月に楊梅に似た子がなる。

氣味

【辛し、平にして毒なし】主 治

白痢には、莖、子を取つて湯に煎じて服す【藏器】

(一) 水楊梅 (綱目)

和名無し
學名未詳
科名未詳

釋名 地椒

集解

時珍曰く、水邊に生ずるもので、枝、葉が甚だ多く、楊梅のやうな形

狀の子がなる。庚辛玉冊に『地椒、一名水楊梅。多く近道の陰濕の場所に生え、荒



〔水楊梅〕

田、野中にもある。叢生で、苗、葉は菊に似てゐる。莖の端に黄色の花を開き、實は椒のやうだが、赤くない。實は三承を結し、三黄、

白礬を結し伏し、丹砂、粉和を制し得る』とある。

氣味

〔辛し、溫にして毒なし〕

主治

〔疔瘡腫毒〕〔時珍〕

(二) 地蜈蚣草 (綱目)

和名無し
學名未詳
科名未詳

(一) 牧野曰フ、水楊梅ヲ堇菜ハいばら科(薔薇科)ノだいこん科(Geum japonicum Yumb.)ニ充テ居レドモ中ウス、今集解ノ文ヲ玩味シテ見ルトウマのあしがた科(毛茛科)ノきつれのぼたん(Ranunculus japonicus Tang.)ニ彷彿スル所モアレド亦其レトモ定メ難イ。
(二) 承字類纂ニヨリ補入ス。
(三) 木村(康)曰ク、だいこんさうノ根ハ加水分解ニヨリデカイザノールヲ生ズル配糖體ヲ含有ス、此配糖體ハ西洋だいこんさうニ含有セラルルゲイント同一物ナラン。
(四) 牧野曰フ、地蜈蚣ハ其品別然セス、

くるちや (Thymus raticans, Sieb.)
ノ幼木小葉ノモノ
ヤサニモ想像シ得ラ
ルガ之レハ草木デ
ナイカラ無論ソレデ
ハナカラサ。
(C) 堀ノ堀ニ同ジ字
ニシテ水増ナリトア
リ、提テ云フ。

集解

時珍曰く、村落の^{つちうち}墜地や野に生え、左の蔓は右に延び、右の蔓は左



【蛇 蜈 地】

に延び、葉は密生して對生し、蜈蚣^{ここう}の形のやうで、その穂も長いものだ。俗にこれを過路蜈蚣と呼び、樹に延び上るものを飛天蜈蚣と呼ぶ。根、苗いづれも用ゐる。

氣味

【苦し、寒にして毒なし】

主治

【諸毒を解し、また大便不通を治す。搗汁は癰腫を療ず。

搗いて塗り、并に末にして服すれば、よく毒を消し、膿を排す。蜈蚣傷には、鹽少量を入れて搗いて塗り、或は末にして傳ける】^{時珍}

附方

新二。

【一切の癰疽^{ようそ}】及び腸癰、乳癰の赤腫してまだ破れぬもの、或は

已に破れても膿血が散ぜず、發熱し、疼痛して能く蝕するもの、いづれも膿を排するがよし。托裏散——地蜈蚣、赤芍藥、當歸、甘草等分を末にし、二錢づつを溫酒

で服す。(和劑局方)


(一) 半邊蓮 (綱目)

和名 みぞかくし、あぜむしろ
學名 *Isobelia raiensis*, Thunb.
科名 きさやう科 桔梗科)

集解

時珍曰く、半邊蓮は小草であつて、陰濕の埜塹の邊に地に就いて生え

(一) 牧野曰フ、普通ニ野外田間に見ラルル小草デ、其花冠一方ニ偏シ半邊蓮ノ名ヲ得テ頗ル妙ナルヲ思ハシムル、此屬中ニハるヘリあさう (*I. inflata*, L.) ノ毒草ガアル、之レハ北米ノ原産デアルガ屬中ニ此ノ如キモノガアルヲ見レバ、或ハ此半邊蓮ニモ有毒成分ガアルカモ知レヌト思フ。



〔蓮 邊 半〕

る。細い梗が蔓を引き、節節から細葉が生え、秋小さい淡紅紫色の花を開く。それが蓮花の半片のやうな形だからかく名けたものだ。また急解索きんげさくとも呼ぶ。

主治

【蛇虺傷には、搗いてその汁を飲み、滓で傷處を塗り圍む。又、寒麝氣喘、及び瘡疾寒熱を治するには、雄黃と各二錢を搗き、盃の内側に泥つてその盃を覆せ、色の青くなるを待つて飯で梧子大の丸にし、九九づつを空心に鹽湯で服す】時珍

氣味

【辛し、平にして毒なし】

壽域方にある。

(一) 紫花地丁 (綱目)

和名 いねげんげ、たちげんげ
學名 *Trichostema multiflorum*, Bunge.
科名 まめ科 (豆科)

釋名

箭頭草 (綱目) 獨行虎 (綱目) 羊角子 (秘鑑) 米布袋

集解

時珍曰く、處處にある。

葉は柳に似て微し細く、夏紫色の花を開いて角を結ぶ。平地に生えるものは莖が起ち、溝

渠の邊に生えるものは莖が出る。普濟方に『田舎の村落に生えるもので、夏、秋に小さく白い鈴のやうな倒に垂れた花を開き、葉は微し木香花の葉に似たものだ』とあるが、しかし、これは紫花とある名稱と齟齬する。恐らくは別の一種であらう。



[紫花地丁]

氣味

【苦く辛し、寒にして毒なし】

主治

【一切の癰疽、發背、疔腫、

(二) 牧野曰フ、從來我邦に紫花地丁ナシ
みれ (Vicia Ichimi,
DC. var. elionensis,
Maxim.) トシテ居レ
ドモ申ラヌ、此いね
げんげハ支那ニテハ
普濟品ナルケレド
我邦ニハ産セヌ、歐
羅本草卷ノ七ニ米布
袋ノ名ヲ註圖ガアル
植物名實圖考卷ノ十
二ノ圖ハ右ノ救荒本
草ノ圖チソノママ移
シタモノデアラ。

癰癰、無名腫毒、惡瘡（時珍）

【附方】

新八。

【黃疸內熱】地丁末三錢を酒で服す。（乾坤秘蘊）

【稻芒たうぼうの咽に粘

つたもの】出ぬときは、箭頭草せんとうそうを嚼んで嚥み下す。（同上方）

【癰疽惡瘡】紫花地丁を

根のままと蒼耳葉等分を搗き爛らし、酒一鍾を攪ぜてその汁を服す。（楊誠經驗方）【癰

疽發背】及び無名諸腫に貼る。神の如きものだ。紫花地丁草を三伏の時に採り、白

麪で和して鹽醋に一夜浸して貼る。昔ある尼が發背に罹り、夢にこの方を得て數日

にして瘥えた。（孫天仁集效方）

【一切の惡瘡】紫花地丁根を日光で乾し、罐に入れて烟

に燒き、瘡に向けて薰する。黃水を出し盡して癒える。（衛生易簡方）【癰癰、丁瘡】發

背諸腫。紫花地丁根を粗皮を去つて白茯苓と共に末にし、油で和して塗る。神效が

ある。（乾坤秘蘊）

【丁瘡腫毒】千金方では、紫花地丁草の搗汁を服す。極めて重きも

のと雖も效がある。○楊氏方では、紫花地丁草、葱頭ネギづつ、生薑を共に搗いて貼る。癰

瘡ならば、新しい黒牛尿を加へる。【喉痺腫痛】箭頭草葉に醬少量を入れて膏に研

り、點入して吐く。（普濟方）

(一) 乾野曰フ、鬼針草ハ下ニ記入セルヤウニこそんだんぐさデアル、せんだんぐさ (Tr. bipinnata, L.) ト姉妹ノ種デ共ニ原頭ニ生ジテ居ル、支那ニハ此兩品トモ産ミ且兩者酷ク能ク似テ居ルカラ、せんだんぐさノ方モ同ジク見テ鬼針草ト謂ツテ居ルデアラウト思フ從來ノ本草家ハ此鬼針草ヲせんだんぐさトシテ居ルガ、此せんだんぐさノ中ニハ吾人ガ今日稱スルこそんだんぐさモ一緒ニナツテ居ルデアラウト想ハレル。

(二) 牧野曰フ、先輩此獨用將軍ヲすひかづら科(忍冬科)ノツキヒキヤク (Tetracera sinensis) 云々ニ充テテ居ル

(二) 鬼針草 (拾遺)

和名 こそんだんぐさ
學名 *Bidens pilosa*, L.
科名 きく科(菊科)

集解

藏器曰く、池畔に生えるもので、莖が四角で葉に釵脚さきづめのやうな種子あしがあり、針のやうに人の衣服に著く。北方ではこれを鬼針といひ、南方では鬼釵きしといふ。

氣味

【苦し、平にして毒なし】

主治

【蜘蛛、蛇の咬傷には、杵いて汁

を服し、并に傳ける】(藏器) 【蠍しかの傷に塗る】(時珍)

附方

新二。

【爪を割いて肉を傷めたもの】瘡えぬには、鬼針草の苗、鼠粘子の根を搗き、その汁を臘猪脂に和して塗る。(千金)

(三) 獨用將軍 (唐本草)

和名 無し
學名 未詳
科名 未詳

集解

恭曰く、林野中に生えるもので、節節から葉の心を通つて苗が生える。

葉は楠に似たものだ。時期に拘はらず、根、葉を採つて用ゐる。

氣味

【辛し、毒なし】主 治 【毒腫、乳癰^{にゅうよう}。毒を解し、惡血を破る】(恭)

附 方

新一。

【下痢禁口】獨將軍草の豆のやうな珠のある根の珠を取り、搗汁三匙を白酒半盃に和して服す。(簡便方)

附 錄

(一)留軍待

恭曰く、(二)劍州の山谷に生ずる。葉は楠に似て細く長い。

採收に一定の時期はない。味辛し、溫にして毒なし。肢節の風痛、打傷の瘀血^{おけつ}、(三)五緩攀痛に主效がある。

(一)見腫消 (宋圖經)

和名無し
學名未詳
科名未詳

集 解

頌曰く、(二)筠州^{さんしゅう}に生ずる。春苗が生え、葉、莖は紫色で高さ一二尺、

葉は桑に似て表面が青紫赤色に光る。採收に一定の時期はない。

氣味

【酸く澀し、微毒あり】

主 治

【癰腫、及び狗咬^{くわう}には、葉を搗いて

貼る】(蘇頌)

か中ツテ居ナイ、其レハ其草狀ハ彷彿トシテ凡ソ其レヲシタモ見ラルルガ其根ニ豆ノヤウナ珠ガナイカラ違フ、要スルニ今ノ處何ノ草ダカ能ク判ラヌ。
(一)牧野曰フ、留軍待ハ何ナ草カ全ク判ラヌ。
(二)劍州ハ金部鉛ノ註ヲ見ヨ。
(三)五緩ハ五軟ノコトカ、頭項軟、手軟、脚軟、身軟、口軟是ナリ。
(四)牧野曰フ、植物名實圖考卷ノ九ニアル見腫消ノ圖ハぶだう科(葡萄科)ノぶだうテハナイカト思フ、又同書卷ノ十五ニアル同名ノ圖ハ唇形科ノみづかうじゆ一名ゆきみさうノ根生葉トモ見ラルルガ

多分何カ別ノ植物デア
アラウ、又ヘンリー
氏ハいふきすみれ

(*Viola mirabilis*, L.)

ヲ見腫消ト記シテ居

ルガ本書ノ品デハナ

イ、本書ニ脱々所ノ

モノハ上ノ三品トハ

別ノ何物カデアアラウ

ト思ヘド、集解ノ行

文頗ル簡略デア委シク

其草狀ヲ模索スル事

が出來ヌ其レ故何ノ

草ガカ刺ラヌ。

(一) 蜀州ハ山草類仙

茅ノ註ヲ見ヨ。

(二) 一握、本經逢原

ニ據ル。

(三) 本經逢原ニ苧根

トアリ。

(四) 本經逢原ニハ錢

下ニ白蜜少許ノ四字


アリ。

(五) 乾野曰フ、攀倒

甌ハナトこめし(*Tri-*

tritia villosa, Juss.)

ニ酷似セルモノデア



【消腫見】
——州 蜀——



(一) 攀倒甌 (圖 經)

附方 新二。【一切の腫毒】及び傷

寒の殘毒が耳の前後、及び項下に發した
硬腫には、見腫消草一握、生白及、生白
斂、土大黃、生大薊根、野苧麻根を搗い
て餅にし、芒消一錢を入れ、腫頭を殘し
て貼り、乾けば易へる。金線重樓、及び
山慈姑を加へるが就中妙である。(傷寒編要)

和名無し
學名 *Patrinia* sp.
科名 おみなへし科(敗醬科)

集解 頤曰く、(一)宜州の野原に

生ずる。莖、葉は薄荷のやうだ。一名
斑杖、一名接骨といふ。時珍曰く、
この杖のつく名は虎杖と同じく、接骨

といふ名は蒟醬と同じであるが、これは一類の物なりや否や判然せぬ。

氣味 【苦し、寒にして毒なし】

主治 【風熱の煩渴、狂躁を解利するには、搗いてその汁を服するが甚だ效


がある】類

ヤガ、其花ハ小サク
チ葉白色デ葉末ノ如
シトアルカラ無論な
とこゆレデハヤイ。
(三)宜端ハ石部丹砂
ノ註ヲ見ヨ。
(四)大觀ニ杜下ニ莖
ノ字アリ。
(五)大觀ニ骨下ニ草
ノ字アリ。

(一)牧野曰フ、水甘
草ハ集解ノ文略ニ過
キ何ノ草カ分ラズ、
植物名實圖考卷ノ十
四ニ圖アレド要領ヲ
得ス。

(二) 水甘草 (圖 經)

和名無し
學名未詳
科名未詳



〔草 水〕
甘 武
— 當 —

集解

頤曰く、筠州に生ずる。多く

きんじょう

は水邊にあるもので、春苗が生え、莖は青く葉は柳のやう、花はない。その土地では十月、八月に採る。單用するもので、他の多くの藥には入れない。

氣味

【甘し、寒にして毒なし】

主治

【小兒の風熱、丹毒には、甘草と共に煎じて飲む】（蘇頌）

本草綱目草部第十六卷 終



本草綱目草部

第十七卷 上

本草綱目草部目錄第十七 卷上

草の六 毒草類四十七種

大黃 本經

商陸 本經

狼毒 本經

防葵 本經

狼牙 本經

蘭茹 本經

大戟 本經

澤漆 本經

甘遂 本經

續隨子 問寶

葇若 本經 卽ち天仙子。

雲實 本經

蓖麻 唐本 博落廻か附す。

常山 蜀漆 本經 杜莖

山、土紅山か附す。

黎蘆 本經 山慈石、參果根、馬腸根か附す。木黎蘆 拾遺

附子 本經

天雄 本經

側子 別錄

漏籃子 綱目

烏頭 本經

白附子 別錄

虎掌 本經

天南星 問寶

山跋 別錄

蒟蒻 問寶 菩薩草か附す。

半夏 本經

蚤休 本經

鬼臼 本經

射干 本經

鳶尾 本經

玉簪 綱目

鳳仙 綱目

坐拏草 圖經 押不蘆か附す。

曼陀羅花 綱目

羊躑躅 本經

山躑躅、羊不喫草か附す。

芫花 本經

堯花 木經

醉魚草 綱目

莽草 木經

茵芋 木經

石龍芮 木經 卽ち胡椒菜。

毛茛 拾遺 海藟、陰命を附す。

牛扁 木經 虱建草を附す。

葶麻 綱經

格注草 唐本

海芋 綱目 透山根を附す。

鉤吻 木經

右附方 舊一百三十四 新四百九十五

草の六 毒草類四十七種

(一) 大 黄 (本經下品)

和名 だいわう
學名 *Rheum tanguticum*, (Maxim.)
科名 たぐく科(蓼科)

釋名

黄良(本經) 將軍(當之) 火參(吳普) 膚如(吳普) 弘景曰く、大黃

とはその色である。將軍なる號は、その駿烈、快速なるを表示したものだ。杲曰く、陳きを推し新きを致す功力が、禍亂を戡定して太平を致すやうなものだ。それが將軍の號ある所以である。

(二) 集 解

別錄に曰く、大黃は河西の山谷、及び隴西に生ずる。二月、八月

に根を採つて火乾する。普曰く、蜀郡の北部、或は隴西に生ずる。二月苗が卷いて生える。黄赤色だ。葉は四枚づつ對生し、莖は高さ三尺ばかりになる。三月黄色の花を開き、五月黒い實を結ぶ。八月根を採る。根には黄汁がある。切片して陰乾する。

(一) 牧野云フ、此大黃ノ原植物ハ蓋シ單ニ一種ノミデハナク其中ニ *Rheum tan-guticum* カラノモノモ亦 *Rh. officinale*, *Bail.* カラノモノモアラウ、或ハ又 *Rh. palmatum*, *L.* カラノモノモアリハセヌカト思フ、從來カラ云フからだいわう即チ *Rh. nudatum*, *L.* (西部シベリア原産) ハ我國ノ本草家が^カ大黃ト誤認シタモノデ、是レハ大黃屬ノモノデハアルガ眞ノ藥用ノ大黃デハナイ。

(二) 木村康曰ク、大黃ハ支那ニ於テハ既ニ太古ヨリ重要ナル藥品ノ一タリ、而シテ歐洲ヘモ古ヨリ渡來シ、殊ニ一七世紀ノ末葉ヨリ一八世

紀ノ始メニ當リテ露國政府之ヲ專賣品トシ、バイカル湖南方ノ恰古圖市ニ稅關ヲ設ケ、査定ヲ經タル大黃ハ之ヲイルグアイツクヲ經テモスカウニ輸送シ以テ全歐洲ニ供給セリ、從支那ノ海港開放サルルニ及ビ大黃ハ率ヲ海路歐洲ニ向ヒ、シベリヤヲ通過スル大黃ハ全ク其跡ヲ絶テリ。現今歐洲各國藥局方ノ採用スル純良支那產大黃ノ原植物ハ蓼科ニ屬スル *Rhizoma jeholunum*, L. ニシテ、支那ノ西部青海山岳地方ヲ中心トシ甘肅、四川、陝西、西藏ニ跨リテ產出ス、青海地方ニ於テ採集シタル所謂北方大黃ハ先ヅ甘肅省ノ西寧府ニ連バレ、此處ニ

弘景曰く、現に益州北部の汶山、及び西山で採るものは、河西、隴西の好きなもののやうではないが、それでもやはり紫地に錦色があり、味は甚だ苦く瀟く、色は至つて濃黒であつて、西川の陰乾したものは北部の日光で乾かしたものに勝る。また火乾したものもあつて、それは皮が少し焦げてゐて體裁はよくないが、蚌が付かず、久しく保存に堪へる。この藥は至つて勁く、利いものであつて、粗なるものは服用に適しない。

恭曰く、葉、子、莖、いづれも羊蹄に似てゐるが、ただ莖の高さ六七尺あつて脆い。味は酸く、生で食へる。葉は粗く長くして厚く、根は紅いものはやはり宿潤に似てゐるが、大なるものは太さ盃ほど、長さ二尺ほどのものもある。性は濕潤で蛙に壞られ易いが、火で乾かせば確なものだ。作るには、一寸位に横に截つて燒き熱した石の上へ載せて一日間燂き、微し燥いたとき孔を明け繩を通して乾すのである。今では宕州、涼州、西羌、蜀地に産するものが皆佳く、幽州、并州以北のものになるほど漸次に細く、氣力が蜀中のものに及ばない。陶氏が『蜀地のものは隴西のものに及ばぬ』といふは誤だ。

テ更ニ剥皮乾燥チ行
ヒ陝西省西安ヲ經テ
漢口ニ出ヅ、又西藏
及四川省ノ西部ヨリ
出ヅル南方大黃ハ先
ヅ四川省ノ松潘ニ出
テ、涇江チ下リ成都
嘉定ヲ經テ重慶ニ達
ス、漢口重慶ヨリハ
更ニ揚子江チ下リテ
上海ニ至リ此處ヨリ
世界各地ニ輸送ス。
(生藥學)

本材(漢)曰ク、漢藥
ニ唐大黃ト稱スルモ
ノアリ、其原植物チ
Rheum unifolium
L. ニ充ツルモ確實
ナラズ、支那ヨリ輸
入シ塞ラ漢法醫流ノ
賞用スル所ナリシモ
第四改正日本藥局方
ニ於テ之ヲ收載セラ
レタリ、支那產大黃
中幾分(例セバ湖北
省產)クRh. officina-
le, Faill, ヨリ取レ

藏器曰く、凡そ使用するには、用途を明に區別せねばならぬ。和厚にして深沈に病を攻めんとするには、蜀中產の牛舌片に似て緊つて硬いものを用ゐるがよく、瀉洩して駿烈快速に陳きを推し熱を去らんとするには、河西產の錦文のものを取るべきものである。



〔大 黃〕

べきものである。

頤曰く、今は蜀川、河東、陝西の州郡にいづれもあるが、蜀川の錦文のものを佳しとする。それに次ぐものは秦、隴から來るものだ、これは二番大黃といふ。その草は正月の内に生

え、葉は青く蓖麻に似て、大なるものは扇ほどある。根は芋のやうで大なるものは盤ほどあり、長さは一二尺ある。その細根は牛蒡の小なるもののやうでもあり、また芋のやうでもある。四月黄色の花を開き、また青、紅色で蕎麥の花に似たものもある。莖は青紫色で、形狀は竹のやうだ。二月、八月に根を採り、黒皮を去り、横片に切つて火で乾す。蜀の大黃は堅の片で牛舌のやうな形だから牛舌大黃といふ。

ルモノアランモ、其性狀ハ歐洲各國ノ藥局法ニ採用セル支那產純良種ニ一一致セズ。(生藥學)

木村(康)曰ク、和太黃ハ古來津輕大黃有名ナリ、現今奈良地方ニ栽培セリ、其原植物ハ蓼科ノからだいわニシテ市販品ハ徑一デ、メ、チ超エザル横斷片チナス。歐洲ニ於テ培養スル

大黃ニハ英國產、奧國產、佛國產等ノ諸種アリ、此等ノ大黃ハ粗惡品ニ屬シ醫藥ニ供スルヲ許サズ。(三)河西ハ山草類甘草ノ註、隴西ハ山草類徐長卿ノ註ヲ見ヨ。

(四)蜀郡ハ石部空青ノ蜀ノ註參照。

(五)益州ハ金部金ノ註、汝山ハ石部花乳

土番大黃も牛舌大黃も功用は相等しい。江淮に産するものをば土大黃といふ。二月花を開いて細かい實を結ぶ。

時珍曰く、宋祁の益州方物圖に『蜀の太山中に多くあつて、莖赤く、葉大きく、根は巨大にして盤ほどあり、藥種店ではその大なるもので枕を作る。紫地錦文だ。今は一般に莊浪の産を最上等としてゐる』とある。莊浪とは古の澤原であつて、隴西の地だ、別録の説と合致する。

正誤

頤曰く、（一）鼎州に（二）羊蹄大黃なる一種を産する。疥癢を治するに甚だ有效なものだ。初生の苗、葉は（三）羊蹄のやうで累年長大となり、その葉は商陸に似て狭く尖り、四月中に條が抽出で、穗が出て五七莖相合し、花と葉は同色で、結實は蕎麥のやうで軽く小さい。五月熟すると黄色になるので、金蕎麥などと呼んでゐる。三月苗を採り、五月實を採つて陰乾し、九月根を採る。この根を破つて見るとやはり錦文がある。これも土大黃と呼ぶものだ。

時珍曰く、蘇頌のいふその物は老羊蹄根だ。大黃に似てゐるので羊蹄大黃とはいふものの、事實は一類の植物でない。また一種の酸模は山大黃であつて、形狀は羊

石ノ註ヲ見ヨ。

(六)一書ニ西山ヲ四川ニ作ル。俱ニ四川ノ訛ナラン。四川ハ山草類ノ淫羊藿ノ註ヲ見ヨ。

(七)甄雅ニ云、錦繡之質ナ地ト曰フ。

(八)大觀ニ細ニ作ル。

(九)宕州、涼州ハ石部雄黃ノ註、幽州ハ山草類人參ノ註、并州ハ石部石髓ノ註ヲ見ヨ。

(一〇)文、大觀ニ紋ニ作ル。

(一一)牧野曰フ、土番大黃ハ其文ヲ按ズル

ニ大黃屬 (Rhomn)ノ一種デアツテ或ハ

Rh. palmatum, L.乎、蘭山ハ是レナシ

大黃トナシテぎし屬 (Rumex) ノカ

らすのあぶらトスルハ非デアアル。

(一二)蜀太山、或ハ蜀

蹄に似て山上に生える。所謂る土大黃とは或はこれを指したのであらうが、羊蹄そのものではない。いづれもその本條に記載してある。

根 修 治

雷曰く、凡そこれを使用するには、細切して水の渦卷いたやうな文のある緊つて重いものを片に剉み、午前十時から午後二時まで蒸して晒し乾かし、また臘水を洒いで午後二時から午後十二時まで蒸す。これを凡そ七回繰返して晒し乾してから、更に淡蜜水を洒いで再び一伏時の間蒸す。かくしてその大黃が黒い膏のやうになつてから晒し乾して用ゐる。藏器曰く、凡そこれを用ゐるには、蒸す場合と、生の場合と、熟する場合とある。一定の方法に依るとは限らない。承曰く、大黃は、採收した時に皆燒石で燂き乾すので、商品に生の物は全然ない。随つてこれを使用するにも更に多くの炮、炙、蒸、煮を必要とせぬ。

(一七) 氣 味

【苦し、寒にして毒なし】別錄に曰く、大寒なり。普曰く、神農、

雷公は苦し、毒ありといひ、扁鵲は苦し、毒なしといひ、李當之は大寒なりといふ。

元素曰く、味は苦し、氣は寒である。氣、味俱に厚く、沈にして降る。陰である。

これを用ゐるに、酒で浸して煨熟したものを用ゐるは寒因熱用であつて、酒で浸せ

山、即峨山チイフカ、未詳。

(二三) 莊浪ハ今ノ甘肅省涼州府ノ莊浪縣。

(二四) 鼎州ハ石部太一餘糧、石蒜ノ註ヲ見ヨ。

(二五) 牧野曰フ、羊蹄大黃ハ *Rhizoma* (ギシギシ屬) ノ一種デア

ルガ其種名ハ今能ク分ラズ。

(二六) 如羊蹄ノ三字大觀ニヨリテ補入ス。

(二七) 木村(庚)曰ク、成分ハクリソフアン

酸エモザン、イソエモザン、レイン、レナ

クリシン、其他アボ

レチン、エリトロレ

チンナル樹脂様體、

大黃鞣酸、鞣酸カル

ば太陽の經に入り、酒で洗へば陽明の經に入るものだ。その他の經に對しては酒を用ゐない。

呆曰く、大黃の苦は峻烈に下走するものだから、下の部分に對して用ゐるには必ず生で用ゐるのであるが、邪氣が上部に在る場合には、酒を用ゐなければ目的を達し得ない。必ず酒で浸して用ゐれば、最高の部分にまで藥力を導き上げて熱を驅り下す。最高頂上に在るものを射落して取るやうなものである。この場合、生で用ゐては最高部分に在る邪熱を取り残し、ために癒えて後に、或は目赤、或は喉痺、或は頭腫、或は膈上の熱疾が生ずるものだ。

時珍曰く、凡そ病の氣分に在るもの、及び胃寒、血虛、竝に妊娠、産後には、いづれも輕輕しく用ゐてはならない。この物は性が苦寒であつて、往往にして元氣を傷め、陰血を消耗するものだからである。

之才曰く、黄芩が使となる。畏れる物はない。權曰く、冷水を忌み、乾漆を惡む。

主治

【瘀血、血閉の寒熱を下し、癥瘕、積聚、留飲、宿食を破り、腸、胃を

蕩滌し、陳きを推し新しきを致し、水、穀を通利し、中を調へ、食物を消化し、五

狀ニ於テ存ス、大黃

ハ脂肪ヲ含有セズ、

大黃固有ノ香氣ハ恐

クハ揮發油ヨリ來ル

ナラン、灰分ハ四一

二〇%ヲ有シ極端ナ

ル數ハ四八%ヲ記載

セルモ何カノ誤ナル

ベシ。(生藥學一一

四)

P. J. 1835 (55)3

25; Arch. Ph. 19

07 (245)150, 080;

1918, 256)91; W.

P. 163; C. A. 19

24 (18, 1385; A. I.

P. T. 1918 (236)

913. Schw. Ap.

Zf. 1921 (59)169,

183; Schw. Woch.

Ch. Ph. 1906 (44)

161. 藥誌、二七

(一四九)六四八

三五二四、九九

四、三七(二六四)

一一九四(三三

四)二五〇、四四

臟を安定調和する【本經】【胃を平にし、氣を下す。痰實、腸間の結熱で心腹脹滿す

るもの、婦人の寒血閉脹で小腹の痛むもの、諸老血の留結を除く】(別錄)【婦人の月

經を通じ、水腫を利し、大、小腸を利す。熱腫毒に貼る。小兒の寒熱時疾の煩熱。

膿を蝕す】(甄權)【一切の氣を宣通し、血脈を調へ、關節を利し、壅滯水氣を泄す。

溫瘴、熱瘧】(大明)【諸種の實熱不通を瀉し、下焦の濕熱を除き、宿食を消化し、心

下痞滿を瀉す】(元素)【下痢赤白、裏急腹痛、小便淋瀝、實熱燥結、潮熱譫語、黃疸、

諸火瘡】(時珍)

發明

之才曰く、芍藥、黃芩、牡蠣、細辛、茯苓と配合すれば、驚、怒に因る心下の悸氣を療じ、消石、紫石英、桃仁と配合すれば、婦人の血閉を療ず。

宗奭曰く、張仲景の心氣不足の吐血、衄血を治する瀉心湯に、大黃、黃芩、黃連

を用ゐてあるに就いて、或る者は、心氣が既に不足して居る。而るに補心湯を用ゐ

ずして反對に瀉心を用ゐるは何故かとの疑問を懷くのであるが、これに對しては斯

く答ひ得る。若しその症狀が、單に心氣不足のみに止まるならば、吐血、衄血する

わけはないのである。この場合は、邪熱が不足に因つてそれに客するから吐血、衄

(三五三)四七九、
大、二(三七二)八
七、大、四(三九五)
二一。

(一八)本經ハ心ヲ指ス
モノナラン。

(二七)合ハ陰血ノ集
ル處ノ意カ。

(二〇)足ノ太陰ハ脾、
手ノ陽明ハ大腸、足
ノ陽明ハ胃、手ノ厥
陰ハ心、足ノ厥陰ハ
肝。

血せしめるのだ。苦を以てその熱を泄し、苦を以てその心を補ふは、つまり一舉兩得の方法だ。この病證の患者にこの方を用ゐれば必ず奏效するのである。ただ要はその患者の虛、實を量ることにあるわけだ。

震亨曰く、大黃の苦、寒はよく泄するものだ。仲景が瀉心湯を用ゐた場合は、正に少陰の經の不足なるに因つてであつて、(一八)本經の陽が甚だしく亢ぶり、孤立して相輔くる力を缺く結果、陰血が飛躍的な妄動を起したのである。故に大黃を用ゐて甚しく亢ぶるその火を瀉し去り、そして平衡調和を得せしめれば、血は經に安定して自から平安を得るのである。そもそも心の陰氣不足は單純なものでない。これは肺と肝とが俱にそれぞれ火を受けて病が構成されるのだ。故に黃芩では肺を救ひ、黃連では肝を救ふのである。肺は陰の主、肝は心の母、血の(二七)合であつて、肝、肺の火が退けば陰血はその舊態に復するのだ。寇氏は、この理論を明確にせずして『邪熱が客するからだ』といつてゐるが、それでは、いかで後人が仲景の理論的根據を明確に理會し得ようか。

時珍曰く、大黃なるものは(二〇)足の太陰、手、足の陽明、手、足の厥陰の五經の血分

の藥である。凡そ病が右の五經の血分に在る場合に用うべきものであつて、氣分に在る場合にこれを用ゐるは、何等罪過なきものに刑罰を加へると同一である。瀉心湯で治する心氣不足の吐血、衄血そのものは、眞心の氣の不足であり、手の厥陰——心、包絡、足の厥陰——肝、足の太陰——脾、足の陽明——胃の邪火の有餘であつて、瀉心とはいふものの、實は右の四經の血中の伏火を瀉するのである。又、仲景は、心下痞滿の患者で、按診して見て軟かなものを治するに、大黃、黃連瀉心湯を主として用ゐた。これもやはり脾、胃の濕熱を瀉したので、心を瀉したものではない。病が陰に發したものを反つて下す結果痞滿となるので、これは寒が營血を傷め、邪氣がその虛に乗じて上焦に結するのである。胃の上脘は心に在るから、心を瀉すといふが、實は脾を瀉するのだ。素問に『太陰の所致は痞滿と爲る』といひ、又『濁氣が上に在れば臍脹を生ずる』といふはこの間の消息をいふのである。病が陽に發したものに對し、反つて下せば結胸となる。乃ち熱邪が血分に陷入する。これもやはり病は上脘の分野に在るのだ。仲景の大陷胸湯、竝に丸にいづれも大黃を用ゐてゐるのは、やはり脾、胃の血分の邪を瀉してその濁氣を降するのであつて、結胸

が氣分に在る場合ならば、ただ小陷胸湯を用ゐる。痞滿が氣分に在る場合ならば、半夏瀉心湯を用ゐるのである。成無己の傷寒論の註釋も、やはりこの理論をば明確に了解してはゐなかつた。

成○無○己○曰く、熱淫の勝つ所には、苦を以てこれを泄す。大黃の苦は以て瘀熱を蕩滌し、燥結を下して胃(三)強を泄す。

(二)本草洞玄ニ強ヲ邪ニ作ル。

(二)大觀ニ輕ヲ而ニ作ル。

(二)大觀ニ腹ヲ痛ニ作ル。

頌曰く、本草に、大黃は陳きを推し新しきを致すもので、その效最も神なるものと推稱してあるところから、古方には積滯を下すに多くこれを用ゐ、張仲景が傷寒を治するに用ゐた處方に就中多いのであるが、古人が毒藥を用ゐて病を攻むるには、必ずその患者の虛實、寒熱に隨つて適當な處置を施したもので、一切(三)輕率には用ゐたものでない。梁の武帝は發熱したとき大黃を服まうとしたので、姚僧坦が『大黃なるものは甚だ鋭い藥である。陛下は御高年でもあり、輕輕しくはお用ゐにならぬがよい』といった。しかし帝は聽かなかつたので、非常に衰弱困憊し、危殆の状態に陷つた。梁の元帝は、嘗て心、腹の疾が持病で、醫師達はみな『平藥を用ゐて漸次に宣通すべきものであらう』と主張したが、僧坦は『脈は洪にして實してゐ

る、これは宿^{ふる}い妨^{さまたけ}があるのだから、大黃を用ゐる以外では瘥^いゆべき道理がない』
といつた。帝はその言に従つて遂に瘥えた。これ等の實例に照して言ふことだが、
今の醫師は一の毒藥を用ゐて多くの病に試み、偶然に的中すると、たちまちこの方
は神聖不可思議なものだなどと已惚^{うねほ}れて、そのま^まぐれ中^{あた}りまでに犯した幾多の誤か
ら起る用藥の過失には、口を拭つて一言もいはないが、警戒すべきことである。

附方

舊十四、新三十七。

【吐血、衄血】心氣不足の吐血、衄血を治するに主た
る瀉心湯——大黃二兩、黃連、黃芩各一兩、水三升を一升到煮取つて熱服し、通じを
付ける。（張仲景金匱玉函） 【吐血刺痛】川大黃一兩を散にし、毎服一錢を、生地黃汁一

合、水半盞を煎して三五沸し、時に拘はらず服す。（簡要濟衆方） 【傷寒痞滿】病が陰

に發したものを反つて下し、ために心下が滿して痛まず、按診して見て濡するもの

は痞である。大黃黃連瀉心湯を主とする。大黃二兩、黃連一兩を、麻沸湯二升到漬

けて須臾にして汁を絞り、二回到溫服する。（仲景傷寒論） 【熱病譫狂】川大黃五兩を

剉み、微し赤く炒つて散にし、臘雪水五升到膏のやうに煎じ、半匙づつを冷水で服

す。（聖惠方） 【傷寒發黃】方は上に同じ。○氣壯なるものには、大黃（二兩）一兩を水（五升）

（二兩）大瀉ニ一ニ作
ル。
（二升）大瀉ニ三升半ニ
作ル。

二升に一夜漬け、翌早朝、その汁を一升到煎じ、芒硝ほうせう一兩を入れて緩かに服す。須臾にして利下するものだ。（傷寒類要）【腰、脚の風氣】痛むには、大黃二兩を碁石ほどに切つて少量の酥すを和し、焦げぬやうに炒り乾かして搗き篩ひ、三錢づつを、水

（二六）片、大觀二兩ニ作ル。
（二七）大觀ニハ方上ニ後字アリ。

（二八）大觀二十五ニ作ル。

三大合に薑（二六）三片を入れて十餘沸煎じた湯で調へて空心に服す。冷膿、惡物を下して痛が止まる。（崔元亮海上方）【一切の壅滯ようたい】經驗（二七）方では、風熱積滯を治し、痰涎を化し、痞悶を治し、食物を消化し、氣を化し、血を導く。大黃四兩、牽牛子けんぎし半炒半生で四兩を末にし、煉蜜で梧子大の丸にし、十丸づつを白湯で服す。いづれも身體（二八）を害はない。もし徹し通じをつけんとならば（二九）一二十丸を増加する。○衛生寶鑑では、皂莢さうけふの熬膏で和して丸にする。これを墜痰丸つゐたんぐわん。又は全眞丸と名ける。金の宣宗は、これを服して效驗があつたので保安丸なる名稱を賜はつた。【痰が原因を爲したあらゆる病】滾痰丸こんたんぐわん——痰が原因を爲したあらゆる病を治す。ただ水瀉のもの、産前、産後には服してはならぬ。大黃を酒で浸して蒸熟し、切り晒して八兩、生黃芩八兩、沈香半兩、青礬石せいろうせき二兩を、焰硝二兩と共に砂罐に入れて固濟し、紅く煨つてから研末して二兩、以上を各末にし、水で和して梧子大の丸にし、一二十丸

を常服する。小病には五六十丸を、緩病くわんびやうには七八十丸を、急病には一百二十丸を温水で吞下し、直ちに横臥して動搖せぬやうにし、藥效が發生して上焦の痰滯を驅逐するを俟つ。翌日は先づ糟粕を下し、次の日は痰涎を下すものだ。なほ下らぬときは再服する。王隱君は、毎歲この藥四十餘斤を調合して數萬人の病を癒した。(養生主論)

【男女の諸病】無極丸——婦人の月經不通、赤白帶下、崩漏の止まぬもの、腸風下血、五淋、産後積血の癥瘕腹痛、男子の五勞、七傷、小兒の骨蒸潮熱等の證を治し、その效甚だ速である。この藥は六癸の日に合すがよし。錦紋大黃一斤を四分し、一分は童尿一盃、食鹽二錢に一日間浸して切り晒し、一分は醇酒一盃に一日間浸して切り晒してから、再び巴豆仁三十五粒と共に炒り、豆の黄になつたとき豆を取り去つて豆は用ゐない。一分は紅花四兩を漬けた水一盃に一日間浸して切り晒し、一分は當歸四兩と共に淡醋一盃に一日間浸して當歸をば取り去り、切り晒して末にし、煉蜜で梧子大の丸にし、五十丸づつを空心に溫酒で服す。惡物を取り下す效驗がある。まだ下らぬときは再服する。これは武當の高士孫碧雲の方である。(醫林集要)

【心腹の諸疾】三物備急丸——心、腹の諸疾で突然猛烈に發るあらゆる病を治す。大黃、

（二九）大觀ニ卒中チ中
惡ニ作ル。客忤ハ人
客又ハ異物ニアフト
キ驚キ忤ヘテ病ムナ
リ。
（三〇）停尸ハ氣絶ノコ
トナラン。

巴豆、乾薑各一兩を搗き篩ひ、蜜を和して一千杵搗いて小豆大の丸にし、三九づつを服す。凡そ（二九）卒中客忤^{（客忤）}で心、腹が脹満し、錐刀で刺すやうに痛み、氣急し、口噤^{（口噤）}し、（三〇）停尸^{（停尸）}し、卒死するものには、暖水、或は酒で服し、或は灌ぎ込む。なほ反應なきときは更に三九を服す。腹中が鳴轉して吐き下し、それで癒える。若し已に口噤して聞かぬものには、齒を折つて灌ぎ込む。喉さへ通れば癒える。この方は仲景の方であるが、司空裴秀^{（司空裴秀）}が、丸にするに及ばず、散にして用ゐるやうに改めたものだ。（圖經本草）

【腹中の痞塊】大黃十兩を散にして醋三升、蜜兩匙を和し、煎じて梧子大の丸にし、三十九づつを生薑湯で服す。吐利するを度とする。（外臺秘要）

【腹、脇の積塊】風化石灰末半斤を瓦器で炒つて極熱し、稍冷して大黃末一兩を入れて炒り熱し、桂心末半兩を入れて略ぼ炒り、米醋を入れて攪きまぜて膏にし、布にのして貼る。○またある方では、大黃二兩、朴硝一兩を末にし、大蒜^{（大蒜）}と共に搗き和して膏にして貼る。或は阿魏一兩を加へるが尤も妙である。（丹溪心法）

【積聚の久患】二便が通ぜずして上に心、腹を壓迫し、脹満して食を害ふ^{（害ふ）}には、大黃、白芍各二兩を末にし、水で梧子大の丸にし、一日三回、四十九づつを湯で服す。反應のあるまで服

(一) 無華ハ小兒ノ癰
 項ノ邊ニ生ズル結核
 ニシテ、痛サク轉動
 スルモノヲ云フ。
 (二) 閃癰トハ閃脂ノ
 コトカ、然リトスレ
 バ脂肪過多ノ病ヲ云
 フ。
 (三) 大觀ニ好ノ上ニ
 上字アリ。
 (四) 三、大觀ニ二ニ
 作ル。
 (五) 大觀ニ五ヲ銅ニ
 作ル。

す。(千金方) 【脾癰瘡積】 大人、小兒に拘はらず、錦紋大黃三兩を末にし、醋一盞で
 沙鍋に入れて文武火で熬膏し、瓦上に傾け移して三晝夜日光に晒し夜氣に露して再
 び研り、日本から輸入する琥珀のやうな形の硫黄一兩、官粉一兩と共に研りませ、
 十歳以下の小兒には半錢、大人には一錢半を米飲で服す。一切の生物、冷物、魚肉
 を忌む。半箇月間はただ白粥のみを食ふ。もし一服で癒えぬときは半箇月後に再服
 する。食物の禁忌を守り得ぬならば服せぬ方が勝しである。(聖濟總錄) 【小兒の(三) 無
 辜】 (三) 閃癰瘰癧、或は頭乾高聳し、或は乍ち痢し乍ち瘰癧等、さまざまの症狀を
 現はすには、大黃煎を主とする。錦紋の新しき實せる大黃九兩——微し朽ちたもの
 は使用に堪へぬ——を皮を削り去り、搗き篩つて散にし、(三) 好き米醋(三) 三升に和
 して(三) 瓦盃に入れ、大鍋の中で湯の上へ浮べて炭火で緩やかに煮て、丸にし得る
 ほどの膏になつたとき器に取つて貯へ、三歳の小兒には梧子大の丸七丸を一日とし
 て一日再服し、青赤色の膿の下出するを度とする。若し下らず、或は下る量の少い場
 合には、少し丸数を増加する。若し又下り過ぎれば数を減らす。重病のものも七八
 劑で根絶する。大人が用ゐてもよし。この藥はただ宿膿を下して小兒をして下痢さ

せない。毒物を食ふことは禁ぜねばならぬ。同時に乳母も食禁を守らねばならぬ。

ある方では木香一兩半を加へる。(崔知悌方)

【小兒の諸熱】大黃を煨熟し、黃芩と各

一兩を末にし、煉蜜で麻子大の丸にし、五丸乃至十丸づつを蜜湯で服す。黃連を加へて三黃丸と名けるものだ。(錢氏小兒方)

【骨蒸積熱】漸漸皮膚が黃になつて瘦せる

には、大黃四分を童尿五六合で四合に煎じ取り、滓を去つて空腹に二回に分服し、

人間が三十丁歩行する程の時間を隔て再服する。(廣利方)

【赤、白濁淋】好き大黃を

末にし、六分づつを雞子一箇の頂に孔を明けた中に入れて攪きませ、それを蒸熟し

て空心に食ふ。三服以内で癒える。(簡便方)

【相火祕結】大黃末一兩、牽牛頭末半兩

を用ゐ、三錢づつを、厥冷あるには酒で服し、厥冷無くして五心の煩するには蜜湯で

服す。(劉河間保命集)

【諸痢の初期】大黃を煨熟し、當歸と各二三錢、強壯者は各一兩を

水で煎じて服し、通じをつける。或は檳榔を加へる。(集簡方)

【熱痢裏急】大黃一兩

を半日酒に浸して煎じ服し、利を取る。(集簡方)

【突然喘いで悶絶するもの】言語不

能となり、涎を流し、吐逆し、牙齒を動搖し、出る呼吸が大きくなり、絶息しては

また蘇るものを傷寒併熱霍亂と名ける。大黃、人參各半兩、水二盞を一盞に煎じ、

熱服して安靜にする。（危氏得效方）【食後直ちに吐くもの】胸中に火あるためである。

大黃一兩甘草二錢半、水一升を半升到煮て溫服する。（仲景金匱玉函方）【婦人の血癰】

痛むには、大黃（金匱）一兩を酒二升で煮て十沸し、頓服して通じを付ける。（千金翼）【産

後の血塊】大黃末一兩、頭醋（つぎく）半升を熬膏（あうかう）して梧子大の丸にし、五丸づつを溫めた醋

に溶かして服するが良し、久しくして下るものだ。（千金方）【乾血氣痛】錦紋の大黃

を酒に浸し晒し乾して四兩を末にし、好き醋一升で熬膏して莢子大（けしだい）の丸にし、就寢

時に一丸を酒に溶かして服す。大便が一二行通じて紅漏が自から下る。調經の仙藥

である。或は香附を加へる。（董氏集驗方）【婦人の嫁痛】陰部の腫痛である。大黃一

兩を酒一升で煮て一沸して頓服する。（千金方）【男子の偏墜（へんた）】痛むには、大黃末を醋

に和して塗り、乾けば易へる。（梅師方）【濕熱眩運】熱當るべからざるには、酒で炒

つた大黃を末にし、二錢を茶清で服す。急するにはその標に對して治療を加へる。

（丹溪藥要）【小兒の腦熱】常に目を閉ぢたがるには、大黃一分を水三合に一夜浸し、

一歳の小兒は半合を服し、その殘餘をば頂上に塗り、乾けば再び塗る。（姚和衆至寶方）

【暴赤目痛（はつせきめくつう）】四物湯に大黃を加へ、酒で煎じて服す。（傳信適用方）【胃火の牙痛】口

に氷水一口を含み、紙撚に大黃末を蘸^つけて、痛む方の左右に隨つて鼻から嚙^すへば立
ろに止む（備^び四^し聖^{せい}方^{ほう}）『風熱牙痛』紫金散——風熱、積壅、一切の牙痛を治し、口氣
を去るに大いに奇效がある。好き大黃を瓶の中で焼いて性を存して末にし、朝、夕
牙に揩^すつて漱^{そく}ぎ去る。都下のある家でこの藥を專賣してゐるが、兩宮から常に錢數
千で買上げられ、門前市を作^なすといふ有様だ。（千金家藏方）『風蟲牙痛』齒齕^{しご}から常
に出血して漸次に崩落し、口の臭きものに極めて效がある。大黃を米泔に浸して軟
にし、生地黃と各々輪切りにし、一片づつ合はせて痛處の上に貼れば一夜で癒^ええ
る。なほ癒えぬときは再貼する。風を引き入れる處があるから談話するを忌む。（本
聖方）『糜爛^{びらん}する口瘡』大黃、枯礬^{こはん}等分を末にして擦り、涎を吐く（聖惠方）、『鼻中
の瘡』生大黃、杏仁を搗きませ、豬脂で和して塗る。○又ある方では、生大黃、黃
連各一錢、麝香少量を末にし、生油で調へて搽る（聖惠方）『仙茅^{せんぼう}の中毒』口からは
み出すほど舌が脹れる。方は仙茅の條下にある。『傷損瘀血』三因方では、雞鳴散
——高處よりの墜落、木石の壓傷、及び一切の損傷の瘀凝、積痛の忍び難きには、いづ
れも此の藥を用ゐる。陳を推し新を致すものだ。大黃を酒で蒸して一兩、杏仁を皮

を去つて二十一粒を細研し、酒一盃で六分に煎じ、雞鳴の時刻に服す。あすがた曉方に至れば

瘀血を取り下して癒える。○和劑方では、跌撲てつぼく、壓傷の瘀血が内部に在つて脹滿

するを治するには、大黃、當歸等分を炒つて研り、四錢づつを溫酒で服す。惡物を取

り下して癒える。『打撲傷痕』瘀血が滾注こんちゅうして、或は潮熱を起すには、大黃末を薑

汁で調へて塗る。一夜にして黒いものは紫になり、二夜にして紫のものが白くなる。

（瀕淵集補方）『杖瘡腫痛』大黃末を醋で調へて塗る。童尿でも調へる。（醫方摘玄）『金

瘡煩痛』大便の通ぜぬには、大黃、黃芩等分を末にして蜜で丸にし、一日三回、先

づ食事しょじを攝つてから水で十丸を服す。（千金方）『破れ爛れた凍瘡』大黃末を水で調へ

て塗る。（衛生寶鑑）『湯火傷』莊浪の大黃を生で研り、蜜で調へて塗る。痛みを止め

るのみならず、癰おんをなくする。これは金山寺の神人から傳授した方である。（洪遵夷堅

志

『飛蝶灸瘡』艾がで灸して火癰が取れてから、瘡内の鮮肉が蝶のやうな形の片に

なつて飛び去り、痛み忍び難きものは火毒である。大黃、朴硝各半兩を末にして水

で服し、通じを付ければ癒える。（張杲醫說）『蠅螻の咬瘡』大黃末を塗る。（醫說）

『火丹赤腫』全身に遍あまねきものには、大黃を水に磨つて頻りに刷く。（急救方）『腫毒の

初期】大黃、五倍子、黃蘗わうびやく等分を末にし、一日四五回、新汲水で調へて塗る。(簡便方)
【癰腫ようしゆの焮熱えんりつ】痛むものだ。大黃末を醋で調へて塗り、燥けば易へる。數回易へる内に退く。甚だ效驗顯著なる神方である。(肘後方)
【乳癰腫毒】全黃散——川大黃、粉草各一兩を末にし、好き酒で熬膏して取り收め、絹にのし瘡上に貼つて仰臥ぎやうがする。先に溫酒で一大匙を服す。翌日は惡物を取り下す。(婦人經驗方)
【大風癩瘡】大黃を煨いて一兩、皂角さうかくし刺一兩を末にし、方寸匕づつを空心に溫酒で服す。魚腦のやうな惡毒物を取り出すものだ。なほ取下さねば再服する。直ちに亂髮のやうな蟲を取下す。かくして惡毒物を取り盡したならば、雄黃ゆうわう、花蛇くふじやの藥を服する。これを通天再造散と名ける。(十便良方)

葉 氣 味

【酸し、寒にして毒なし】

主 治

【寢具の上敷の下に置けば虱しち蟲を辟ける】(相感志)

(一) 商 陸 (本經下品)

和名 やまぐし
學名 *Physocarpus eschultzei* Maxim.
科名 ばう科(商陸科)

(二) 牧野云フ、商陸ハ普通ニハ人家ニ植エラレテ居ル、偶ニ山地ニ野生ノモノナリ

見ルガ是レが果シテ
原カラノ野生カ疑ナ
キ能ハヌ、私ハ商陸
ハ元ト支那カラ渡シ
タモノデハナイカト
思ッテ居ル。

(二) 咸陽ハ濕草類地
黄ノ註ヲ見ヨ。

(三) 牧野云フ、此ニ
赤花ト云フモノ是レ
我邦ニ野生セルまる
みやま(マ)ばう (Tyl-
toluca japonica, Ma-
ackino.) ノ類似品デ
ハナイカト想像スル
ソシテ普通ノ商陸ト
ハ全然別種ノモノナ
ラント思フ、我ガま
るみのやま(マ)ばうハ
花紅色で實ノ熟セシ
時ハ果穂軸モ花梗モ
萼片モ特別ニ赤クナ

釋名

遼蕩 音は逐湯(チクタウ)である。當陸(開寶) 章柳(圖經) 白昌(開

寶) 馬尾(廣雅) 夜呼(本經) 時珍曰く、この物はよく水氣を逐蕩するものだ。故

に遼蕩といふ。それを訛つて商陸なまといひ、また訛つて當陸といひ、北方の發音で訛

つて章柳といふ。或は枝と枝とが相値あひあひ、葉と葉とが相當るものだから當陸といふ

ともいひ、或は多く陸路に當つて生ずるからだともいふ。

集解

別錄〇に曰く、商陸は咸陽かんやうの川谷に生ずる。人の形のやうなものには

不思議な功力がある。

恭曰く、この草には赤、白の二

種あつて、白いものを藥に入れる。


赤いものは鬼神を見るもので甚だ有

毒だ。

保昇〇曰く、所在にある。葉は大い

さ牛舌ほどで厚く脆い。赤花のもの

は根も赤く、白花のものは根も白い。



〔陸 商〕

ル、此品ハ偶ニ山地ノ人家ニモ栽エラレテ居ル。

(四) 大觀ニ種ニ作ル。

(五) 牧野云フ、我邦今日デモ其葉ヲ蔬ニシテ食スル、普通味噌汁ノ中ニ入レル。

(六) 線楞ハ縦翼。

二月、八月に根を採つて日光で乾す。

頤曰く、俗に章柳根と名けるもので、人家の園圃に多く生える。春苗が生え、高さ三四尺、葉は青く、牛舌のやうで長い。莖は青赤で至つて柔脆だ。夏、秋に紅紫色の花が朶をなして開く。根は蘿蔔のやうで長い。八九月に採る。爾雅にはこれを蓬藋ちくたうといひ、廣雅にはこれを馬尾といひ、易經にはこれを莧陸けんりくといつてある。

駿曰く、赤昌しやうなる一種は、苗葉は甚だよく似たものだが服してはならぬ。これは筋骨を傷め、腎を消耗する有毒のものだ。しかし、花の白い多年を経たものをば仙人が採收し、脯ほにして酒の肴にする。

時珍曰く、商陸は、昔は一般にこれも栽培して、蔬にして食つたものである。根の白いもの、及び紫色のものを取つて壁破し、畦を作つて種ゑるのであるが、子を蒔いてもよし。根、苗、莖、いづれも洗ひ蒸して食へる。或は灰汁で煮てもよし。丹砂、乳石を服した人が食へば就中利あるものだ。根の色の赤と黄とものものは有毒だから食つてはならぬ。按ずるに、周憲王の救荒本草には『章柳は、幹はやや雞冠花の幹に似て微し(六)線楞せんれうがあり、色は微紫赤だ。極めて栽培種植し易い』とある。

(七) 本材(康)曰ク、商陸ノ成分ハ未ダ明カナラズ、一種ノ樹脂ト比較的多量ノ硝石ト含有ス、彼ノフイトラツカトキシント命名セラレタル物質ハ商陸ニ含有サレズシテ、商陸ト錯誤シ易キ牛皮消(イケマ)根ノ成分ナルガ如シ。(生薬學) T. M. 1811(5)1256; 1892. 6)354; C. M. T. 1918 (33)471. 藥誌、明、二〇(五九九)三一、二一(八二)五八、二三(九八)二一四、三四(二二九)二六二。

根 修 治

數曰く、花の白いものの根を取り、銅刀で皮を刮り去つて薄く切り、東流水で二晝夜浸して漉出し、黑豆葉を一重に商陸一重を重ねて甑に架せ、正午から午後十二時まで蒸して取り出し、黑豆葉をば取り去り、曝乾して剉んで用ゐる。豆の葉のないときは豆を代用する。

氣 味

【辛し、平にして毒あり】別錄に曰く、酸し。權曰く、甘し、大毒あり。犬肉を忌む。大明曰く、白いものは苦し、冷である。大蒜と配合するがよし。赤いものは有毒だ。能く礪砂、砒石、雌黄を伏し、錫を抜く。恭曰く、赤いものはただ腫に貼るだけのもので、服すれば人體に害があり、痢血已まらずして人を殺し、人をして鬼神を見せしめる。張仲景曰く、商陸は水で服すれば人を殺す。杲曰く、商陸は有毒で、陽中の陰である。その味は酸く辛く、その形は人體に類し、その功用は水を療ずるに神の如き效がある。

主 治

【水腫、疝瘕、瘰癧、癰腫を除き、鬼精の物を殺す】(本經) 【胸中の邪氣、水腫、痿痺、腹滿して洪、直なるを療じ、五臟を疏し、水氣を散ず】(別錄) 【十種の水病を瀉す。喉痺で通ぜぬには、薄く切つて醋で炒り、喉の外部に塗る

(ハ) 腹ハ壁ノ誤。

(ニ) 十水病ハ肺ニ熱

水冷水ノ二病、脾ニ

黃水病、膽ニ鬼水病、

皮膚ニ食水病、腹ニ

飲水、心水ノ二病、

胃ニ肝水病、腎ニ勞

水病、心ニ清水病アル

ルヲ云フ。直指附遺

方)

(一〇) 大觀ニ用上ニ乾

字アリ。

(一一) 大觀ニ鯉上ニ生

字アリ。

(一二) 箴ハ磨額ニ龍ノ

屬トアリ。

が良し【(甄權)】大、小腸を通じ、蠱毒を瀉し、胎を墮し、腫毒を焼き、惡瘡に傳け
る【(大明)】

發明

弘景曰く、方家では甚だ用ゐない。ただ水腫の治療に、生の根を切
つて鯉魚に雜へ、湯に煮て服す。道家では散にして用ゐ、また煎にし釀して服す
るが、いづれも能く尸蟲を鬼神を見る病を去る。その實、子も神藥に入れる。花は
葛花と名け、就中良いものだ。

頤曰く、古の方術家は多くこれを用ゐ、やはり單服された。五月五日に根を採り、
竹に盛つて屋根の東北の角に懸け、百日の間陰乾して搗き篩ひ、井華水で調へ
て服す。これを『神仙祕密の法』といつてある。

時珍曰く、商陸は苦、寒であつて、沈であり、降であり、陰である。その性は下
行するもので、水を行ふことを特長とし、大戟、甘遂と性は異なるが効果は同一だ。
胃氣虛弱のものには用ゐられない。方家では、腫滿で小便不利のものの治療に、赤
根のものを搗き爛らして麝香三分を入れ、臍心に貼つて帛で縛帶する。それで小便
が利し腫が退くものだ。又、濕水の患者で、肉上を指で押し晝いて見て、指を放せ

〔三〕大觀ニ二三三
作ル。

〔四〕大觀ニ粒ヲ粟ニ
作ル。

〔五〕大小、大觀ニヨ
ル。

ばすぐ散つて跡に文の現はれぬものを治するに、白商陸、白附子を炒り乾かし、火毒を出して酒に一夜浸し、日光で乾して末にし、二錢づつを米飲で服す。或は大蒜だいさんを商陸と共に煮て汁を服するもよし。その莖、葉を蔬にして食つても腫疾を治す。嘉謨かみ曰く、古の讚に『其の味酸辛、其の形人に類す。水を療じ腫に貼り、其の效神の如し』とある。すべてはこの言に盡きてゐる。

附方

舊九、新六。

【濕氣脚軟】樟柳根しょうりゅうこんを小豆大に切つて煮熟し、更に綠豆と共に

に飯に炊いて毎日食ひ、瘡るを度とする。最も效がある。〔斗門方〕【水氣腫滿】外臺

祕要では、白商陸根を皮を去つて豆の大きさに切り、一大盞を水〔三〕二升で一升到煮取り、更に〔四〕粒米一大盞と共に煮て粥にし、毎日空心に服して微し通じを付ける。他のものを雜食してはならぬ。○千金髓では、白商陸六兩で取つた汁半合に酒半升を和し、患者の〔五〕大小を看て與へ服〔六〕す。水を利下して効果を擧げるものだ。○梅

師方では、白商陸一升、羊肉六兩、水一斗を六升到煮取つて滓を去り、葱そう、豉しを和して臠くにして食ふ。【腹中の暴癥】石のやうに覺える物があつて、啼き叫ぶほど刺痛するは、治療を加へねば百日で死亡する。商陸根を多量に取り、搗汁を取り、或は蒸

〔二六五〕戸ハ飛戸、通戸、風戸、沈戸、戸注ナリ。戸病ハ戸蟲トイフ想像的原因ニヨリ發スル病。
〔二七〕失表ハ病毒内攻ノ意。

し、腹上に布を敷いてその上へその藥を置き、覆はずに置いて冷えれば易へる。晝夜休めずに試みる。(孫真人千金方) 【石のやうな疥癬】脇下に在つて堅硬なるには、生商陸根汁一升に杏仁一兩を浸し、皮を去つて泥のやうに搗き、その杏仁泥に商陸汁を入れて絞り、それを火で煎じて錫のやうにし、每服棗ほどの量を空腹に熱酒で服す。惡物を利下するを度とする。(聖惠方) 【産後の腹大】堅滿し、喘し、横臥し得ぬには、白聖散——樟柳根三兩、大戟一兩半、甘遂を炒つて一兩を末にし、二三錢づつを熱湯で調へて服し、大便の宣利するを度とする。この藥は水に主たる聖藥である。(潔古保命集) 【二六五】戸の注痛】腹痛し、脹急し、息を喘ぎ得ず、上部に心胸を冒し、旁ら兩脅を冒して痛み、或は礫塊が涌起するには、商陸根を熬つて囊に入れ、更互に熨して效を取る。(肘后方) 【小兒の痘毒】小兒が痘を生ぜんとして發熱し、二七失表し、忽ち腹痛を起すもの、及び膨脹努氣する乾霍亂は、毒氣が胃氣と相搏つて出でんとして出づるを得ぬために起るのである。商陸根と葱白を搗いて臍上に傳ける。斑が止まり痘が出て危険を免れる。(摘玄方) 【突然の耳の熱腫】生商陸の尖を削つて中に入れ、一日二回易へる。(聖濟錄) 【突然の喉の攻痛】商陸を根を切り、炙熱して布を隔てて

(二八)大觀ニ食忌ニ作ル。

(二九)大觀ニ搗ノ上ニ切字アリ。

(三〇)大觀ニ孫眞人食忌ニ作ル。

(三一)大觀ニ僭ニ作ル。

(三二)大觀ニ誤ニ作ル。

(一)牧野云フ、滿洲デハたかとうだい科(大戟科)ノ Euphorbia Pulegioides, Thruza, ナ狼毒ト稱スルガ此書ノ狼毒トハ別ノモノデアラウと思フ、證類本草ノ石州狼毒ハ或ハ右ノ滿洲品ト同種カモ知レナイガ

熨し、冷えれば易へる。立ろに癒える。(圖經本草) 【瘰癧喉痺】攻痛するには、生商

陸根を搗いて餅にし、癰上に置いて上から艾炷で三四壯灸するがよし。(外臺秘要)

【一切の毒腫】章陸根に鹽少量を和して搗いて傅け、一日に二回づつ易へる。(孫眞

人(二千金方) 【石のやうな石癰(せきよう)】堅硬で化膿せぬには、生章陸根を搗いて擦る。燥け

ば易へて軟かくなるを度とする。また濕漏、諸癰(しよせつ)をも治す。(張文仲方) 【瘡傷水毒】

章陸根を(二九)搗いて炙り、布に裹んで熨し、冷えれば易へる。(二〇〇)千金方)

葛花 主治

【心が(二二)昏塞(こんそく)して多く物を忘れ、(二三)臥すことを好むには、花を

取つて百日間陰乾し、末に搗いて夕刻に方寸匕を水で服し、そのまゝ横臥する。考

へてゐた事、思ひ出さうとする事が睡眠中に明かに醒悟(せいご)する】(蘇頌)

狼 毒

(一)本經下品) 和名 無し (和名類聚鈔に「やまくさ」とあれど實物は何か別のものである) 學名 未詳 科名 未詳

釋 明

時珍曰く、名稱を觀ただけで毒なることが明瞭だ。

集 解

別錄に曰く、狼毒(ろうどく)は(二二)秦亭(しんてい)の山谷、及び(二三)奉高(ほうかう)に生ずる。二月、八月

本書ニ引テアル志ノ曰フ葉ガ商陸及ビ大黃ニ似ルトイフモノハ此品デハナイ。

木村(庶)曰ク、れいじんさう或ハのうるしノ説アリ、然レドモ現市場品ハイヅレモ當ラザルガ如シ、未ダ原植物ヲ決シ得ズ。

(二) 秦亭ハ蘇恭説ニ依レバ秦、成二州界ニ在リトイフ。史記秦本紀ニ孝王ガ造父ノ後非子ナルモノニ馬ヲ涇渭ノ間ニ飼ハセタル地ヲ附庸ノ邑トストアリ。徐廣ハ今ノ天水隴西縣ノ秦亭是ナリトイフ。楊氏地理圖ニ據レバ、甘肅省秦州府大隴山ノ東南、牛頭河ノ支流後川河ノ東岸ニソノ地ヲ示ス。今ノ清水縣ノ北方約三十支

に根を採つて陰乾する。陳くして水に沈むものが良し。弘景曰く、(三) 宕昌にも出るが、それは、生えるのは僅かに數畝の土地に止つて、それも蝮蛇がその根を食ふところから得難いものとなつてゐるといふ。やはり太山のものも用ゐるが、今用ゐるは(五) 漢中、及び建平の産で、これは防葵と根を同うし、ただ水中に入れて見て沈むものが狼毒、浮ぶものが防葵だといふ。俗方では、また稀に腹内を療ずる要藥とするだけだ。

恭曰く、今は(六) 秦州、成州に産する。秦亭はもと右の二州の界に在る土地だ。(七) 秦隴地方は寒い土地だから、蝮蛇は元來居らぬ。この物と防葵とは全然類を異にし、産地もまた違ふ。太山にも漢中にも亦有るといふことは聞かない。陶氏の説は謬だ。

志曰く、狼毒は、葉は商陸、及び大黃に似て、莖、葉の表面に毛があり、根は皮が黄で肉が白い。實して重いものが良く、軽いものは力が劣る。秦亭なる土地は隴西に在り、奉高なる土地は太山山麓の縣である。陶氏は「沈むものは狼毒、浮ぶものは防葵だ」といつてあるが、信憑するに足らない。たとひ防葵でも、秋、冬に採

里ノ地點ナリ。

(三) 秦高ハ漢ノ縣名泰山郡治タリ。宋ニ

秦符ニ改メ、今ハ泰安トイフ、即チ今ノ泰安府治ナリ。

(四) 宕昌ハ石部雄黃ノ註ヲ見ヨ。


(五) 漢中ハ石部礬石ノ註、建平ハ金部金ノ註ヲ見ヨ。

(六) 秦州ハ石部石膽ノ註、成州ハ石部鹵石類光明鹽ノ註ヲ見ヨ。

(七) 秦隴ハ山草類胡黃蘗ノ註ヲ見ヨ。

(八) 遼州ハ山草類人參ノ註、石州ハ藻草類石龍芻ノ註ヲ見ヨ。

(九) 秦ハ秦州地方、石部石膽ノ秦州ノ註參照。晉ハ晉州地方、石部礬石ノ晉州ノ註參照。



〔毒〕 狼

保昇曰く、根は女參げんじんに似てゐる。ただ虚浮なるものは劣品だ。

頌曰く、現に陝西の州郡、及びわう遼、石州せきしゅうにもあつて、形狀は馬志のいふ通りだ。

時珍曰く、狼毒は秦、晉の地に産する。今一般に草藺茹を往往これとしてゐる

が、誤だ。藺茹の條參照。

根 氣味 【辛し、平にして大毒あり】 大明曰く、苦く辛し、毒あり。之才

曰く、大豆が使となる。醋で炒るがよし。麥句薑はくきやうを惡み、占斯せんし、蜜陀僧みつだそうを畏る。

主治 【欬逆上氣。積聚飲食、寒熱水氣を破る。惡瘡、鼠瘻、疽蝕、鬼精、蠱毒、

飛鳥、走獸を殺す】〔本經〕【胸下の積癖を除く】〔別錄〕【痰飲、癰瘕を治す。また鼠を

つたものは堅く實し、水に入れば皆沈む。狼毒でも、春、夏に採つたものは軽く虚して、水に入れば皆浮ぶものだ。且つこの二物は全然別物で、同類に見做し得べきものでない。この物と麻黄、橘皮、半夏、枳實、吳茱萸とを六陳といふ。

殺す】(大明) 【野葛と合せて耳中に入れば聾を治す】(拘朴子)

附方

舊四、新六。

【心腹連痛】脹るには、狼毒二兩、附子半兩を搗き篩ひ、蜜

で梧子大の丸にし、發病後一日には一丸を服し、二日には二丸を服し、三日には三丸を服して止め、又、一丸から三丸まで漸増して止め、瘥えるを度とする。(肘後方)

【九種の心痛】一には蟲、二には蛙、三には風、四には悸、五には食、六には飲、

七には冷、八には熱、九には氣である。また連年の積冷で心胸に流注するもの、及び車馬から墜落して起した瘀血中惡等の證を治す。九痛丸——狼毒を香しく炙き、

吳茱萸を湯に泡け、巴豆を心を去り炒つてその霜を取り、乾薑を炮き、人參と各一

兩、附子を湯に泡け皮を去つて三兩を末にし、煉蜜で梧子大の丸にし、一丸づつを

空腹の時毎に溫酒で服す。(和劑局方) 【腹中の冷痛】水穀が陰結し、心下に停痰して

兩脇が痞滿し、按すれば音をたてて移動し、逆して飲食の攝取を障礙するには、狼

毒三兩、附子一兩、旋覆花三兩を搗いて末にし、蜜で梧子大の丸にし、一日三回、三

丸づつを食前に白湯で服す。(肘後方) 【陰疝で死せんとするもの】罌丸が縮んで腹に

入り、急痛して死せんとするには、狼毒四兩、防風二兩、附子三兩を燒き、蜜で梧

子大の丸にし、晝夜三回、三丸づつを白湯で服す。(肘後方) 【兩脇の氣結】方は腹中

冷痛の方に同じ。【一切の蟲病】川狼毒を杵いて末にし、一錢づつを、餵たうを皂子さうし一箇

ほどの量、砂糖少量を入れた水に溶かし、就寢時に空腹にして服す。翌朝蟲が下る。

(集效方)

【乾、濕の蟲疥】狼毒を多少に拘はらず搗き爛らんらして猪油、馬油で調へ、患

部に搽なつて睡る。藥氣で顔を傷める處があるから、夜具を頭に被つてはならぬ。こ

れは維揚の潘氏が所傳の方である。(蘭氏經驗方)

【積年の疥癩かじらひ】狼毒一兩を、一半は

生で研り、一半は炒つて研り、輕粉三合、水銀三錢を茶末少量と器に入れて津液しんえきで

擦化して末にし、共に清油を藥より一寸高さに入れて浸し、三日經て藥が沈み油が

清んだ時、夜間燈火を見ずにその油を蘸つけて瘡上に搽擦し、同時に口、鼻を藥盞の上

に近づけて、その氣を吸つて效を取る。(永類方) 【積年の乾癬かんせん】癬を生じて搔けば黃

水が出し、曇天雨天の日には必ず痒かゆきには、狼毒末を塗る。(聖惠方) 【惡疾風瘡】狼

毒、秦艽等分を末にし、一日一二回、方寸匕づつを溫酒で服す。(千金方)

防 葵 (本經上品)

和名無し
學名未詳
科名繖形科

釋名

房苑別錄 梨蓋(本經) 利茹(吳普) 又、爵離、方蓋、農果と名け

る。恭曰く、根、葉が葵花に、子、根の香味が防風に似てゐるところから防葵と名けたのだ。

集解

別錄に曰く、防葵は臨淄の川谷、及び嵩高、太山、少室に生ずる。

三月三日に根を採つて曝乾する。普曰く、莖、葉は葵のやうで表面が黒赤だ。二月根が生え、その根の大きさは桔梗ほどで中が紅白だ。六月白い花を開き、七月、八月に白い實を結ぶ。三月根を採る。

恭曰く、この物もやはり稀有なもので、襄陽の望楚山の東、及び興州の西

方にある。興州のものが南方の産に勝るのは、蜀地に隣接してゐるためだ。

頤曰く、今はただ襄陽の地に出るだけで、その他の郡のことは聞かない。その葉は葵に似て莖毎に三葉あり、一株から十數莖が生え、中から幹が一本出てその端に

(一) 牧野云フ、我邦ノ本草家從來之レヲぼたんぼうふう一名ぼたんにんじん一名御救免にんじん一名御免にんじんニ充ツレドモ中ツテ居ナイ何カ繖形科品デハアルヤウデアルガ右トハ全ク別ノモノデアリ、然シ其品ハ判然シナイ、右ノ我邦産ぼたんぼうふうハ海邊ニ限ラレテ生ズルモノデ海カラ離レタ山地ナドニハ絶エテ見ル品デハナイ。(二) 臨淄ハ芳草類艸、積雪草ノ註ヲ見ヨ。(三) 襄陽ハ石部操雪礫石ノ註ヲ見ヨ。(四) 望楚山ハ襄陽縣治ノ南三支里ニ在リ。一名馬鞍山、一名夾山トイフ。(五) 興州ハ關草類蛇

(六)弘景曰、天竺烏頭附子未出建平故謂之三建。

(七)同字大觀ニヨル。



〔葵 防〕
——州 襄——

州から貢納したものだ。蘇頌の説は甚だ明確で信據し得る。

正誤

弘景曰く、防葵は、今は建平のものを用ゐる。本來狼毒と同根であつて、恰も三建のやうなものだ。その形もやはり相似てゐて、ただ水中に入れて沈まないだけだが、しかし狼毒も久しく經た陳いものはやはり沈まない。

數曰く、凡そ防葵を使ふ場合には、誤つて狼毒を用ゐてはならぬ。眞によく似てゐるから誤るのだが、試験して見ると、效果に異なるところがあるのだから、又、功力も同じではない。患者を過つことがあるから、よほど慎重にせねばならぬ。こ

花を開き、葱花そうけわか景天などのやうで白色だ。六月花を開いて實を結ぶ。根は防風に似たもので、香味も似てゐる。適當の時期に採收したものは水に沈む。當今枯れ朽ちた狼毒をこの物に當ててゐるが、甚しい謬だ。

時珍曰く、唐の時代には隴西ろうせいの成

(ハ) 金陵本ニ蔡ニ作ル、從フベシ。蔡州ハ金部金ノ註ヲ見ヨ。

(九) 前後ノ文ニヨリ之ヲ補フ。

の防葵なる植物は、^(ハ)葵州の沙土中に生ずる。採收すると二十日位で蛙^{しゅ}が生ずるものだ。これを用ゐるには、軽いものさへ用ゐれば妙である。

恭曰く、狼毒と防葵とは全然類を異にし、產地もやはり別だ。

藏器曰く、この二物は、一は(防葵)上品^を一は(狼毒)下品の薬であつて、善、惡の性を異にし、形質も別である。陶氏が、浮ぶと沈むとで區別したために、後世一般にそれを標準にして使用し、防葵を以て堅積^{けんせき}を破る下品の藥物と思ひ、狼毒と同一功力と考へ、古から今に至るまでそれが慣習となつて、遂にこの二物の明確な區別がなくなつたのは、甚だしい謬誤^{びやうご}であつた。

根 修 治

數曰く、凡そこれを使用するには、蚰末を揀^より去つて甘草湯に一夜浸し、漉出して曝乾し、黃精の自然汁一二升を拌せて、土器でその自然汁が盡きるまで炒つて用ゐる。

氣 味

【辛し、寒にして毒なし】別錄^〇に曰く、甘く苦し。普^〇曰く、神農は辛し、寒なりといひ、桐君、扁鵲は毒なしといひ、岐伯、雷公、黃帝は辛く苦し、毒なしといふ。權曰く、小毒あり。

(一〇) 濕瘡、本經。

(一一) 臚ハ腹前ヲ云フ。

(一二) 本經逢原ニ中火ノ間ニ有字アリ。

主治

【疝瘕、腸洩、膀胱の結熱で尿の通ぜぬもの、欬逆、^(一〇) 濕瘡、癰瘤、驚

邪で狂走するもの。久しく服すれば、骨髓を堅くし、氣を益し、身體を軽くする】

(本經) 【五臓の虚氣で小腹支滿し、^(一一) 臚脹し、口乾くものを療じ、腎の邪を除き、

志を強くする。^(一二) 中火の患者は服してはならぬ、恍惚として鬼を見るものである】

(別錄) 【久しく服すれば、邪氣驚狂に主效がある】(蘇恭) 【痲癰氣塊、膀胱の宿水、

盪のやうに大きくなる血氣瘤に主效があつて、悉くよく消散し、鬼瘡の百邪、鬼魅

精怪を治し、氣を通ずる】(甄權)

發明

時珍曰く、防葵に就ては、神農は上品の藥とし、黃帝、岐伯、桐君、

雷公、扁鵲、吳普はいづれも無毒といひ、獨り別錄だけが『中火の患者が服すれば

恍惚として鬼を見る』といひ、陳延之の小品方には『防葵は、多く服すれば惑亂、

昏迷し、恍惚として狂のやうになる』といつてあるが、按ずるに、難經に『重陽の

者は狂し、脫陽の者は鬼を見る』とある。上品の藥、性を養ふ藥であるならば、い

かでかかる結果を見る道理があらう。寒にして毒なしといかでいひ得ようか。果し

てさやうなわけがないとすれば、本經、及び蘇恭の列記したもののこそ防葵そのもの

二二調、大調二調ニ
作ル。

(二) 牧野云フ、小野
蘭山ハ狼牙チイばら
科(薔薇科)ノみつ
もとウウ Potentilla
Cryptomeriae, Ma-
xim. ニ充テ居レド
モ、是レハヨイ加減
ナ充テ方デ全ク中ツ
テ居ナイ。

の効用だ。別錄に列記したものは、防葵に似た狼毒の効用であつて、防葵そのものの効用ではない。狼毒が防葵と混亂して區別を失つた來歴は誠に遠いものだ。識別上の注意を要する。古方の、蛇瘕だか、鼈瘕べつがを治する大方の中に多く用ゐてある防葵も皆狼毒だ。

附方

【附方】 舊二、新二、【腫滿して脈の洪、大なるもの】防葵を研末し、一刀圭を温酒で服す。二三服したとき、身體にこころみ悶を覚え、また少し不仁になるが效驗である。(效後方)

【癲狂邪疾】方は上に同じ。【傷寒動氣】傷寒で、發汗下通の後、臍の左に動氣あるには、防葵散——防葵一兩、木香、黃芩、柴胡各半兩を用ゐ、半兩づつを水一盞半で八分に煎じて溫服する。(雲岐子保命集)

呼ばれたのだ。

集解

別錄に曰く、狼牙は淮南の川谷、及び宛旬に生ずる。八月根を採つて暴乾する。濕に中つて腐爛し、衣を生じたものは人を殺す。普曰く、葉は青く、

根は黄赤で、六七月に花を開き、八月黒い實を結ぶ。正月、八月に根を採る。

保昇曰く、所在にある。苗は蛇莓に似て厚く大きく、深緑色だ。根は黒くして獸類の牙のやうだ。三月、八月根を採つて



〔牙 狼〕

(三) 大觀ニ根萌牙若獸之牙トアリ。
(四) 大觀ニ三チ二ニハチ三ニ作ル。

(五) 建康ハ今ノ江蘇省江寧縣ノ地ナリ。

(六) 三輔トハ漢ニ京兆、高陽、扶風ヲ稱ス。今ノ陝西省關中道ノ地ナリ。山草類知修ノ註參照。

日光で乾かす。

頌曰く、今は江東、汴東の州郡に多くある。

時珍曰く、范子計然に『建康、及び三輔に出る。色の白いものが善し』とある。

根 氣味

〔苦し、寒にして毒あり〕別錄に曰く、酸し。普曰く、神農、黃帝は苦し、毒ありといひ、桐君は辛しといひ、岐伯、雷公、扁鵲は苦し、毒なしと

〔七〕肌恐クハ棘ノ誤。

いふ。之才〇〇曰く、蕪荑ぶいが使となる。地榆ぢゆ、棗さう肌を惡む。

主治

〔邪氣、熱氣、疥癩せうらい、惡瘍あくやう、瘡痔。白蟲を去る〕〔本經〕〔浮風癢痒を治

す。煎じた汁で惡瘡を洗ふ〕〔甄權〕〔腹臟一切の蟲を殺し、赤、白痢を止めるに煎じて服す〕〔大明〕

〔八〕大觀ニ外臺祕要ニ作ル。

附方

舊六、新四。【金瘡出血】狼牙草の莖、葉を搗き熟して貼る。〔八〕〔肘後方〕

【尿血】金粟狼牙草を焙じ乾して蚌粉はうふんを入れて炒り、槐花、百藥煎と等分を末にし、三錢づつを空心に米泔で調へて服す。また酒病もこれで治癒する。〔衛生易簡方〕【寸白諸蟲】狼牙五兩を搗いて末にし、蜜で麻子大の丸にし、一夜絶食して翌朝漿水で服す。一合を服し盡せば癒える。〔外臺祕要〕

【蟲瘡の癢癢】六月以前には狼牙の葉を採り、以後には根を用ゐ、生で咬咀して木の葉で裹み、燂火ほさびで炮たう熟して瘡上を熨ぬし、冷えれば止める。〔楊炎南行方〕【小兒の陰瘡】狼牙草の濃煮汁で洗ふ。〔千金方〕【婦人の

陰癢】狼牙二兩、蛇牀子じやじやうし三兩を水で煎じ、熱して洗ふ。〔外臺祕要〕【婦人の陰蝕】瘡

の爛れたるには、狼牙湯——狼牙三兩、水四升を半升に煮取り、一日四五回、箸に綿を纏へて浸して漉ぎ洗ふ。〔〇〇〕〔張仲景金匱玉函〕【汁の出る痔耳】狼牙を研末し、綿で

〔一〇〕大觀ニ外臺祕要ニ作ル。

〔九〕大觀ニ熱ニ作ル。

裏んで日毎に塞ぐ。(聖藥方) 【毒蛇の整傷】獨莖の狼牙根、或は葉を搗き爛らし、臘

豬脂に和して塗る。立ろに癒える。(崔氏方) 【射工の毒】瘡あるには、狼牙を、冬は

根を、夏は葉を取つて搗汁四五合を飲み、并に傳ける。(千金方)

(二) 蘭 茹 (本經下品)

和名 無し
學名 *Euphorbia* sp.
科名 たかとうだい科(大戟科)

釋 名

離婁 別錄

掘据

音は結居(ケツキヨ)である。白きものを草蘭茹と

名ける。時珍曰く、蘭茹は本來は蘆絮ろうじょと書く、その根の牽引する状態の形容だ。掘

据きょは拮据きうきょと書くべきで、詩に『予指拮据』とあり、これは手、口共に動作する状態

をいつたのだ。

集 解

別錄に曰く、蘭茹はたかとうだい代郡の川谷に生ずる。五月根を採つて陰乾する。

頭の黒いものが良し。

普曰く、草の高さ四五尺、葉は圓く黄色で、二枚づつ相對して生え、四月花を開き、五月黒い實を結ぶ。根は黄色でやはり黄色の汁がある。三月葉を採り、四月、

(一) 牧野云フ、たかとうだい屬 *Euphorbia* (二) ノ一種ナレドモ今其種名ヲ違ガニ鉤出シ得ナイ、植物名實圖考卷ノ二十四ニ其圖ガ出テ居ルガ誤藥ノ品デアアル、此根ヲ誤テ藥毒ト謂フトノ事デアアル、然シ此蘭茹ハ *Euphorbia Pulchra*, Turcz. デハナイ。
(三) 代郡ハ石部代赭石ノ註ヲ見ヨ。

五月根を採る。

弘景曰く、今は第一位のものは高麗に産する。色は黄だが、當初根を斷ち取る時、出た汁が凝つて漆のやうに黒くなつてゐる。故に漆頭といふ。次位のもは近道に出る。これは草菌茹と名け、色は白いものだ。いづれも焼いた鐵で燻き付け、頭を黒くして漆頭としてあるが、これは擬物であつて、眞物ではない。

頌曰く、今は河陽、淄、齊州にもある。二月苗が生え、葉は大戟に似て花は黄色、根は蘿蔔のやうで、皮は赤黄色、肉は白色だ。初め斷ち取つた時、出た汁が凝つて漆のやうに黒くなる。三月淺紅色の花を開き、また淡黄色のものもあつて、子は著かない。陶隱居のいふ高麗の産なるものがこれに近い。又、草菌茹といふ白色の一種があつて、古方には兩種共に用ゐたものだ。故に姚僧坦の癰疽惡肉を生じたるを治する白菌茹散といふがあり『これを傳けて、肉が盡きたならば使用を停める。但し諸膏藥を傳けても肉が生ぜぬ場合、又は、黄芪散を傳けても惡肉が盡きぬ場合に用ゐるので、漆頭赤皮の菌茹を散にし、半錢匕に白菌茹散三錢匕を和して傳ける』としてある。これで觀れば、赤、白いづれも用ゐられるのだ。

(三) 牧野云フ、漆頭ノ菌茹ヲ我邦ノ先輩今日云フベにないげきニ充ツレドモ、ヨイ加減ノ充テ方デ信用出來ス。
(四) 牧野云フ、草菌茹チのうるしニ充ツル説ハ穩當ト思ハヌ是レハ如何ナル品カ能ク分ラヌ。
(五) 河陽ハ臨草類羅夢ノ註、淄州ハ石部雌黄ノ註、齊州ハ石部滑石ノ註ヲ見ヨ。

(六) ヒ字ハ大觀ニ據ル。

(七) 大觀ニ和ナ合ニ作ル。

〔武都ハ石部丹砂ノ註ヲ見ヨ。〕

時珍曰く、范子計然に『ろじよ蘆茹ろじよは〔武都〕に出る。黄色のものが善し。草薺茹は建康に出る。白色だ』とある。今はやはり處處に有つて、山原中に生じ、春初に苗が生え、高さ二三尺になる。根は長く大きく、蘿蔔や蔓菁まんせいのやうな状態で、岐があつて分れ出るものだ。皮は黄赤で肉は白く、破れば黄色の漿汁が出る。莖、葉は大戟のやうで、葉は長くして微しひる闊く、甚だしくは尖らず、折れば白汁があり、莖を抱く



〔茹 蘭〕

短葉が相對して圓になつて生え、尖葉の中から莖が出て、莖の途中で二三本の小枝が分れる。二三月に細かい紫色の花を開いて、大いさ豆ほどの實を結び、一顆に三粒相合し、生では青く、熟すれば黒く、中に續ぞくする隨子しのやうな形の白仁がある。今一般には往往その根を狼毒と呼んでゐるが、それは誤だ。狼毒は、葉が商陸、大黃などに似たもので、根に漿汁がない。

根 氣 味

【辛し、寒にして小毒あり】別錄に曰く、酸し。普曰く、神農は辛しといひ、岐伯は酸く鹹し、毒ありといひ、李當之は大寒なりといふ。之才曰く、

甘草が使となる。門冬もんとうを惡む。

主治

【惡肉、敗瘡、死肌を蝕治し、疥蟲を殺し、膿、惡血を排し、大風熱氣、よく物を忘れ、(九)睡眠せぬを除く(本經)】
【熱痺を去り、癰瘡うようみを破り、息肉を除く(別錄)】

(九)本經ニハ不樂ニ作ル。

發明

宗奭そうしやく曰く、馬疥を治するに尤も善し。服食の方に用ゐることは至て稀だ。

(一〇)過充ハ脂肪過多ナラン。

時珍曰く、素問に、婦人の血枯痛を治するに、烏鰂骨うきくつ、蘆茹の二物を丸にして服すとあつて——方は烏鰂魚の條にある——王冰は「蘆茹を用ゐるは、その惡血を散する力を取る」といつてある。又、齊書に「郡王の子隆は、年齡二十歳で身體が(一〇)過充くわじつしたが、徐嗣伯が蘆茹丸を合せて服せると自から消した」とある。して見ると蘆茹もやはり服食し得るわけで、ただ斟酌しんしやくを要するだけだ。孟詵の必效方には、甲疽が脚趾の邊に生じて腫爛するを治するに、蘭茹三兩、黃芪二兩を苦酒に一夜浸し、ちよし豬脂五合で合煎して三合の膏にし、一日三回塗れば消す」とあり、又、聖惠方には、頭風旋暈を治する鵝頭丸しざうぐわん中にやはり用ゐてある。

(一)大觀ニ傷寒類要ニ作ル。

(一)牧野云フ、大戟ノ眞物今能ク分ラヌ集解ノ文ヲ見ルニ人ニヨツテ其説ク植物ヲ異ニシテ居ル、頗ノ説ク品ハ我がなつとくだいニ似テ居リ時珍ノ説クモノハ決シテ其レデハナク、其レハ或ハしたかとか、(Euphorbia jekkenensis, Rupr.)デハナイカトモ思フが能クハ分ラ

附方

舊二、新三。【緩疽腫痛】藺茹一兩を散にし、溫水で二錢匕を服す。(聖惠

方) 【傷寒咽痛】毒攻で腫れたるには、藺茹を爪甲ほど口に納^いれて嚙み、その汁を嚥む。微し刺戟を感じれば佳いのである。(一)(張文仲備急方) 【中焦の熱痞】よく物を忘れて困るには、藺茹二分、甘草を炙いて二兩、消石を末にし、一錢づつを雞鳴時刻に溫酒で服す。反應あるを度とする。(聖惠方) 【疥瘡の癢癢】藺茹末に輕粉、香油を入れて調へて傳ける。(多能部事)

(一)大戟 (本經下品)

和名 朱 學名 Euphorbia spp.
科名 たかとうだい科(大戟科)

釋名

叩鉦^(一)(爾雅) 下馬仙(綱目) 時珍曰く、その根が辛く苦く、人の咽

喉を鋭く刺戟するから名けたものだ。今の賤俗間では下馬仙と呼ぶ。その意味は、人を下痢^げさせることが甚だ速だといふのである。郭璞注爾雅には『蕎^{けう}は叩鉦^{こつしやう}なり、即ち大戟のことだ』とある。

集解

別錄に曰く、大戟は^(二)常山^{じやうざん}に生ずる。十二月根を採つて陰乾する。

保昇^〇曰く、苗は甘遂に似て高く大きく、葉に白汁があり、花は黄色だ。根は細苦
參に似て皮が^〇黄、肉は黄白だ。五月苗を採り、二月、八月根を採つて用ゐる。



〔戟 大 北〕

頤^〇曰く、近道に多くある。春紅芽が
生え、漸次に成長して叢をなし、高さ
一尺ほどになる。葉は初生の楊柳に似
て小さく圓い。三月、四月に團圓で杏

花に似た、また蕪荑に似た黄紫の花を開く。根は細苦參に似たものだ。秋、冬にそ
の根を採つて陰乾する。淮甸^{わいけん}に産するものは、莖が圓く、高さ三四尺、^金葉は黄色



〔戟 大 南〕
——州 信——

で、心まで著いて百合の苗のやうでもあ
る。江南に生ずるものは、葉が芍藥に似
てゐる。

時珍^〇曰く、大戟は平澤に甚だ多く生え
る。直莖で高さ二三尺、中が空で折れら
る。白漿が出る。葉は長く狭く、柳葉のやうで圓くはない。その梢には葉が密に攢^あまつ

ヌ。植物名實圖考卷
ノ二十四ノ大戟ノ圖
ハなつとうだいニ似
テ居ル、松村任三博
士ノ改訂植物名彙ニ
此名實圖考ノ品ヲ
Euphorbia Esula, L.
ニ充テアルノハ正シ
クナイ。
(一)當ニ本經ニ作ル
ヌ。
(二)常山ハ石部齒石
類凝水石ノ註ヲ見
ヨ。
(三)大觀ニ黄ノ下ニ
黒字アリ。
(五)大觀ニ花ニ作ル。

(六) 附生トハ正根ニ非ザル傍株ノ根ヲ云フ。
(七) 氣ヲ洩ラスハ下利スルヲ云フ。

(八) 木村(康)曰ク、大戟ハ有毒植物ニシテオイフオルホン、ゴム質、樹脂、蔞醜石灰、澱粉及一種ノアルカロイドヲ含有スベシト。(有馬純三——化誌、昭、三、二五二)

て上に著く。杭州の紫大戟を土級品とし、江南の土大戟がこれに次ぐ。北方の綿大戟は色白く、その根は皮が柔軟で綿のやうだ。甚だ峻烈に下痢するもので、よく人體を傷ふ。弱い患者が服すれば吐血することがあるから注意を要する。

根 修 治

毀曰く、凡そこれを用ゐるには、(六) 附生のもを用ゐてはならぬ。(七) 氣を洩らして停止するところなきものだ。その場合は薺蔞湯を煎じて服すれば解す。大戟を採收したならば、槐砧上で細かに剉んで海芋葉と拌ぜ、午前十時から午後四時まで蒸して芋葉を取り去り、晒し乾して用ゐる。時珍曰く、凡そこれを採つたならば、漿水で軟かに煮て骨を去り、晒乾して用ゐる。海芋葉は麻痺する有毒物だから、恐らく用ゐられない。

(八) 氣 味

【苦し、寒にして小毒あり】別錄に曰く、甘し、大寒なり。權曰く、苦く辛し、大毒あり。元素曰く、苦く甘く辛し、陰中の微陽である。肺を瀉し、眞氣を損ずる。時珍曰く、棗と配合すれば脾を損じない。之才曰く、甘草と反する。菖蒲を用ゐれば解す。恭曰く、菖蒲、蘆、葦、鼠屎を畏る。大明曰く、赤小豆が使となる。薯蓣を惡む。

主治

【蠱毒、十二の水腫、腹滿急痛、積聚、中風の皮膚疼痛、吐逆】〔本經〕

【頸、腋の癰腫、頭痛。汗を發し、大、小便を利す】〔別錄〕【毒藥を瀉し、天行の黃

病、溫瘡を泄し、瘰癧を破る】〔大明〕【惡血、癰塊、腹中雷鳴を下し、月經を通じ、

胎孕を墮す】〔甄權〕【隱疹風、及び風毒脚腫を治す。いづれも水で煮て、日日熱し淋

ぎ治效を取る】〔蘇頌〕

發明

成無己曰く、大戟、甘遂の苦は水を泄らす。水は腎が司配するもので

ある。

好古曰く、大戟と甘遂とは、共に泄水の藥であつて、濕の勝てるものは、苦燥でこれを除く。

時珍曰く、痰涎なるものの性質は、氣に随つて升、降し、處として到らざるなきものであつて、心に入つた場合には、竅に迷つて癰癩となり、妄りに怪しきことを言ひ、妄りに怪しきものを見る。肺に入つた場合には、竅に塞つて欬唾が稠粘し、喘急し、背冷となる。肝に入つた場合には、留伏し、蓄聚して脇痛、乾嘔、寒熱往來となる。經絡に入つた場合には、麻痺し、疼痛し、筋骨に入つた場合には、頸項、

胸背、腰脇、手足が牽引し、隱痛するものだ。陳無擇の三因方では、いづれも控涎丹を主として用ゐて殊に奇效があるが、それは痰の本を治するのである。痰の本は水であり、濕であつて、それに氣と火とが加はれば凝滯して痰となり、飲となり、涎となり、涕となり、癰となる。大戟は能く臍、腑の水、濕を泄し、甘遂は能く二經隧の水、濕を行^やり、白芥子は能く皮裏、膜外の痰氣を散ずるものであつて、控涎丹は善く適當にそれを用ゐるので奇功を收め得るわけなのだ。

又、錢仲陽は『腎は眞水だ。補すべき道理はあるが、瀉すべき道理はない』といひ、また『痘瘡が變黑して腎に歸した一病證は、百祥膏を用ゐてこれを下す。これは腎を瀉すやうなものだが腎を瀉するのではない。その腑を瀉するので、それで臟が自から實せぬことになるのだ』と主張した。余が按ずるに、百祥は、なるほど大戟一味を用ゐてある。大戟は能く水を行^やるものだ。それで『その腑を瀉すから臟が自から實せぬことになるのだ』といつたのである。腑とは膀胱を指す。しかし、竊かに謂ふに、百祥は獨り腑を瀉するだけのものではない。これは、實するときはその子を瀉すのそれであつて、腎の邪が實するに對してその肝を瀉するのだ。大戟は

味が苦澁で、水に浸せば色が青緑となる。肝、膽の藥なのだ。故に百祥膏は、また嗽を治して口から青緑の水を吐くのである。一體青、緑なる色は少陽の風木の色なのだ。仲景も『心下痞滿して脇下に引いて痛み、乾嘔し、氣短きものには十棗湯を主とする』といひ、その中にはやはり大戟を入れてある。そもそも乾嘔、脇病は、肝、膽の病ではないか。然らば百祥は肝、膽を瀉するは明なことである。肝は方位では東方である。瀉すべくして補すべきものでない。況や青を瀉し、黄を瀉すはいづれもその子を瀉するのだ。同一の瀉である。何ぞ獨り腎のみただ腑を瀉すといふわけがあらうか。潔古老人は、變黑して腎に歸した證を治するに、宣風散を百祥膏の代用とした。やはりこれも子を瀉すが目的である。蓋し毒が勝ちて火が熾なれば水は益、涸れ、風に火勢を挾めば土に陷隙が生ずる。故に津、血が内に枯竭し、膿を化する作用が不能になり、青黒、乾陷の證を現はすのである。これに對して風、火の毒を瀉するは、腎を救ひ脾を扶ける所以であつて、ある者は『脾虛、腎旺だから腎を瀉して脾を扶けるのだ』といふが、それは非である。腎の眞水たるや、瀉すべきものではない。瀉するはその陷伏の邪毒に對してだけのことだ。

附方

新十二。

【百祥膏】

嗽を治して青緑の水を吐く。又、痘瘡が腎に歸し

て紫黒に乾陷し、寒を發せぬものはこれで下すがよい。黒くならぬものをば決して下してはならぬ。紅芽の大戟を多少に拘らず陰乾し、漿水で極めて軟かに煮て骨を去つて日光で乾かし、更にその煮汁を入れて汁の全部盡きるまで焙じて末にし、水で粟米大の丸にし、一二十丸づつを赤脂麻湯に研つて服す。○潔古活法機要の棗變百祥丸——斑瘡が變黒し、大便の閉結するを治す。大戟一兩、棗三箇を水一盃共に煮て暴乾し、大戟を取り去り、棗肉を焙じて丸にして服す。少量より多量に進み、利するを度とする。【控涎丹】痰涎が胸膈の上下に留在し、變じて諸病となり、或は頸項、胸背、腰脇、手足、胯髀が忍び難く隱痛し、筋骨が牽引し、釣痛し、走易するもの、及び皮膚が麻痺して癰瘻に似たるものを治す。右の諸症狀は、誤つて風氣、風毒、及び瘡疽としての治療を施してはならない。又、頭痛で舉らず、或は睡眠中に涎を流し、或は欬睡、喘息し、或は痰が心竅に迷ふものを治す。いづれもこの藥を數服するがよし。痰涎は自から消失し、諸疾は隨つて癒える。紫大戟、白甘遂、白芥子を微し炒つて各一兩を末にし、薑汁で作つた麪糊で梧子大の丸にし、七

丸、或は二十丸づつを津液しんえきで嚥下す。利を取るには五六十丸を服す。(三因方) 【水腫喘急】小便の瀯しよるもの、及び水蠱には、大戟を炒つて二兩、乾薑を炮やういて半兩を散にし、三錢づつを薑湯で服し、大、小便の利するを度とする。(聖濟總錄) 【水病腫滿】年月の淺深を問はず、大戟、常歸、橘皮各一兩を切り、水二升で七合に煮取つて頓服する。水二三升を下するが、驚き慌てるに及ばぬ。甚しい重態のものも再服に過ぎずして瘥える。一年間毒食を禁ずれば永く再發せぬ。この方は張尙客から出たものだ。(李絳兵部手集) 【水氣腫脹】大戟一兩、廣木香半兩を末にし、五更に酒で一錢半を服し、碧色の水を取り下してから、粥を食つて補ふ。鹹物を忌む。○簡便方では、大戟を焼いて性を存して研末し、一錢とづつを空心に酒で服す。【水腫腹大】鼓このやうになり、或は全身が浮腫するには、棗一斗を鍋に入れて水で浸し、大戟の根、苗でそれを蓋ひ、瓦盆でよく合せて煮熟し、その棗を時に拘はらず食ふ。食ひ盡せば必ず癒える。○又、大戟散——大戟、白牽牛、木香等分を末にし、猪腰子一對を切り開いてその中へ末一錢を掺り、濕紙で裹んで煨熟わいじやくし、空心に食ひ、左が腫れたるには左を塌たふし、右が腫れたるには右を塌する。(張潔古活法機要) 【牙齒の搖痛】大戟

を痛む部分で咬むが良し。(生生編) 【中風發熱】大戟、苦參四兩を白酢漿一斗で煮熟して洗ふ。寒すれば止る。(千金方)

(一) 澤 漆 (本經下品)

和名 とうだいぐさ
學名 Euphorbia helioscopia, L.
科名 たかとうだい科(大戟科)

(一) 牧野云フ、普通野外ニ見ル一草テ西歐州ヨリ印度端ニ我日本ニ互リテ生ズル、支那テモ普通ニ見ル。

釋 名

漆莖(本經)

貓兒眼睛草(綱目)

綠葉綠花草(綱目)

五鳳草

弘景曰

く、これは大戟の苗で、(二)初生時に葉を摘むと白汁が出るから澤漆と名けたのだ。また人(三)肉を嚼む。○その他下文を見よ。

(一) 初字大觀ニヨリテ補入ス。
(二) 肉字大觀ニヨリテ補入ス。

集 解

別錄に曰く、澤漆は大戟の苗である。太山の川澤に生ずる。三月三日、七月七日に莖、葉を採つて陰乾する。

大明曰く、これは大戟の花である。川澤中にあるもので、莖梗は小さく、花は黃色、葉は嫩葉に似てゐる。(三)五月に採收する。

頤曰く、今は(五)冀州、鼎州、明州、及び近道いづれにもある。

時珍曰く、別錄と陶氏といづれも『澤漆は大戟の苗』といひ、日華子はまた『こ

(一) 大觀ニ五上ニ四字アリ。
(二) 冀州ハ水部井泉水ノ註、鼎州ハ石部太一餘粮ノ註、明州ハ石部南石類食鹽ノ註ヲ見ヨ。

れは大戟の花で、その苗は食へる』といふ。しかし、大戟の苗は人をして洩せしめるから、菜としては食へない。今、土宿本草、及び寶藏論の諸書に就いて攷究するに、いづれも『澤漆は貓兒眼睛草、一名綠葉綠花草、一名五鳳草である。江湖地方の原澤、平陸に多くあつて、春苗が生え、一株に枝が分れて叢となる。莖は柔で馬齒莧の如く、葉は緑で苜蓿の葉の如く、その葉は圓くして色は黄緑、頗る貓の瞳に似てゐるところから貓兒眼と名け、莖頭が凡て五葉で中が分れ、中から小さい莖が五枝に分れて抽き出で、枝毎に青綠色の細花を開き、更に小さい葉がそれを承け、



〔澤 漆〕
—— 貓 兒 眼 ——

一樣に整然としてゐるところから、また五鳳草、綠葉綠花草と名ける。莖を摘めば白汁が出て人の手に粘り、その根は白色で硬骨がある。或はこの點から大戟の苗だといふものもあるが、それは誤だ。五月汁を取つて雄黄を煮、鍾乳を伏し、草砂を結する』とある。この説に據れば、

澤漆は貓兒眼睛草であつて大戟の苗ではない。現に方家で水蠱脚氣を治するに用ゐ

(六) 手字彙言ニヨリ
テ補フ。

て有效だ。尤も神農本經の記述と、合致する。漢時代に別錄を編纂した頃から誤つて大戟の苗と記したために、歷代の諸家がその説を襲用して來たものだ。實際使用上にはその點を密にせねばならぬ。

莖葉

氣味

【苦し、微寒にして毒なし】別錄に曰く、辛し。大明曰く、

冷にして小毒あり。之才曰く、小豆が使となる。薯蕷を惡む。

主治

【皮膚の

熱、大腹水氣で四肢、顔面の浮腫するもの、男子の陰氣不足】（本經）【大、小腸を利し、目を明にし、身體を軽くする】（別錄）【蠱毒に主效がある】（蘇恭）【瘡疾を止め、痰を消し、熱を退ける】（大明）

發明

時珍曰く、澤漆は水を利用する功力が大戟に類するところから、世人はその莖にも白汁があるので遂に誤つて大戟と思つたのだ。けれども、大戟は、根にも苗にも皆毒があつて人を洩せしめるが、澤漆は、根は硬くて用ゐられず、苗は無毒で菜にして食へるものだ。しかし男子の陰氣を利用することは大戟と甚だ異ふ點である。

附方

舊二、新六。【肺欬上氣】脈の沈なるには、澤漆湯を主とする。澤漆三斤

（七）舊ノ字金陵本ニ據ル。

を東流水五斗で一斗五升に煮取つて滓を去り、半夏半升、紫參、白朮、生薑各五兩、甘草、黃芩、人參、桂心各三兩を入れて五升に煎じ、一日三回、五合づつを服す。

（張仲景金匱要略方）

【心下の伏瘕】大いさ盃ほどになり、食事不能なるには、澤漆四兩、

大黃、葶藶を熬つて三兩を搗き篩ひ、蜜で梧子大の丸にし、一日三回、二九づつを服す。（葛洪肘後方）

【十種の水氣】夏季に採つた澤漆の嫩莖葉十斤に水一斗を入れて研り、その汁約二斗を銀鍋に入れて慢火で熬り、稀飴のやうにして瓶に取り收め、毎日空心に一匙を溫酒で調へて服す。癒えるを度とする。（聖惠方）

【水氣蠱病】生の

新鮮な貓眼睛草を晒し乾して末にし、棗肉で彈子大の丸にし、一日二回、二九づつを白湯に溶かして服す。腹中が暖まり、小便の利するを度とする。乾坤祕經

【脚氣

赤腫】歩行に脚の痛むには、貓眼睛草、驚鵲藤、蜂窠等分を用ゐ、毎服一兩を水五碗で三碗に煎じて薰じ洗ふ。（衛生易簡方）

【牙齒の疼痛】貓眼睛草一搗を研り爛

らし、湯に泡けて汁を取り、含漱して涎を吐く。（衛生易簡方）

【男女の瘰癧】五月五

日に貓眼睛草一二（二）細を取つて鍋に入れ、井水二桶で正午から煮て一桶に煮取り、滓を去つて澄清し、再び一碗に煮つて瓶に取り收め、毎に椒、葱、槐枝の煎湯で瘡

細ハ細ト同シ、
東ノコト。

を洗ひ淨めてからこの膏を搽る。數回で癒える。(便民圖纂方) 【癰瘡の蟲のあるもの】
 貓兒眼睛草を晒し乾して末にし、香油で調へて搽る。(衛生易簡方)

(二) 甘 遂 (本經下品)

和名 かんずぬ
 學名 *Vitellaria chameejas, Meisn.*
 科名 ちんちやうげ科(瑞香科)

釋名

甘藹(別錄) 陵藹(吳普) 陵澤(別錄) 甘澤(吳普) 重澤(別錄) 苦澤(吳普) 白澤(吳普) 主田(別錄) 鬼醜(吳普) 時珍曰く、諸名稱の意義は多く詳でない。

集解

別錄に曰く、甘遂は中山の川谷に生ずる。二月根を採つて陰乾する。

普曰く、八月採收する。

弘景曰く、中山は代郡に在る土地だ。

第一位のものとはもと太山、江東に産す

る。近頃用ゐる京口のものとは甚だ似

も付かない。赤皮のものは白皮のもの



〔遂 甘〕

(一) 牧野云フ、我邦ノ先輩廿餘サたかと
 うだい科(大戟科)ノ
 なつとうだい(Euphorbia Sieboldiana,
 Mor. et Deene.)ニ
 充ツレドモ申ラヌ。
 (二) 當ニ本經ニ作ル
 べシ。

(一) 中山ハ石部石灰
 ノ註ヲ見ヨ。

(補) 京口ハ今ノ江蘇
 省丹徒縣治ナリ。

に勝る。都下にはまた草甘遂と名けるものがあるが、まことに悪い。やはり贗造物だ。

恭曰く、甘遂は、苗は澤漆に似たものだ。根は皮が赤く肉が白く、連珠になり、實して重いものが良し。草甘遂といふは蚤休のことだ。その治療の對症も全然異ふ。苗もやはり同じくない。これは俗に重臺と名けるもので、葉は鬼臼、蓖麻に似て、根は皮が白色だ。

(五) 西京トハ長安ヲ指ス。

(六) 汴ハ石都石膏ノ汴京ノ註參照。

(七) 滄ハ滄州、今ノ直隸省滄縣ソノ舊治ナリ。吳ハ土部甘銅ノ註ヲ見ヨ。

(八) 切、大觀ニヨリ補フ。

(九) 黑、大觀ニ藥ニ作ル。

大明曰く、(五) 西京のものが上級品だ。(六) 汴、(七) 滄、吳のものは之に次ぐ。形状は皮付きの甘草に似て節々切する。

頤曰く、今は陝西、江東にもある。苗は澤漆に似て莖が短かく小さく、葉に汁があり、根は皮が赤く肉が白く、指頭ほどの大いさの連珠になつてゐる。

根 修 治

敷曰く、凡そこれを探取したならば、莖を去つて槐砧くわいしんの上で細かに剉み、生甘草湯、薺芎せいきうの自然汁の二味に攪ぜて三日間浸し、その水が(八) 黒汁のやうになつたとき漉出し、東流水で水が清くなるまで六七回淘たうつて漉出し、土器中に入れて甕わくなるまで熬つて用ゐる。時珍曰く、今は一般に多く麪で煨熟し、それで

その毒を去ることにしてゐる。

氣味

【苦し、寒にして毒あり】別錄に曰く、甘し、大寒なり。普曰く、神

農、桐君は苦し、毒ありといひ、岐伯、雷公は甘し、毒ありといふ。元素曰く、純陽である。之才曰く、瓜蒂くわたいが使となる。遠志えんじを惡み、甘草と反する。

主治

腹痛、腹滿、顔面の浮腫、留飲宿食。癥堅、積聚を破り、（二〇）水穀道を利す（本經）

（二〇）五水十二種水ノ
名證詳ナラズ。

【五水を下し、膀胱の留熱、皮中の痞熱ひねつ、氣腫滿を散ず】（別錄） 【能く（二〇）十二種の

水疾を瀉し、痰水を去る】（甄權） 【腎の經、及び隧道を瀉す。水濕脚氣、陰囊腫墜、

痰迷癲癇、噎膈痞塞】（時珍）

發明

宗奭曰く、この薬は専ら水を行ることが特長であつて、直接に水を刺戟して決し通ずることが主たる作用である。

元素曰く、味は苦、氣は寒であつて、苦の性は泄し、寒は熱に勝つものだから、直ちに水氣の結した處に達する。乃ち泄水せつすいの聖薬である。水が胸中に結するはこの薬以外では除き得ない。故に仲景は大陷胸湯にこれを用ゐてある。但し毒があるから輕輕しくは用ゐられぬ。

時珍曰く、腎は水を主るものであつて、水が凝れば痰飲となり、溢るときは腫脹となる。甘遂は能く腎の經の濕氣を泄して痰の根本を治するものだ。しかし過服してはならぬ。ただ病に的中したならば服藥を止めるがよし。張仲景が、心下の留飲を治するに甘草と共にこれを用ゐたのは、その物の相反する性を利用して効果を擧げたのだ。劉河間の保命集には『凡そ水腫で服藥してなほ全く消かぬには、甘遂末を臍のまはり一面に腹に塗り、甘草水を内服すれば直ちに消き去る』とあり。又、王璆の百一選方に『脚氣上攻で腫核を結成したもの、及び一切の腫毒には、甘遂末を水で調へて腫れた部分に傅け、濃煎甘草汁を服すればその腫は直ちに散ずる。二物は相反するものであるが、斯の如き感應があるものだ。清流韓詠が脚氣を病んだときは、この藥一服で病の七八分を去り、再服で全癒した』とある。

附方

舊三、新十九。

【水腫腹滿】甘遂を炒つて二錢二分、黑牽牛一兩半を末にし、水で煎じて時時に呷ふ。（普濟方）【膜外の水氣】甘遂末、大麥麴各半兩を水で和して餅にし、焼き熟して食ひ、通じを付ける。（聖濟總錄）

【身體、面部の洪腫】甘遂

二錢を生で研つて末にし、獐豬腎一箇を七切に分け、各々切開いて中に末を入れ、

(三) 流注ハ蓄積。

(四) 大觀ニ小ニ作レ
ドモ、滿ノ誤ナルベ
シ。

濕紙で包んで煨熟して食ふ。一日一回、四五服すれば、腹が鳴つて小便が利するものだ。それが效驗である。(肘後方) 【腎水の流注】腿、膝が攣急し、四肢が腫痛するには、上記の方に木香四錢を加へ、二錢づつを煨熟して嚼み、溫酒で吞下す。黃水を利用するが效驗である。(御藥院方傳) 【正水脹急】大、小便が利せずして死せんとするには、甘草五錢を半生半炒にし、胭脂子十文を研りませ、一錢づつを白麪四兩と水で和して碁子ほどの大いさにし、水で煮て淡く浮かせて食ふ。大、小便が通じて後は、平胃散に熟附子を加へて二錢を煎じて服す。(普濟方) 【小兒の疳水】珠になつた甘遂を炒り、青橘皮と等分を末にし、三歳には一錢を麥芽湯で服し、利するを度とする。三五日間ハ酸、鹹のものを忌む。これを水寶散と名ける。(綱目後論) 【水蠱の喘脹】甘遂、大戟各一兩を慢火で炙つて研り、一字づつを水半盞で煎じ、三五沸して服す。十服を過してはならぬ。(聖濟錄) 【水腫喘急】大、小便の通ぜぬには、十棗丸——甘遂、大戟、芫花等分を末にし、棗肉で和して梧子大の丸にし、四十丸づつを早朝に熱湯で服す。黃水を利用し去るを度とする。なほ秘するときハ翌日正午に再服する。(三因方) 【妊娠腫滿】氣急し、小腹滿し、大、小便利せず、豬苓散を服

（二五）大觀ニ大豆ニ作ル。

しても瘥えぬには、太山の赤皮甘遂二兩を搗き篩つて白蜜を和し、（二五）梧子大の丸にして五十丸づつを服し、微し下つたならば猪苓散を服する。下らぬときは再服する。猪苓散は猪苓の條に記載してある。（小品方） 【心下の留飲】堅滿して脈が伏し、

その患者自身に、通じが付けば快くならうと感ずるには、甘遂半夏湯——甘遂の大きなもの三箇、半夏十二個、水一升を半升到煮取つて滓を去り、芍藥五箇、甘草一節、水二升を入れて半升到煮取つて滓を去り、蜜半升と共に八合に煎じて頓服し、通じをつける。（張仲景金匱玉函） 【脚氣腫痛】腎臓の風氣攻注で下部に瘡痒あるには、

甘遂半兩、木鼈子仁四個を末にし、猪腰子一個を皮膜を去つて切片し、その内側にその藥四錢を摻り、濕紙で包んで煨熟し、空心に食つて米飲で吞下す。服して後兩足を伸べる。大便が通じたならば、その後二三日は白粥を食ふが妙である。（本事方）

【二便不通】甘草末を生麪糊で調へて臍中、及び丹田（たんでん）に傅け、艾で三壯灸し、甘草湯を飲む。通じのつくを度とする。又、太山の赤皮甘遂末一兩を煉蜜でよく和して四服に分け、一日一回服して通じをつける。（聖惠方） 【小便轉脬】甘遂末一錢を猪苓

湯で調へて服す。立るに通ずる。（華峯雜興方） 【疝氣の偏腫】甘遂、茴香等分を末に

（二）血室ハ子宮。

し、酒で二錢を服す。（儒門事親）【婦人の血結】婦人の少腹滿で鼓のやうな状態とな

り、小便に微し困難を感じて渴せぬは、水と血とが共に結して（二）血室に在るもの
だ。大黃二兩、甘遂、阿膠^{あがう}各一兩、水一升半を半升到煮取つて頓服する。その血は
それで下るものだ。（張仲景方）

【膈氣哽噎^{がうえつ}】甘遂を麴で煨いて五錢、南木香一錢を末
にし、壯者は一錢、弱者は五分を水、酒で調へて服す。（怪病奇方）【痞證の發熱】盜

汗し、胸背疼痛するには、甘遂を麴で包み、漿水で煮て十沸して麴を去り、細かい
糠を焚いた火で黃色に炒つて末にし、大人は三錢、小兒は一錢を、冷蜜水で就寢時
に服す。油膩^{ゆじ}、魚肉を忌む。（普濟方）

【消渴引飲】甘遂を麴で炒つて半兩、黃連一兩
を末にして蒸餅で綠豆大の丸にし、二丸づつを薄荷湯で服す。甘草を忌む。（楊氏家藏
方）

【癰癰心風】遂心丹——風痰が心に迷ふもの、癰癰、及び婦人の心風、血邪を
治す。甘遂二錢を末にし、豬心から取つた三管血で和し、その藥を豬心中に入れて
括^くり付け、紙で裹んで煨熟し、中の末を取つて辰砂^{しんとう}末一錢を入れ、それを分けて四
丸にし、一丸づつを豬心の煎湯で調へて服す。大便に惡物を下して奏效する。下ら
ぬときは再服する。（濟生方）

【馬脾風病^{はひふうびやう}】小兒の風熱喘促、悶亂不安のものを馬脾風

(七) 本草藥言ニ一角ヲ五分ニ作ル。

(八) 牧野云フ、續隨子ハ歐洲ノ原産デア

といふ。甘遂を麪で包んで煮て一錢半、辰砂を水飛して二錢半、輕粉(二七一)一角を末にし、一字づつを、漿水少量に油を一小點滴たらした上へ抄すくひ入れ、藥が沈下してから漿を去つて濯ぐ。これを無價散と名ける(八全幼心鑑)。【麻木疼痛】萬靈膏——甘遂二兩、蓖麻子仁四兩、樟腦一兩を搗いて餅にして貼り、甘草湯を内服する(摘玄方)。【突然の耳の聾閉】甘遂半寸を綿で裹んで兩耳中に挿入し、口中に少量の甘草を嚼む。耳の卒に聾にやみしたものが自然に通ずる。(永類方)

(九) 續隨子 (宋開寶)

和名 ほるとやう
學名 Euphorbia Talyries, L.
科名 たかとうだい科(大戟科)

釋名

千金子(開寶) 千兩金(日華) 菩薩豆(日華) 拒冬(開寶) 聯步頤

曰く、葉の中から葉を出し、幾いく枚が相續いて生えるものだから名けたものだ。冬季に始めて成長するところから、また拒冬ききとうと名ける。

集解

志曰く、續隨子は蜀郡に生じ、處處にやはりある。苗は大戟のやうだ。

頤曰く、今は南方地方に多くあつて、北方の地に産するは稀れた。苗は大戟のやう

(三) 大觀ニ出敷莖相續ニ作ル。



〔子 隨 續〕
—子 金 千—

で、初めに一本の莖が生え、莖の端に葉が生え、葉の中からまた葉が出る。花もやはり大戟に類したもので、葉の中から幹が抽き出て實になる。實は青くして殻がある。人家の

庭園の飾りに多く植ゑるものだ。秋種ゑれば冬成長し、春秀でて秋實る。

時珍曰く、莖の中にはやはり白汁がある。水銀を結し得るものだ。

修治

時珍曰く、凡そこれを用ゐるには、殻を去つて色の白いものを取り、紙に包んで壓搾して油を去り、霜を取つて用ゐる。

氣味

〔母〕辛し、溫にして毒あり

主治

〔婦人の血結、月經閉止。瘀血、

癥瘕、瘰癧、蟲毒、鬼疰、心腹痛、冷氣脹滿を除き、大、小腸を利し、惡滯物を下す〕

〔開胃〕〔積聚、痰飲で食物の落付かぬもの、嘔逆、及び腹内の諸疾。研り碎いて

酒で服すれば、三顆に過ぎずして惡物を下す〕〔蜀本〕〔一切の宿滯を宣通し、肺氣、

水氣を治す。日毎に十粒を服す。多く瀉し過ぎるときは、酸漿水、或は薄醋粥を食

(四) 木村(康)曰ク、成分ハエスクレチン文獻田原純——化誌、明二二(一〇)一二九。藥誌明二二(九三)七八一。W. P. 411. Arch. Ph. 1878, 212)

211. Ber. Ch. Ges.
1830 (23) 3347; C.
N. J. 1923(37)483.

へば直ちに止まる。また疥癬瘡に塗る】(大明)

發明

頤曰く、續隨は水を下すこと最も速かだ。けれども毒があつて人體を損ずるから過多に服してはならぬ。

時珍曰く、續隨は、大戟、澤漆、甘遂と莖、葉がよく似たものだ。主たる治療の對症もやはり似たもので、その功力はいづれも水を利するに特長がある。ただ用法が的正であれば、やはりいづれも重要な藥である。

附方

舊二、新四。

【小便不通】臍腹脹痛して忍び難く、諸藥の效なきものも

再服に過ぎずして效がある。續隨子を皮を去つて一兩、鉛丹半兩を少量の蜜と共に搗いて團にし、瓶に入れて陰闇の場所に埋め、十二月から春の末まで置いて取り出し、研つて蜜で梧子大の丸にし、二三十丸づつを木通湯で服す。溶化して服するのが就中妙である。急病には適宜俵作りに合せてもよし。(聖濟錄) 【水氣腫脹】聯歩一兩を殼を去つて研り、壓搾して油を去り、再び研つて七服に分け、一人の患者毎に一服を用ゐ、男子は生餅子酒で服し、婦人は荊芥湯で五更時刻に服す。下利するが曉までには自から止まる。その後は厚朴湯で補ひ、頻りに湯を飲むが益々善し。一

(五) 莖ハ研藥トアリ、
陳莖ノ義詳ナラズ。

(六) 癰瘍ハ汗斑。

(七) 牧野云フ、我邦
ノ先輩莫若ナハシリ
デハハ(Scorpioia jar-

百日間鹽、醋を忌めば再發しない。聯歩とは續隨子のことだ。(斗門方) 【陽水腫脹】

續隨子を炒つて油を去つて二兩、大黃一兩を末にし、水を洒いで綠豆大の丸にし、

五十丸づつを白湯で服す。それで(連)陳莖を去る。(摘玄方) 【涎積癥塊】續隨子三十箇、

膩粉二錢、青黛を炒つて一錢を研りませ、糯米飯で芡子大の丸にし、一丸づつを打

ち破り、大棗一箇を燒き熟して皮、核を去つて共に嚼み、冷茶で飲み下す。夜半後

に積聚惡物を取り下して奏效する。(聖濟錄) 【蛇咬の腫悶】死せんとするには、重臺

六分、續隨子仁七粒を搗き篩つて散にし、酒で方寸匕を服す。同時に少量を唾液で

和して咬傷の患部に塗れば立るに效がある。(崔元亮海上方) 【黒子、疣贅】續隨子の熟

したる時に取つて塗れば自から落ちる。(普濟方)

葉

及び 莖中の白汁

主治

【顔面の皮膚を剝落し、黚黚を去る】(問寶) 【白

癰、(六) 癰瘍に傳ける】(大明) 【葉を搗いて蠍螫に傳ければ立るに止む】(時珍)

葇 若

音は浪蕩(ラウ
タウ)である。

(本經下品)

和名 らうたう

學名 *Eryosyamus niger*, L. var.

chinensis, Makino.

科名 なす科(茄科)

ponit, Maxim.) =

充々ガ之レハ固ヨリ
中ツテ居ナカツタ、

眞若ノ眞物ハひよす

デアツタ事ニハ先輩

兼モ氣ガ附カナカツ

タ、是レハ其實物ガ

我邦ニハ生ゼヌカフ

デアル、支那ノ產品

ハ歐洲ノ者ト同種デ

ハアルガ多少其苞葉

ノ狀ガ違フ其レデ私

ハ先キニ之レヲひよ

すノ一變種トシタ。

本村、康、口、木邦

ニ於テハ曾テ誤ツテ

眞若ニハしりどころ

チ充テタルヨリ、眞

若トイヘバはしりと

ころチ充テ用キテ今

日ニ至リ、眞若眞

若葉ハ稱スルモノハ

イヅレモはしりとこ

ろノ根莖及葉ナレド

モ、漢藥ニイフ眞若

ハヒヨスノ類ナレコ

釋名

天仙子(圖經)

橫唐(本經)

行唐

時珍曰く、眞若、

一に藺藹と書く。

その子は、服すれば人をして狂狼放宕せしむるといふところから名けたものだ。

集解

別錄に曰く、眞若子は

海濱の川谷、及び

雍州に生ずる

五月子を

採る。弘景曰く、今は處處にある。子の形は頗る五味の核に似てゐるが、極めて小

さい。

保昇曰く、所在いづれにもある。葉は菰藍に似て、莖、葉みな細毛があり、花の色は白く、子は殻が罌の形をしてゐる。結實は扁たくて細かく、粟米ほどの大いさ

で青黄色だ。六月、七月に子を採つて日光で乾かす。

頤曰く、處處にある。苗、莖の高さは一二尺、葉は地黄、王不留行、紅藍等に

似たもので、闊さが三指ほどある。四月に紫色の花を開き、莢、莢に白毛がある。


五月に罌子のやうな形状の殻のある實を結び、小石榴のやうで房中の子は至つて細

かく、青白色で粟米粒ほどのものだ。

數曰く、凡そこれを用ゐる場合に、蒼莢子を用ゐてはならぬ。その形は似てゐる

が、ただこれは微し赤く、服しても效はない。一般に有るものには多くこれを雜へ

テ上海ヨリ來レルモノハはしりどころノ種子ニ非ズシテ、ヒヨス類ノ種子ナルコトヨリシテ知ラル。
 (一)海濱、宋祥、遼ニ中京道海濱縣、金ニ北京路海濱縣アリ。錄ニ今ノ直隸省永平府ニ屬ス。然レドモ別錄ノ海濱ノ地ナリヤ否則ナラズ。或ハ今ノ山東省登州ヨリ武定府ニ屬ル海陽、濱州ノ地方チ古ニ海濱ト稱シタルニハ非ザヤトモ思ハル。
 (二)雍州ハ臨草類菊ノ註ナ見ヨ。
 (三)金陵本ニ二三尺ニ作ル。
 (四)三指濶ト大觀ニアリ。
 (五)木村康曰ク、威分、乾燥ヒヨスハヒヨスチアミンチ主成分トスルザルカロイ



〔子 蓂 天〕
 —子 仙 天—

である。

時珍曰く、張仲景の金匱要略に『藥の中に水蓂すゐりやう若といふがある。葉は圓くして光り、毒がある。誤つて食へば、狂亂して中風のやうな症狀になり、或は血を吐くものだ。甘草汁を用ゐれば

解す』とある。

子 修 治

數曰く、蓂若子を修治するには、十兩を頭醋かうさく一鎰いちりつで乾くまで煮てから、黃牛の乳汁に一夜浸す。翌日になつて乳汁が黒くなるものならば眞物だ。晒し乾し搗き篩つて用ゐる。

氣 味

〔苦し、寒にして毒なし〕別錄に曰く、甘し。權曰く、苦く辛し、微熱にして大毒あり。藏器曰く、性は溫である。寒ではない。大明曰く、溫にして毒あり。これを服すれば熱發するが、綠豆汁、甘草、升麻、犀角を用うれば解す。數曰く、大毒がある。これを誤服すれば、人の心を衝いて大いに煩悶し、眼にせん遲

火を生ずる。

ドヲ約〇・〇七%含有ス、種子ハ總アルカロイド約〇・二%ニシテヒヨスチアミンノ他アトロピン、及スコボラミンチ含有ス、又主トシテオレイン及バルミチンヨリ成ル脂肪油チ含有ス。はしりどころノ根莖ニ存スルアルカロイドハ、ヒヨスチアミン、アトロピン、ノルヒヨスチアミン、ノルアトロピン、スコボラミン、スコボリン等ナリ。

A. T. P. 1908 (80) 4.9; Pt. A. Ph. A. 1899, 285; W. P. 676; I. M. P. 918; U. S. D. 576; J. O. M. 1523 (4) 19; F. H. (2) 177; F. E. A. T. M. 1925 (6) 989; 藥誌 明 211 (八一) 五三八 (八二)

頤曰く、本經に『性寒なり』とある。後世では多く大熱だといふが、史記の淳于

意傳に『淄川王の美人が懷妊して難産だつたとき、浪藥一撮を酒で飲ませるとやがて出産した』とある。且つ子が産れぬのは熱藥では治する筈がないわけだ。又、古方に、突然の顛狂に主たるものに多く葇若を單用してある。果して性を寒なりと斷言するわけにも行かない。

主治

【齒痛で蟲の出るもの、肉痺拘急。久しく服すれば、身體を軽くし、

奔馬に走り及ぶほどの健脚になり、志を強くし、力を益し、神に通じ、鬼を見せしめる。多く食すれば狂走せしめる】(本經) 【癲狂、風癰の顛倒、拘攣を療ず】(別錄)

【心を安じ、志を定め、耳、目を聰明にし、邪を除き、風を逐ひ、白髪を黒く變ずる。主として痲癰を治するには、子を取つて洗ひ晒し、隔日に空腹にして指で一捻りほどを水で服す。また小便に浸し、泣が盡きてから暴乾し、上記の如くして服するもよし。服するとき子を破つてはならぬ。破つて服すれば發狂させる】(藏器)

【炒り焦して研つた末は、下部の脱肛を治し、冷痢を止める。蛀牙痛を治するには、

五五六、四、二二（八
八）五九三、六六一
七、九四、四一（三
二）一三九明、
四二（三五）二一
三、六、八（四五〇）六
七七、大、一三（五〇
八）四二五。
Arch. Pharm. 1368
(226) 185, 203, 18
30(236) 47; J. Ch.
Soc. 1913, 946 Rec.
Intern. Chim. Phy-
Bus. 1883 (3) 169;
Arch. Pharm. 1330
(528) 410.
(セ)大觀ニ有トアリ。
(ハ)大觀ニ違テ濕ニ
作ル。
(九)大觀ニ内ニ作ル、
然レドモ大觀ニハ内
ニ作ル。
(一〇)此處ノ大觀ニ
ハ、小便冷之令泣小
便澀ト、ハ意圖違
セズ。
(一一)大觀ニハ茅ニ作

これを咬めば蟲が出る】(寛永)【焼いて蟲牙を熏し、また陰汗を洗ふ】(大明)

發明

弘景曰く、癩狂を療ずる方に入れて用ゐるが、劑を過してはならぬ。

久しく服すれば自から危險がなくなり、神に通じ、歩行を健にし、十分大益のあるものだ。しかし仙經には用ゐられてない。

權曰く、石灰清で一伏時煮て掬ひ出し、(二)芽を去つて暴乾し、附子、乾薑、陳橘皮、桂心、厚朴と丸にして服すれば、一切の冷氣、積年の氣刺を去り、甚だ溫暖である。生で服してはならない。人體を(三)傷め、鬼を見、捨鍼し、狂亂するものだ。

時珍曰く、葇若の功は前掲諸説ほどの事實はまだ實見せぬが、しかし毒はより以上には甚だしいものだ。一旦煮ても一二日經てば芽が生えるのだから、如何に怖るべきものかが想像し得る。葇若、雲實、防葵、赤商陸は、いづれもよく人の精神を狂はせて、鬼怪なものを見らせるものだ。既往にはまだその理論的關係が研究を遂げられてなかつたが、蓋しこの類の物はいづれも有毒であつて、痰を心竅に迷はしめるから、意識の働きを壅蔽し、その結果視聽等の感覺が惑亂されるのであつた。唐の安祿山は、奚契丹を誘ひ出して葇若酒を飲ませ、酔はしてから堽坑に陥れたと傳へら

ル。
二二傷、大觀ニ湯ニ
作ル。

れる。又、嘉靖四十三年の二月、陝西の遊行僧武如香なる者が妖術を使つて遊行してゐたが、昌黎縣しやうれんへ來たとき、たまたま縣民張柱なる者の家でその妻の美人なるを瞥見し、響應に事寄せて張柱の一家を招ぎ、同一卓に就かせて紅い散藥を入れた飯を一同に食はせた。すると張の一家族は少頃して悉く昏迷して了しまひ、思ふがままに凌辱された。その上に更に魔法を使つてその散を張柱の耳へ吹き入れたので、柱は忽ち發狂して、一家の者がいづれを見ても惡鬼の姿に見え、悉くそれを殺して了つた。その數凡て十六人に及んだが、どの屍體にも血痕は少しも残つてゐなかつた。官憲は張柱を逮捕して、十餘日拘禁してから、柱が二碗ほどの痰を吐いて後、始めて事實の訊問を進めた結果、殺害された者はみな柱の父、母、兄、嫂、妻、子、姉、姪等の一家族であつたことが判明し、張柱と如香とは共に死刑に行はれた。この兇惡の顛末は、世宗肅皇帝が勅命を以て全國に告示されたのであつた。これを觀るに、その痲迷に陥つたときは、人さへ視れば悉く鬼に見えたといふのだから、その妖藥なるものはやはり葺着のたぐひであつたらしい。この毒を解する方法は心得置かねばならぬことだ。

〔三〕大觀ニハ顔上ニ
口字アリ。
〔四〕大觀ニハ豆ナ色
ニ作ル。

附 方

舊二、新二十。

【突然の發狂】 芡若三升を末にし、酒一升到數日間漬け

て滓を絞去り、丸にし得るまでに煎じて小豆三粒ほどの丸にし、日毎に三服する。

それで〔三〕顔面が急し、頭の中を蟲が行くやうに覺え、額、及び手、足に赤〔四〕豆の

やうな處の現はれるものである。いづれも病の瘥える徴候だ。なほ反應なきときは

再服する。病を取り盡すこと神の如き良藥である。〔陳延之小品方〕【風痺厥痛】 天仙子

三錢を炒り、大草烏頭、甘草半兩、五靈脂一兩を末にし、糊で梧子大の丸にして螺

青を衣にかけ、十丸づつを、男子は菖蒲酒で服し、婦人は芫花湯で服す。〔聖濟錄〕

【久嗽の止むぬもの】 濃血あるには、芡若子五錢を浮ぶものを淘り去り、煮て芽を

出させて炒つて研り、眞酥を雞子一箇ほど、大棗七箇と共に煎じ、酥が煎じ盡きた

ときその棗を取つて三箇づつを日毎に食ふ。○またある方では、芡若子三撮づつを

日に五六回吞む。光祿李丞はこれを服して神驗を得た。〔孟詵必效方〕【年久しき呾嗽】

三十年に及ぶものには、芡若子、木香、熏黃等分を末にし、羊脂を青紙に塗つた上に

撒つて筒に巻き、烟に焼いて熏じ吸ふ。〔崔行功纂要方〕【水腫蠱脹】 方は臈部露羊の條

を見よ。【積冷瘕癖】 食思なく、羸瘦し、困憊するには、芡若子三分を水で淘つて

浮ぶものを棄去り、大棗四十九個と水三升で煮乾かし、ただその棗のみを取り、皮、核を去つて一個づつを空心に食ひ、米飲で吞下す。熱を覺えれば止る。〔聖濟錄〕【日久しき水瀉】青州の乾棗十個を核を去つて蓂若子を填め、札定して焼いて性を存し、二錢づつを粟米飲で服す。〔聖惠方〕【冷疝下痢】蓂若子を末にして臘豬脂で和し、丸にして綿で裹み棗ほどを用ゐて下部を導く。痢のために排出したときは更に新たなものを納れる。三回に過ぎずして瘥える。〔孟詵必效方〕【赤白下痢】腹痛して腸が滑し、後重するには、大黃を煨いて半兩、蓂若子を黒く炒つて一撮を末にし、一錢づつを米飲で服す。〔普濟方〕【久痢の止まぬもの】種種の痢に變じ、兼ねて脱肛だつこうするには、蓂若丸——蓂若子一升を淘つて浮ぶものを取り去り、煮て芽を出させて晒し乾して黃黑色に炒り、青州の棗一升を皮と核を去り、共に醃醋うんそく二升で煮て搗いて膏にし、梧子大の丸にして二十丸づつを食前に米飲で服す。〔聖惠方〕【腸風下血】蓂若煎——蓂若實一升を暴乾して搗き篩ひ、生薑半斤から取つた汁と銀鍋に入れ、更に無灰酒二升をこ投じ、火にかけて稠餈ちゆうぎのやうに煎じ、やがて酒を少しづつ五升まで投入して止め、慢火で丸にし得るまでに煎じて梧子大の丸にし、毎朝酒と共に三丸

【二六】宜露ハ牙疳壞血
病ノ一種。

を飲み、五七丸まで漸増して止める。丸にする場合手に粘るときは、兎絲粉を手につけて直接つかぬやうにする。煎じるときは火加減は緊くするを忌む。薬が焦げれば效力を失ふものだ。初服には微し熱するが憂慮するに及ばない。疾甚だしきものも、服して三日を過ぐれば下痢し、疾が去れば痢も止まるものである。非常に效驗がある。(篋中方) 【脱肛の收まらぬもの】 莢若子を炒り研つて傳ける。(聖惠方) 【風牙、蟲牙】 瑞竹堂方では、天仙子てんせんし一撮を小口の瓶に入れて烟に燒き、その烟を竹筒で蟲孔中に引き入れて熏ずる。蟲は死んで永く再發せぬ。○普濟方では、莢若子を瓶に入れて熱湯を淋下し、口に瓶の口を含んでその氣で熏ずる。冷えれば更に作り、三合の湯を用ゐ盡せば止める。涎津ぜんしんが出れば吐き去る。甚だ有效だ。○備急方では、莢若子を數、孔中に納れて蠟で封ずるも效がある。【牙齒の二六】 宜露【風毒の咽喉】は、莢若子末を綿で裹んで咬む。汁が出ても嚥んではならぬ。(必效方) 【風毒の咽喉】水を嚥んで通らぬもの、及び瘰癧ろゐいで咽の腫れたるには、水で莢若子末二錢匕を服す。神效がある。(外臺秘要) 【堅硬なる乳癰にゅうよう】 新しき莢若子半匙を清水一盞で服す。嚼み破つてはならぬ。(外臺秘要) 【堅硬なる石癰】 化膿せぬもの。莢若子を末にし、醋で

和して瘡の頭に傅ける。根が抜出る。(千金方) 【癰に似た惡瘡】十年瘡えぬには、莢

若子を燒き研つて傅ける。(千金方) 【打撲傷】羊脂で莢若末を調へて傅ける。(千金方)

【惡犬の咬傷】一日三回、莢若子七箇、つづを呑む。(千金方)

根 氣味

【苦く辛し、毒あり】

主治

【邪瘧、疥癬、殺蟲】(時珍)

附方

新六。

【瘡疾の止まぬもの】莢若根を灰に燒き、水で一合を服す。患者の強弱を量つて用ゐる。(千金方)

【蟲ある惡癰】莢若根を搗き爛らし、蜜で和して傅ける。(千金方)

【趾間の肉刺】莢若根の搗汁を塗る。○雷公炮炙論の序に『脚に肉刺を生じたるには、襪に若根を繫ける』とある。襪帶に結んで置くの意味だ。【狂犬

の咬傷】莢若根と鹽を搗いて傅ける。一日三回。(外臺祕要) 【惡刺傷】莢若根を水で

煮た汁に浸し、冷えれば易へる。神方である。(千金方) 【箭頭の出ぬもの】萬聖神應

丹——端午の前一日に、無言で莢若の幹、根本、枝、葉、花、實の完全なものを見

付け『先生、あなたはここに御座つたか』と口に唱ひ、唱ひ了つてから、その草の

周圍に柴灰を東南から始まつて盛り圍らし、木俵子で根の周圍の土を掘り廻し、

次の日の日出前に、やはり無言で鋤で掘り取つて洗淨する。雞、犬、婦人に見られ

てはならぬ。かくて清淨な室内で石臼で泥のやうに搗き、彈子大の丸にして黄丹わうたんを衣にかけ、紙袋に封じ高處に懸けて陰乾する。箭頭の出でぬものがあつたとき、先づ象牙末を瘡口に貼つて後、この藥を緋の帛の袋に盛つて臍中に置き、綿で肚を覆ふてその上を縛つて置く。それで箭頭は出るものだ。(張子和儒門事親方)

(二) 雲 實 (本經上品)

和名 しなじゃけつ いばら (新稱)
學名 *Cuscutaria sepium*, Koch.
科名 まめ科 (豇科)

釋 名

員實 (別錄) 雲英 (別錄) 天豆 (吳普) 馬豆 (圖經) 羊石子 (圖經)

(一) 牧野云フ、從來之レナジャケツイバ
ラトシテアレド精シ
ク言ヘバしなじゃけ
ついばら (新稱) 我
邦ノじゃけつイバ
ラハ *C. japonica*,
Sieb. et Zucc. トシ
テ分ツベキモノデア
ル。

苗を 草雲母 と名ける。(唐本) 臭草 (圖經) 粘刺 (綱目) 時珍曰く、員の字も雲 (ウン) と發音する。意義は詳かでない。豆といふは子の形の形容だ。羊石とあるは羊矢と書くべきで、その子の形が羊の糞に似てゐるからだ。

集 解

別錄に曰く、雲實は (三) 河間かかんの川谷に生ずる。十月に採つて暴乾する。

普曰く、莖は高さ四五尺、莖は太く中空だ。葉は麻のやうで兩兩相對し、六月花を開き、八月、九月に實を結ぶ。十月に採收する。弘景曰く、處處にある。子は細

(三) 河間ハ石部南石
類凝水石ノ註ヲ見
ヨ。

く、葶^{てい}藤^{れん}子のやうで小さく黒い。その實はやはり莢^{えい}若^{じやく}に類したもので、焼けば鬼怪
 のものが見えるといふが、その方法を實行したものはまだ見ない。

恭^{こう}曰^いく、雲^{うん}實^{じつ}は大いさ黍^とや大麻^{たいま}子^しほどで黄黒色だ。豆に似てゐるところから天豆
 と名ける。澤^{はく}の邊^へりに叢生^{そうせい}するもので、高さ五六尺、葉は細槐^{さいかい}のやうでもあり苜蓿^{もくじやく}
 のやうでもあり、枝間に微かな刺がある。俗に苗を草雲母と呼ぶ。陶氏が『葶藤に
 似てゐる』といふは非^{ちが}ふ。

保^ほ昇^{しょう}曰^いく、所在の平澤にある。葉は細槐に似たもので、花は黄白色だ。その莢は
 豆のやう、實は青黄色で大いさ麻子ほどの
 ものだ。五月、六月に實を採る。



〔實 雲〕
—— 刺 粘 ——

頤^い曰^いく、葉は槐^{かい}のやうで狭く長く、枝上
 に刺がある、苗を臭草と名け、また羊石子
 草と名け、實を馬豆^{ばづ}と名ける。三月、四月
 に苗を採り、十月に實を採る。時期を經過すれば枯れ落ちる。

時珍^{ししん}曰^いく、この草は山原に甚だ多く、俗に粘刺と呼ぶ。莖は赤く中が空で刺があ

り、高い部分は蔓のやうで、葉は槐のやうだ。三月黄色の花を開き、ちんちん曇曇として枝一面になる。莢は長さ三寸ばかり、形状は肥皂ひせうのやうだ。莢中に五六粒の子があつて、宛あたかも鵲豆のやうで兩端が微し尖り、黄黒の斑紋がある、殻は厚く、仁は白く、咬めば極めて堅重にして腥なまぐさい臭氣がある。

實 修 治

穀曰く、凡そ採取したならば、粗く搗き、顆の完全な橡の實と相對して拌ぜ、一日間蒸して揀り出して暴乾する。

氣 味

【辛し、溫にして毒なし】別錄に曰く、苦し。普曰く、神農は辛し、

小溫なりといひ、黃帝は鹹しといひ、雷公は苦しといふ。

主 治

【泄痢腸澼。せつりちやうへき】

蟲、蠱の毒を殺し、邪惡の結氣を去り、痛を止め、寒熱を除く】（本經） 【消渴】（別錄）

【瘡を治するに多く用ゐる】（蘇頌） 【膿膿血を下すに主效がある】（時珍）

附 方

新一。

【驢で下して止まぬもの】雲實、女萎各一兩、桂半兩、川烏頭二兩を末にし、蜜で梧子大の丸にし、一日三回、水で五丸づつを服す。（肘後方）

花 主 治

【臭ニ精を見る。多く食すれば人をして狂走せしめる。久しく服すれば身體を軽くし、神明に通ずる】（本經） 【精物を殺し、水を下す。これを焼けば

（三精、大觀ニ物ニ作ル。

鬼怪のものが現はれる（別録）

發明

時珍曰く、雲實の花は、よく人をして鬼怪のものを見せしめ、發狂せしめるといふ以上、久しく服して身體が軽くなるといふことは矛盾した話である。これは古書の誤りだ。

根

主治

【骨哽、及び咽喉痛には、研つてその汁を嚥む】（時珍）

苳麻

苳、音は卑（唐本草）
苳、音は卑（ヒ）ある。

和名 たういせ
學名 *Tiinus communis* L.
科名 たかうだい科（大戟科）

（一）牧野云フ、本品ハ原ト熱帶アフリカノ產デアラウト言ハレテ居ルガ、今ハ世界ニ廣ク擴ガツテ居ル。

（二）麻點ハ胡麻ノ如キ點ナ云フ。

（三）胡中トハ西北邊ノ沙漠地ヲ根據トスル北狄、匈奴族ノ地方ヲ指ス。

釋名

頤曰く、葉は大麻に似て、子の形は宛ら牛婢（ダニ）のやうだから名けたものだ。時珍曰く、苳の字は蝗とも書く、蝗とは牛虱（ずし）のことで、その子に麻點があるところから苳麻と名けたのだ。

集解

恭曰く、これは世間で栽培しつゝあるもので、葉は大麻の葉に似て甚だ大きく、結子は牛婢のやうだ。現に胡中から來るものは、莖が赤く、高さ一丈餘あり、子は大いさ皂莢（さうびふ）の核ほどある。これを用ゐるも良し。

保井曰く、今は處によるとある。夏苗が生え、葉は葎草りつさうに似て大きく厚く、莖は赤くして節があり、甘蔗のやうで高さ一丈餘ある。秋細かい花を著け、順次に實を結ぶ。實は殻の表面に刺があり、形狀は巴豆はづに類し、青黃色で褐色の斑紋がある。夏莖、葉を採り、秋實を採り、冬根を採つて日光で乾して用ゐる。



〔麻 莖〕

時珍曰く、その莖には赤いものも白
いものもあつて、中が空だ。葉は大い
さ瓠この葉ほどで、葉毎にすべて五尖で
ある。夏、秋の期間に櫪かの内側から黃色
で纍纍たる花穂が抽き出で、枝毎に數
十顆の實を結ぶ。顆の表面には刺があつて簇じふがり攢り、蝸毛あつちのやうで軟かだ。凡そ三
四粒の子が合して顆となるもので、枯れた時劈さけ開ける状態は巴豆のやうだ。殻中
に大いさ豆ほどの子があり、殻には斑點があつて牛蝨ごうしのやうな状態だ。再びその斑
殻を去ると中に仁があつて、白白とんじろとして續隨子仁のやうである。仁には油があつて、
印肉の材料にもなり、油紙にもなる。子に刺の無いものが良し。刺のあるものは毒

(實) 黒天赤利子詳ナラズ。

(名) 地蕒ハ橘櫨ノ一名。

(考) 沍ハ炸ノ誤。

(七) 木村(康)曰ク、成分、種子ハ三〇・一五

〇%ノ脂肪油(蓖麻子油)ノ他、グロブリン、

スクレオアルブミン、クリコプロテイン、リチン(毒性)

リパーゼ(脂肪分解酵素)等ノ蛋白質類

及リチニントイフ有毒ナルアルカロイド

ヲ含有ス、蓖麻子油ハ主トシテリチノー

がある。

子 修 治

敷曰く、凡そこれを使用するに、(實) 黒天赤利子を用ゐてはならぬ。

これは(名) 地蕒の上に著いてあるもので、顆の兩端が尖つて毒のあるものだ。蓖麻子ならば、節節に黄黒の斑がある。凡そ使用するには、鹽湯で半日煮て皮を去り、子を取つて研つて用ゐる。時珍曰く、蓖麻油を取る方法は、蓖麻仁五升を用ゐ、搗き爛らして水一斗で煮る。沫が吹き起るから、その沫を悉く出盡さして止め、水を去つてその沫を煎じ、燈に點けても(考) 沍ねない程度、水に滴らしても散らない程度を適度とする。

(七) 氣 味

【甘く辛し、平にして小毒あり】時珍曰く、凡そ蓖麻を服したなら

ば、一生炒豆を食ふことはならぬ。これを犯せば必ず腹死する。その油は能く丹砂、粉霜を伏するものだ。

(八) 主 治

【(考) 水癥には、水で二十箇を研つて服すれば惡沫を吐く。三十箇まで漸増して三日間に一回服し、瘥えれば止める。又、風虛の寒熱、身體の瘡痒、浮腫、尸疰、惡氣に主效がある。油を搾取して塗る】(唐本) 【研つて瘡瘻、疥癩に傳ける。

ル酸ノグリセリドヨ
リ成ル。工化大・
四二九）一三五三・
W. P. 428; Am. Ch.
J. 1892 (14) 663;
I. M. P. 1170; U.
S. D. 763; 藥誌明・
二五九六・一三七
三七（二七〇）六六
五・四二・五二五・七
五九・六九（四六三）
七九八・七（四四一）
九二三。

(ハ) 木村(庚)曰ク、
蓖麻子油(日本藥局
方)下劑トシテ用キ
ラル、一回用量大人
二〇—三〇瓦ナリ。
蓖麻子油ノ酸ノ可キ
臭味ヲ去リ、或ハ芳
香ヲ加ヘテ服用シ易
カラシメタル製品ニ
テハ、アセトン、富士
リチネイル(效用チ
機ニカヘテハ、臭味
ヲ除去セルモノ)ニ
シテ、(新來談叢

手、足の心に塗れば分曉を催ほす」(大明)。「瘰癧を治するには、子を取つて炒熟して皮を去り、就寝時毎に二三箇を嚼んで服し、漸次に十數箇まで増加すれば有效だ」(宗爽)。「偏風不遂の口、眼喎斜、失音、口噤、頭風の耳聾、舌脹、喉痺、鵝喘、脚氣、毒腫、丹瘤、湯火傷、鍼、刺の肉に入りたるもの、婦人の胎衣不下、子腸挺出に主效があり、鬲竅、經絡を開通し、能く諸痛を止め、膿を消し、膿を追ひ、毒を抜く」(時珍)

發明

震亨曰く、蓖麻は陰に屬し、その性は善く收するもので、能く濃を追ひ、毒を取る。やはり外科の要藥である。能く有形の滯物を出すものだから、胎産、胞衣、剩骨、膠血を取り下すにこれを用ゐる。

時珍曰く、蓖麻仁は、甘く辛し、毒あり。熱であつて、氣味は頗る巴豆に近く、やはり能く人を利するものだ。故に水氣を下す。その性は善く走り、能く諸竅、經絡を開通する。故に能く偏風の失音、口噤、口、目の喎斜、頭風、七竅の諸病を治す。ただ有形の物を出すだけに止まらない。蓋し鵝喘油は能く藥氣を導いて内部に入れ、蓖麻油は能く病の氣を抜いて外部に出すものだ。故に諸種の膏藥に多くこれ

品^シリチイ^ハ芳香チ附
セシモノ^ノカスヲロ
ール^ハ芳香チ附セル
モノ^ノドナン^ハ半個形
品蓖麻子油含量七〇
%

(七) 水縊ハ水癖ノコ
トナラン。水藥消セ
ザルニヨリ腹中ニ積
聚シテ病ヲナシ、疼
痛ヲ起スモノ。
(八) 丹瘤ハ丹毒ノ一
種兼瘤ヲ云フナルベ
シ。

(一) 木材^ハ康^ノ日ク、
工業用ニハ飛行器減
摩油、印刷インキ、
化粧用ボマード^{並ニ}
ロート油^ハ染色用^ノ蓖
麻子油^ハ壓搾粕^ハハリバ
ーゼチ含有スルヲ以
テケリセリン製造工
業ニ利用スルヲ得。
(二) 剩骨ハ瘡腫内ノ
腐骨。

を用ゐる。ある偏風で手、足の運動の自由を失つた患者に對し、余はこの油を用ゐ、
羊脂、麝香、鯪^{りゅうりやう}鯉^{りやう}甲等の藥と共に煎じて搽擦用の膏藥を作り、一日數回搽擦させる
と、一箇月餘にして漸次快方に向ひ、また同時に搜風、化痰、養血の劑を服させる
と、三箇月にして瘥えた。ある手臂^{てしう}が一塊に腫れて病む患者に對し、やはり蓖麻を
膏に搗いて貼らせると、一夜にして瘥えた。また氣鬱の偏頭痛の患者にこれを用ゐ、
乳香、食鹽と共に搗いて太陽穴を熨^ゆくと、一夜にして痛が止まつた。ある婦人の産
後子腸が收まらぬに對し、その仁を搗いて丹田に貼ると、一夜にして上に收まつた。
この藥は、かく外用として屢々奇效を奏するのであるが、ただ内服には輕卒に用ゐ
られない。或は、膏に搗いて、箸^{はし}で鷄^が、馬、六畜の舌根下へ點けると、その畜類は
物を食へなくなるとも言ひ、或は、肛門の内部へ點ければ下血して死亡するともい
ふ。その毒なることが察知される。

附方

舊丸、新二十九。

【半身不遂】失音して言語不能なるには、蓖麻子油一升、

酒一斗を用ゐ、油を銅鍋に盛り酒の上に置いて、一日間煮熟し、少しづつ服す。

(外藥秘要)

【口、目の喎斜】蓖麻子仁を搗いて膏にし、左の喎斜には右に貼り、右の

(一)八種頭風ハ耳、目、鼻、口、齒、項頸、眉發、頭皮。
(二)剛子ハ巴豆ノ別名。

喎斜には左に貼れば正しくなる。○婦人良方では、蓖麻子仁二十一粒を研つて餅にし、右が喎するには左手の心に置き、左の喎するには右手の心に置き、銅盆に熱水を盛つてその藥の上に載せ、五六回冷えれば換へる。それで正しくなる。○ある方では、蓖麻子油二十一粒、巴豆十九粒、麝香じやかう五分を餅にし、前記のやうにして用ゐる。【風氣頭痛】忍び難きには、乳香、蓖麻仁等分を搗いて餅にし、痛の左、右に隨つて太陽穴に貼り、髪を解いて氣を出す。甚だ效驗がある。○德生堂方では、蓖麻油紙を花形に剪つて太陽に貼れば效がある。○またある方では、蓖麻仁半兩、棗肉十五箇を搗いて紙上に塗り、筒に捲いて鼻中に挿入し、清い涕を下せば止まる。

【二】八種の頭風【蓖麻子、(二)剛子各四十九粒を殻を去り、雀腦じやくなう一大塊を搗いて泥のやうにし、糊で彈子大の丸にし、絲を穿つて風の吹く處に懸けて陰乾し、使用せんとする時、先づ好き末茶を膏に調へて蓋の内側に塗り、前の藥を炭火で焼いて烟を起たせてその蓋を覆せ、烟の盡くるを待ち、百沸した葱湯をその蓋内に注ぎ點ちて服し、後に頭から夜具を被つて臥し、汗を出す。風に當らぬやうにする。(袖珍方)【鼻の塞つて通ぜぬもの】蓖麻子仁三百粒、大棗を皮を去つて一箇を搗きませ、綿

〔二五〕天柱ハ喉門チ去
ルユト横ニ一寸三分
俗ニチリケノ穴。骨
倒ハ無力チ云フ。

〔六〕五種ノ風癩ハ五
臟ノ病ニ配當スル癩
病。

で裏^つんで鼻を塞ぎ、一日一回易へる。三十日で香臭を聞き得る。^{（聖濟錄）} 〔二五〕天柱

骨倒^{（一）}小兒の疳疾、及び諸病後の天柱骨倒は、身體が虚する結果である。生筋散を

貼るがよし。木鼈子^{（二）}六箇を殻を去り、蓖麻子六十粒を殻を去つて研りませ、先づ頭

部を包んで頂上を摩擦し、熱くなつたところへ津液^{（三）}でこの薬を調へて貼る。^{（鄧氏小兒}

方）

〔二五〕五種の風癩^{（四）}年月の遠近を問はず、蓖麻子仁二兩、黃連一兩、石膏水一盃

を文武火で煮て、乾けば水を添加し、三晝二夜煮て黃連を取り出し、ただ蓖麻のみ

を用ゐ、日光に當らぬやうに風で乾かし、各箇を竹刀で四片に切り、一日二回、食

後に二十片づつを荊芥湯^{（五）}で服す。終身豆を食ふことを忌む。犯せば必ず腹脹して死

亡する。^{（衛生寶鑑）} 〔舌上の出血〕蓖麻子油紙を燃つて烟に焼き、鼻中を熏ずれば自

から止まる。^{（摘玄方）} 〔舌が脹れて口を塞ぐもの〕蓖麻仁四十粒を殻を去つて研り、

その油を紙上に塗つて燃にし、烟に焼いて熏ずる。なほ退かぬときは再び熏じ、瘡

えるまで試みる。ある人が舌が腫れて口の外まで出たとき、一人の田舎者がこの法

を用ゐて癒えた。^{（經驗良方）} 〔急喉痺塞〕牙關が緊急して通ぜぬには、この方を用ゐ

れば破れる。蓖麻子仁を研り爛らし、紙に卷いて筒にし、烟に焼いて熏じ吸ふ。直

ちに通ずる。或はただ油を取つて擦にするが藏中妙である。これを聖烟筒と名ける。【咽中の瘡腫】杜任方では、蓖麻子仁一箇、朴硝一錢を共に研つて新汲水で服す。續けざまに二三服すれば效がある。○三因方では、蓖麻仁、荊芥穗等分を末にして蜜で丸にし、綿で包んで嚼み嚥む。(千金) 【水氣服滿】蓖麻子仁を水に研り解いて三合を取り、早朝に頓服し盡す。日中には青黄の水を下すものだ。或は、壯健なものはただ五粒を服すればよいともいふ。(外臺秘要) 【脚氣の痛むもの】蓖麻子七粒を殻を去つて研り爛し、蘇合香丸と共に足の心に貼る。痛は直ちに止まる。(外臺秘要) 【小便不通】蓖麻仁二三粒を研細し、紙に擦り込んで陰莖中に挿入する。直ちに通ずる。(摘玄方) 【駒喘咳嗽】蓖麻子を殻を去つて炒熟し、甜いものを揀つて食ふ。多く食ふほど效がある。終身炒豆を食つてはならぬ。(衛生易簡方) 【分娩を催ほし、胞を下す】崔元亮海上集驗方では、蓖麻子七粒を取つて殻を去り、膏に研つて脚の心に塗る。胎、及び胞衣が下つたならば速かに洗ひ去る。洗ひ去らねば子腸が出る。しかし、直ちにこの膏を頭の頂部に塗れば腸は自から入る。○肘後方には『難産には、蓖麻子十四箇を取り、片手に七箇づつ握れば須臾にして立ちに分娩する』とあ

（こせ）癰風ハ癰病、鼻
塌ハ鼻が低下スルコ
ト。

る。【子宮脫下】蓖麻子仁、枯礬こはん等分を末にし、紙上に載せて押し入れ、そこで蓖麻子仁十四箇を膏に研つて頂心に塗れば入る。（摘考）【盤腸生産】頂に塗る。方は上に同じ。【分娩を催ほし、胎を下す】生胎、死胎に拘はらず、蓖麻二箇、巴豆一箇、麝香一分を研つて臍中、竝に足心に貼る。○また生胎を下すには、一月に一粒を溫酒で吞下す。（集簡方）【一切の毒腫】痛み忍び難きには、蓖麻子仁を搗いて傅ければ止まる。（肘後方）【（こせ）癰風鼻塌】手指が彎曲し、節間が忍び難く痛み、漸次に斷ち落つるに至るものには、蓖麻子一兩を皮を去り、黃連一兩を豆ほどの大いさに剉み、小瓶に水一升を入れて共に浸し、春、夏は二日間、秋、冬は五日間浸して後、蓖麻子一箇を取出して劈き破り、東方に面して前の藥を浸した水で吞む。漸次に四五箇まで増加する。微し利するが差支さつかへない。瓶中の水を飲み盡したならば更に添加する。二箇月の後、大蒜、猪肉を喫つて試み、もし病が發せぬときは完全に効果があつたのだ。發動するときは再服し、發せなくなつてから止る。（杜壬方）【小兒の丹瘤】蓖麻子五箇を皮を去つて研り、麪一匙を入れて水で調へて塗る。甚だ效がある。（修眞秘旨）【瘰癧結核】蓖麻子を炒つて皮を去り、就寢時毎に二三箇を服して效を取る。一生

（二）白膠香ハ楓脂香ノ別名。

（九）膠棗ハ蒸熱セル棗ヲ云フ。

炒豆を喫つてはならぬ。（阮氏經驗方）

【瘰癧惡瘡】及び軟癰なんようには、（二）白膠香はくかうかう一兩を瓦

器で溶化して滓を去り、蓖麻子六十四箇を殻を去つて膏に研つた中に投じ、攪きまぜて油半匙頭を入れ、水中に點じてもそのままになつてゐるまでにし、軟、硬の度を試みて膠、油を加減し、適度に出來上つてから、緋帛を瘡の大、小に應じて切つた上に攤のして貼る。一回作つた膏で三五の癰を治し得るものだ（儒門事親）

【肺風の

面瘡】白屑はくせつが生じ、或は微し赤瘡のあるには、蓖麻子仁四十九粒、白果はくこ、膠棗各三粒、瓦松三錢、肥皂一箇を搗いて丸にし、洗面にこれを用ゐるがよし。（吳曼扶壽方）

【顔面の雀斑】蓖麻子仁、蜜陀僧、硫黃各一錢を末にし、羊髓ひきじと和勻わよくして毎夜傳ける。（摘玄方）

【髮の黃色で黒からぬもの】蓖麻子仁を香油で煎じ焦して滓を去り、三日後にそれを頻りに髮に刷はく。（摘玄方）

【突然の耳の聾閉】蓖麻子一百箇を殻を去り、

大棗十五箇を搗き爛らし、小兒に飲ませる乳汁で和して丸にし、涎よだにして一箇づつを綿に裏んで耳を塞ぐ。耳中に熱を覺えるを度とし、一日一回易へれば二十日で癒える。（千金方）

【湯火灼傷】蓖麻子仁、蛤粉等分を研つて膏にし、湯傷には油で調へ、火傷には水で調へて塗る。（古今錄驗）

【鍼、刺の肉に入りたるもの】蓖麻子を殻を去

つて一兩を、先づ帛で傷處を隔てて傅け、頻りにその經過を見て、若し剥が出たならば直ちに抜き去る。そのまま置けば藥力が緊いたために健全な肉まで穿出する虞がある。或は白梅肉を加へ、共に研つて用ゐるが尤も好し。(衛生易簡方) 【竹木骨哽】 苳麻子仁一兩、凝水石二兩を研りませ、一捻りづつを舌根に置いて嚙み嚙む。その物は自然に無くなる。○またある方では、苳麻油、紅麴等分を研細し、沙糖で皂子大の丸にし、綿で裹んで含み嚙む。痰が出て大いに良し。【雞、魚の骨哽】 苳麻子仁を研り爛らし、百藥煎を入れて研つて彈子大の丸にし、半丸を井華水で溶かして服すれば直ちに下る。【惡犬の咬傷】 苳麻子五十粒を殼を去り、井華水で研つて膏にし、先づ鹽水で痛處を洗ひ吹いてからこの膏を貼る。(神珍方)

葉 氣味

【毒あり】 【主治】

【脚氣、風腫で不仁なるには、蒸し搗いて(二〇〇)

(二〇〇) 葉、大觀ニ傳ニ
作ル。

(二〇〇) 大觀ニ灸上ニ葉
字アリ。

裹み、一日二三回易へれば消く。又、油を塗り、(二〇〇) 炙き熱して顚上を熨すれば、鼻衄を止めるに大效がある。【(蘇恭) 痰喘欬嗽を治す】(時珍)

附方

新一。

【駒喘痰嗽】 儒門事親方では、九尖の苳麻葉三錢に飛過した白礬二錢を入れ、猪肉四兩を薄く批いた内にその藥を摻り、荷葉で裹んで文武火で煨

(三三) 御米ハ罌子粟ノ一名。

(三三) 大觀ニ櫻子癭ニ作ル。

(三三) 百才青ハ蔓草附錄ニアリ。

熟し、細かに嚼んで白湯で送下する。これを九仙散と名ける。○普濟方では、欬嗽、涎喘を治するには、年月の多少を問はず、霜に遭つた蓖麻葉、霜に遭つた桑葉、(三三) 御米殻を蜜で炒り、各一兩を末にして蜜で彈子大の丸にし、一日一服、一丸づつを白湯に溶して服す。無憂丸と名ける。

附 錄

博落廻 (拾遺)

藏器曰く、大毒あり。惡瘡、(三三) 櫻根、瘤贅、癰肉、白



〔廻 落 博〕

一リあ刺に子て似に麻菴一

癰風、蠱毒、精魅、溪毒、瘡癰に主效がある。(三三) 百丈青、雞桑灰等分を和して末にして傳ける。蠱毒、精魅には別に用法があるわけだ。江南の山谷に生ずる。莖、葉は蓖

麻のやう、莖の中は空で、吹けば博落廻といふやうな聲をなし、折れば黄汁が出る。これを人に服ませれば立るに死亡する。輕輕しく口に入れてはならない。

(一) 常山 (本經下品)

和名 じやうざんあぢさゐ (新稱)
學名 *Dichroa febrifuga* Lour.
科名 ゆきのした科 (虎耳草科)

蜀漆 (同上)

同上の苗である。

釋名

恆山 (吳普) 互草 (本經) 雞屎草 (日華) 鴨屎草 (日華) 時珍曰く、

恆はやはり常(つね)である。恆山といふは北岳の名稱で、今の定州にある。常山といふは郡名で、やはり今の眞定の土地だ。これはこの藥が始めて此等の土地に産したのでこの名稱が生じたといふわけでもあらうか。蜀漆といふは常山の苗のとで、功用は同一だ。此には一條に併記する。

集解

別錄に曰く、常山は益州の川谷、及び漢中に生ずる。二月、八月に

根を採つて陰乾する。又曰く、蜀漆は江林山の川谷、及び蜀、漢中に生ずる。常山の苗であつて、五月に葉を採つて陰乾する。

弘景曰く、常山は、宜都、建平産の細かにして實して黄なるものを雞骨常山と呼び、これを用ゐるが最も勝れてゐる。蜀漆は常山の苗であつて、産地はまた異ふ

(一) 牧野云フ、先輩此常山ヲ(シル)！ダ科(芸香科)ノ(一)と云々 *Oriza japonica*, *Thunb.* ニ充テタケレド其レハ非デアツタ、本物ハ我邦ニハ無イガ支那カラ印度ヘ互ツテ産スル、花後ニ圓實ヲ結ビ青色ニ熟スル。
木村(康)曰ク、從來我が本草家ハ常山ニ芸香科ノ(一)と云々充テ來レルモ、こくさぎハ綱目ニ於ケル常山ノ記載ニ充ツ可キモノトシテモ充分ナル理由ヲ見出サズ却テ市場ニ存スルモノハエイクマンノベルベリンチ檢出シタルめぎ科ノめぎ、なゐてんノ莖ニ類スルモノト、アレトシユナイデル及ザエルス(白常山草)ソアラ

ル木植物 (Dichroma
febrifuga, Torr.) ニ

ヨルモノト認ム可キ
モノ二品種別ヲ見タ
リ。木村康一、島田

玄綱——藥誌、昭、

三、(五五九)八八三。

(二)北岳ハ五岳ノ一、

石部崗石新擬水石ノ

常山ノ註參照。定州

ハ土部白堊器ノ註ヲ

見ヨ。

(三)漢ノ常山郡ハ今

ノ直隸省正定以北、

恆山ニ至ル正定府管

下北半ノ地ナリ。眞

定ハ陽草類紫苑ノ註

ヲ見ヨ。

(四)益州ハ金部金ノ

註、漢中ハ石部礬石

ノ註、特生礬石ノ藥

州ノ註參照。

(五)江林山、卽江陽

山、江陽ハ今ノ四川

省瀘州府治ノ舊稱ナ

リ。山ノ所在未詳。

(六)常山ハ山草類巴

といふが、江林山とは益州の江陽山の別名だからこれは同一土地だ。彼の地では採
收して纏め固めて丸に作る。適當の時期に採收、修治した燥いたものが佳し。

恭曰く、常山は山谷の間に生ずる。莖は圓くして節があり、高いものも三四尺に

過ぎぬ。葉は茗わかいに似て狭く長く、兩兩相當つて

生える。(七)二月に青萼の白花を開き、五月實を

結ぶ。實は青く圓く、三子が房になる。この草

は暴燥して色の青白になつたものが用ゐるに堪

へるので、陰乾しては黒爛し鬱壞するものだ。

保昇曰く、今は(八)金州、房州、梁州の(九)中江縣に産する。樹は高さ三四尺、根は

荊根けいこんに似て、黄色で(一〇)破れてゐる。五六月に採つた葉を蜀漆と名ける。

李含光曰く、蜀漆は常山の莖である。八月、九月に採る。

頌曰く、今は汴西べんせい、淮浙わいせつ、湖南の州郡にもある。いづれも上記所説のやうなもの

だが、(一一)海州に産するものは、葉は楸葉しゅうように似て八月紅白色の花があり、子は碧色で

山楸子に似て小さい。現に(一二)天台山に出る一種の(一三)土常山と名くる草は、苗、葉が



〔常山・蜀漆〕

戟天ノ註ヲ、建平ハ金部金ノ註ヲ見ヨ。

(七)二、大觀ニ三ニ作ル。

(八)金州ハ山草類ホノ註、房州ハ石部石鍾乳ノ註、梁州ハ石部特生藥石ノ註ヲ見ヨ。

(九)中江縣ハ今ハ四川省潼川府ニ屬ス。(一〇)破、大觀ニ戟ニ作ル。

(一一)牧野云フ、海州ニ産シテ葉ハ楸葉ニ似タト云フモノ其實物ハ果シテくまつづら科(馬鞭草科)く

まぢ(Chorizanthe trichotomum, Thunb.)

デアアルカ能クハ分ラヌ、先輩ノ之レニ充テシ説モ私ニハ信用出来ヌ。

海州ハ石部南石類食鹽ノ註ヲ見ヨ。

(一二)天台ハ芳草類芍藥ノ註參照。

極めて甘いもので、その地ではこれを用ゐて飲に作る。それが蜜のやうな甘味だ。また蜜香草とも名ける。性は涼であつて、健康に益する。此にいふ常山ではない。

修治

數曰く、採收の際には根と苗と付いたまゝを取り、莖、葉を用ゐるには、その場合に根を去り、甘草を細かに剉んで水と共に拌ぜ濕^{うる}ほして蒸し、患者に與へる際に甘草を去つて蜀漆を細かに剉み、また甘草水と拌せて再び蒸し、日光で乾して用ゐる。常山を用ゐるには、すべて酒に一夜浸し、漉出して日光で乾したものを熬^いり搗いて用ゐる。時珍曰く、近頃では酒に浸して蒸熟する。或は互で炒熟したのももあるが、やはり人を甚しく吐かせることはない。又、醋^{すくせ}制^{せい}のものがあつて、これは人を吐かせる。

常山

氣味

【苦し、寒にして毒あり】別錄に曰く、辛し、微寒なり。普曰く、神農、岐伯は苦しいひ、桐君は辛し、毒ありといひ、李當之は大寒なりといふ。權曰く、苦し、小毒あり。炳曰く、甘草を配合すれば瘥を吐かす。之才曰く、玉札を畏る。大明曰く、葱菜^{そうさい}、及び菘菜^{すうさい}を忌む。砒石を伏す。

主治

【傷寒寒熱の熱發、溫瘧、鬼毒、胸中の痰結、吐逆】(未經) 【鬼蠱、往

〔三〕牧野云フ、土常
山ハあぢぢの屬ノ

Hydringen aspern,
D. Don. デアル、葉

ノ廿イ事ガあまうヤ
(H. Humboldt,

Sich.) ニ似テ居ルガ
固ヨリ別種デアル、

先輩之レチあまうヤ
ニ充テシモ其品デハ

ナイ、然シ此屬ノモ
ノニハ其葉味ニ共通

ノ點ガアルト見エ
ル。

〔四〕木村 康曰ク、
成分ハサクロイント

イフ配糖體ナ記載ス
ル書アルモ確カナラ

ズ。

C. Harlowich. Nono
Arg. naldrogen. 137.

〔五〕大觀ニ糖ノ下ニ
結字アリ。

來水脹のぞくぞくたる惡寒、鼠瘻を療ず〔別錄〕【諸瘡を治し、痰涎を吐し、項下の
瘤瘻を治す】〔實權〕

蜀漆 氣味

【辛し、平にして毒あり】別錄に曰く、微溫なり。權曰く、苦

し、小毒あり。元素曰く、辛し、純陽である。炳曰く、桔梗が使となる。之才曰く、

桔梗が使となる。貫衆を惡む。

主治

【瘧、及び欬逆寒熱、腹中の癥堅、〔五〕痞、積聚邪氣、蠱毒、鬼疰】〔本經〕

【胸中の邪、結氣を療じて吐き去る】〔別錄〕【鬼瘡の永きに互るもの、溫瘧寒熱を治

し、肥氣を下す】〔實權〕【血を破る。腥氣を洗ひ去つて苦、酸のものと共に用ゐれば、

膽の邪を導く】〔元素〕

發明

穀曰く、蜀漆は、春、夏は莖、葉を用ゐ、秋、冬は根を用ゐる。老人

と久病の患者とは絶對に服することを忌む。

頤曰く、常山、蜀漆は瘧を治する最重要のもののだが、多く服させてはならぬ。吐

逆せしめるものだ。

震亨曰く、常山は、性が猛烈に銳くして驅逐力が強く、能く眞氣を傷める。患者

がやや虚して怯する傾向のあるときは用ゐてはならない。外臺に、三兩を用ゐて一服としたのは甚だ無理解だ。雷公が、老人と久病の患者とは絶対に忌むといった通り慎むべきである。

時珍曰く、常山、蜀漆の有する痰を劫かし瘧を截る功力は、必ず表の邪を發散し、又は陽の分を提出し、然る後に用ゐるが適當を得た處置であつて、かくてこそ神效が立ろに見はれる。使用上に正しい法則を失すれば、眞氣が必ず傷むものだ。そもそも瘧には、六經の瘧、五臟の瘧、痰濕、食積、瘴疫、鬼邪の諸瘧があつて、必ず陰、陽、虚、實を明確にすべきものである。一概に論ずべきものではない。常山、蜀漆は、生で用ゐれば上行して必ず吐かせるが、酒で蒸して炒熟して用ゐれば藥氣がやや緩やかになつて、用ゐても一向吐かせない。甘草を配合すれば吐し、大黃と配合すれば利し、烏梅、鯪鯉甲と配合すれば肝に入り、小麥、竹葉と配合すれば心に入り、秫米、麻黃と配合すれば肺に入り、龍骨、附子と配合すれば腎に入り、草果、檳榔と配合すれば脾に入る。蓋し痰が無ければ瘧は作らないもので、この二物の功たるや、やはり痰水を驅逐するに在るので。楊士瀛の直指方に『常山で瘧を治する

ことは、一般にはこれを薄^いしむが、瘡の患者は痰涎、黄水を多く蓄へて、或は心下に停滯し、或は脇間に結滯するので寒熱を生ずるのだ。原則として、當然痰を吐かせ水を逐ふべきものである。常山を用ぬといふ理由があらうか。水が上焦に在るときは、常山は能くこれを吐かせ、水が脇下に在るときは、常山は能くその滯を破つてその水を下すものだ。但し、血を行^{めぐ}らす薬品を佐としてこれを助けることが必須條件であつて、それに依つて必ず十全の効果を収めるのである。純熱發瘡、或は蘊熱^{うんねつ}内實の病證ある場合には常山を投じ、大便が點滴して下り、泄するやうで泄せぬときは北大黄を佐とし用ゐる。數回泄利して、然る後に全瘡の効果を獲るものだ』といつてある。又、待制李燾は『嶺南の地方病なる瘴氣は寒熱の所感であつて、邪氣は多く營、衛、皮、肉の間に在るものだ。皮膚、毛孔中の瘴氣^{しやうき}の根本を去らんとするには、常山以外では不可能である。但しその性は人を吐かせるものだが、しかし七寶散を用ゐて冷服すれば吐かずして效驗がある』といつてある。

附方

舊三、新二十三。

【瘡を截る諸湯】外臺祕要では、常山三兩を漿三升で一夜浸して一升到煎じ取り、發作前^{はうさぜん}に頓服して吐かす。○肘後方では、常山一兩、秣

米一百粒、水六升を三升に煮て三服に分け、發作の前夜、發作の直前、發作の時に服し盡す。○養生主論では、王隱者の驅瘧湯——その説明に『予はこの藥を用うること四十年、その間に奏した奇效は枚舉に遑ない。これは絶対に加減してはならぬ。萬一にも吐くことのないものだ。常山を酒で煮て晒し乾し、知母、貝母、草果と各一錢半、水一錢半を半分に煎じ熟し、五更に熱服する。渣は酒に浸して發作の前に服す』とある。【瘧を截る諸酒】肘後方では、常山一兩を酒一升到二三日漬けて三服に分け、早朝に一服し、少頃して再服し、發作するに臨んで又服す。或は甘草を加へて煮て服す。○宋俠經心錄では、醇醕湯——隔日の瘧を治す。支太醫は『これは桂廣州の方であつて、甚だ效驗あるものだ』といつてある。恆山一錢二分、大黃二錢半、炙甘草一錢二分、水一盞半を半に煎じ減らし、これを醇といふ。發作の日の五更に溫服する。再び水一盞で半に煎じ減らし、これを醕といふ。また發作前に溫服する。○虞搏の醫學正傳では、久瘧の止まざるを治するに、常山一錢半、檳榔一錢、丁香五分、烏梅一箇を酒一盞に一夜浸して五更に飲む。一服で止り、永く再發せぬ。神の如きものだ。【瘧を截る諸丸】千金方では、恆山丸——數年瘧を

ざるものも兩劑で治癒し、發病一箇月のものは一劑で瘥える。恆山三兩を研末し、雞子白で和して梧子大の丸にし、瓦器で煮熟して腥氣さいきを殺し、それを取り出して晒し乾して取り收め、五更に一服、曉方に一服、發作の前に一服、二十九づつを竹葉湯で服す。吐くこともあり、吐かぬこともあり、それで止まる。○肘後方の丹砂丸――恆山を末に搗いて三兩、眞丹一兩を研つて、白蜜を和し、百杵搗いて梧子大の丸にし、發作の時刻に先つて三丸を服し、少頃して三丸を再服し、發作の直前に三丸を服す。いづれも酒で服す。これで斷たぬものなし。○曾世榮活幼心書の黃丹丸――大人、小兒の久瘥きうぢやうを治す。恆山二兩、黃丹半兩、烏梅を核共に瓦で焙じて一兩を末にし、糯米粉糊で梧子大の丸にし、四五十九づつを涼酒で服す。一夜隔て一服し、早朝一服し、午後に食事を攝とる。○葛洪肘後方では、恆山三兩、知母一兩、甘草半兩を搗いて末にし、蜜で梧子大の丸にし、發作に先つて十丸を服し、次に七丸を服し、後に五六丸を服す。瘥えるを度とする。○和劑局方の膽仰丸たんかうわん――一切の瘥を治す。常山四兩を炒つて性を存し、草果二兩を炒つて性を存し、俱に末にして薄糊で梧子大の丸にし、就寢時毎に冷酒で五十丸を服し、五更に再服する。鷲じう、羊、

熱物を忌む。○又、勝金丸——一切の瘧、胸膈の停痰が發して癒えぬものを治す。

常山八兩を酒で浸して蒸し焙じ、檳榔を生で二兩と共に研末して糊で梧子大の丸にし、前記の方法のやうにして服す。○集簡方では、二聖丸——發病の遠近と大小とに拘はらず、諸種の瘧を治す。雞骨恆山、雞心檳榔各一兩を生で研り、鯪鯉甲を煨き焦して一兩半と共に末にし、糯粉糊で菰豆大の丸にして黃丹を衣にかけ、三五十九づつを前記の方法のやうにして服す。【厥陰の肝瘧】寒多くして熱少く、喘息して死せるが如き状態となり、或は小腹が滿し、小便が膿の如くなるには、發病後久しきと近きとを問はず、吐かせず瀉下させずして神の如く治す。恆山一兩を醋に一夜浸して瓦器で煮乾し、二錢づつを水一盞で半盞に煎じ、五更に冷服する。(趙眞人濟急方)

【太陰の肺瘧】瘧が胸中に聚まり、發作に近づくと共に寒を覺え、寒が甚しくなれば熱し、熱する際にはよく驚怖し、何物かが見えるやうに感ずるものである。恆山三錢、甘草半錢、秫米じふつまい三十五粒、水二鍾を一鍾に煎じ、發作の日の早朝、三回に分服する。(千金方) 【少陰の腎瘧】ぞくぞくとして寒く、手、足が寒し、腰、脊が痛み、大便難となり、目がぐらぐらする。恆山二錢半、豉半兩、烏梅一錢、竹葉一錢半、葱白三

根、水一升半を一升に煎じ、發作前に三回に服す。千金方 【牝瘧獨寒】熱せぬもの。

蜀漆散——蜀漆、雲母を二晝夜煨き、龍骨と各二錢を末にし、半錢づつを、發作せんとする日の朝一服、發作直前に一服、醋漿水で調へて服す。溫瘧には、また蜀漆一錢を加へる。（張仲景金匱要略） 【牝瘧獨熱】冷えぬもの。蜀漆一錢半、甘草一錢、麻黃

二錢、牡蠣粉二錢、水二鍾を、先づ麻黃、蜀漆を煎じて沫を去り、他の藥を入れて再び一鍾まで煎じ、まだ發作せぬ前に溫服する。それで吐けば止む。（玉露外臺秘要）

【溫瘧の熱多きもの】恆山一錢、小麥三錢、淡竹葉二錢を水で煎じて五更に服

するが甚だ良し。（藥性論） 【三十年の瘧】肘後方では、三十年の老瘧、及び積年の久

瘧を治す。常山、黃連各一兩を酒三升到一夜漬け、瓦釜で一升半に煮取り、發作の

日の早朝に五合を服し、發作時に再服する。熱するものは吐き、冷えるものは利す

るもので、瘧えぬもの無し。○張文仲の備急方では、恆山一兩半、龍骨五錢、附子

を炮いて二錢半、大黃一兩を末にし、雞子黃で和して梧子大の丸にし、まだ發せぬ

前に五丸、發せんとする時五丸を白湯で服す。文太醫は『これは神驗の方だ。斷ぜ

ぬものなし』といつてある。【瘧瘧寒熱】劉長春の經驗方では、常山一寸、草果一

酒を熱酒一盃に一夜浸し、五更に東方を見ながら服して夜具を被て寝る。酒が醒めると共に癒える。○談楚翁の試験方では、常山、檳榔、甘草各二錢、黑豆一百粒を水で煎じて服す。これは彭司寇の所傳である。○葛稚川の肘後方では、常山、黃連、香豉各一兩、附子を炮いて七錢を搗いて末にし、蜜で梧子大の丸にし、空腹に飲で四丸を服し、發せんとする時三丸を服し、午後に食事を攝る。【妊娠瘧疾】常山を酒で蒸し、石膏を煨き各一錢、烏梅を炒つて五分、甘草四分を水一盞、酒一盞に一夜浸し、早朝に溫服する。（純儒集驗方）【生後百日の小兒の瘧】水鑑仙人の歌に『瘧は是れ邪風寒熱の攻るなり、直ちに術治して空と成るを免るべし。常山を刻んで人形の狀を作り、孩兒の生氣の宮に釘在す』とある。金生の人、金生じて已に在から、即ち已の上に釘する。かく木生的人是亥の上に釘し、火生的人是寅の上に釘し、水土生的人是申の上に釘するのだ。【小兒の驚悸】暴驚、卒死、中惡には、蜀漆を炒つて二錢、左向きの牡蠣一錢二分を漿水で煎じて服す。痰を吐いて癒えるものだ。これを千金湯と名ける。（阮氏）【胸中の痰飲】恆山、甘草各一兩、水五升を一升到煮取つて滓を去り、蜜二合を入れて七合を溫服し、吐を取る。吐せぬときは更に服す

る。(千金方)

附 録

(二七) 杜蘆山(圖經) 頤曰く、葉——味苦し、寒なり。溫瘴寒熱で、或は

發作し、或は止んで一定せず、煩渴し、頭痛し、心躁するものに主效がある。柞欄しよらん

して新酒に浸し、汁を絞つて服す。惡涎を吐出して甚だ效がある。生を(二七)用ゐるが

宜し。莖は高さ四五尺、葉は苦蕒菜くはいるさいに似てゐる。(二八)秋黄色の花を開き、大いさ枸杞

子ほどの白い實を結ぶ。

(二九) 土紅山 頤曰く、葉——甘し、微寒にして毒なし。骨節疼痛、勞熱、瘰癧に主

效がある。(三〇)南恩州なんおんしゅうの山野中に生ずる。大なるものは高さ七八尺あり、葉は枇杷に

似て小さく、毛がない。秋季に粟粒ほどの白い花があつて實は結ばない。(三一)福州に

生ずるものは細い藤になり、芙蓉の葉に似て表は青く下が白い。根は葛頭かつどうのやうな

ものだ。その地では根を取つて米泔に一夜浸し、清水に再び一夜浸し、黄色に炒つ

て末にし、一錢づつを水一盞、生薑一片を煎じた湯で服す。やはり勞瘵を治するに

甚だ效がある。時珍曰く、杜蘆山、即ち土恆山、土紅山、また杜蘆山の類である。

故にいづれも此に附記する。

(二六) 牧野云フ、先輩
此杜蘆山チやぶかう
じ科(紫金牛科)ノい
づせりやう御チう
ばかれもち (Alcea
Doronic, H.) ニ充
テ居レドモ申ツテ居
ナイト思フ。
(二七) 大觀ニ用チ州ニ
作。御チ宜州ニ生
ズ。圖ニ可キナリ。
宜州ハ石部丹砂ノ註
ヲ見ヨ。
(二八) 大觀ニ紫有花紫
色ニ作ル。
(二九) 牧野云フ、土紅
山ハ其品流ツ分ラ
ズ。
(三〇) 南恩州ハ石部石
龍ノ註ヲ見ヨ。
(三一) 福州ハ石部海石
ノ註ヲ見ヨ。

藜 蘆 (本經下品)

和名 しゆろさう
學名 Veratrum nigrum L.
科名 ゆり科(百合科)

(一) 牧野云フ、支那ノ藜蘆サ今一種ト綜ベテ和名ヲしゆろさうトシテオク、日本産ノモノハ其一隣種ナレドモ之レハ又支那ニ産スル。

釋名

山葱(別錄)

葱苒(本經)

葱葵

葵の音は稷(エン)である。葱葵(普)

藜蘆(普)

葱葱(綱目)

鹿葱

時珍曰く、

黑色を藜といふ。

蘆を黒皮が裹んでゐる

から名けたものだ。

根の際が葱に似たもので、俗に葱管藜蘆といふはこの草だ。北方ではこれを葱葱といひ、南方ではこれを鹿葱といふ。

方ではこれを葱葱といひ、南方ではこれを鹿葱といふ。

別錄に曰く、藜蘆は泰山の山谷に生ずる。三月根を採つて陰乾する。

普曰く、葉は大きく、小さい根が相連つてゐるものだ。弘景曰く、近道の處處にある。根のものが極めて葱に似て毛の多いものだ。用ゐるには根だけを剔り取つて微し炙る。

保昇曰く、所在の山谷いづれにもある。葉は鬱金、秦艽、蘘荷などに似て、根は龍膽のやうだ。莖の下に毛が多い。夏生えて冬凋む。八月に根を採る。

頌曰く、今は陝西、山南の東、西の州郡にいづれもあるが、遼州、均州、解

集解

別錄に曰く、藜蘆は泰山の山谷に生ずる。三月根を採つて陰乾する。

普曰く、葉は大きく、小さい根が相連つてゐるものだ。弘景曰く、近道の處處にある。根のものが極めて葱に似て毛の多いものだ。用ゐるには根だけを剔り取つて微し炙る。

保昇曰く、所在の山谷いづれにもある。葉は鬱金、秦艽、蘘荷などに似て、根は龍膽のやうだ。莖の下に毛が多い。夏生えて冬凋む。八月に根を採る。

頌曰く、今は陝西、山南の東、西の州郡にいづれもあるが、遼州、均州、解

(一) 泰山ハ山東省泰安縣ノ北ニ在リ、亦岱宗ト云フ。

(二) 弘景ノ所謂近道トハ揚子江ニ沿ヘル北岸ノ一部、及ビ南岸一帶ノ州郡ヲ指スナラン。

(三) 宋朝ノ山南東道西道ハ今ノ山四省ノ南部、湖北省ノ北部、河南省ノ一部ヲ包攝ス。

〔五〕遼州ハ今ノ山西省襄寧道。均州ハ今ノ湖北省襄陽。解州ハ今ノ山西省河東道ナリ。

〔六〕范子計然、書名。
〔七〕河東ハ今ノ山西省ノ地ナリ。

〔八〕朱村〔康〕曰ク、
〔成〕分邦産ばいけい
と云ふニ就テハ朱ダ研

州のものが就中佳し。三月苗が生え、葉は出たばかりの櫟心さうじん、または車前に似てゐる。莖は葱白に似て青紫色、高さは五六寸、表面に黒皮があつて櫟皮さくひのやうに莖を裹み、肉紅色の花がある。根は馬腸根ばちうこんに似て、長さ四五寸ばかり、黄白色だ。二



〔藜 蘆〕

月、三月に根を採つて陰乾する。この草には二種類あつて、一種は水藜蘆といふ。莖、葉は大體同じだが、ただこの草は水の流れる溪間けいかんの石上に生え、根鬚が百餘本ある。薬用にはならない。現に用ゐられるものは葱白藜蘆さうびりろといふもので、根鬚は甚だ少く、ただ二三十本だ。高山に生ずるものが佳し。均州地方の俗間ではこれを鹿葱ろくそうとも呼ぶ。〔六〕

根 修 治

雷曰く、凡そこれを採取したならば、頭を去り、糯米泔ちるべいかんで午前十時から午後二時まで煮て晒し乾して用ゐる。

氣 味

〔辛し、寒にして毒あり〕別錄に曰く、苦し、微寒なり。普曰く、神農、雷公は辛し毒ありといひ、岐伯は鹹し、毒ありといひ、李当之は大寒にして

究ナケレドモ、歐洲
産ノ *V. album*, *J.*
中ニ證明セラレタル
アルカロイドハエル
ビン、ルビエルビン、
ブソイドエルビン、
プロトベラトリン等
ナリ、プロトベラト
リンハ毒性最も強ク
エルビンニ次ケ他
ハ著セシキ生理作用
ナシ、しゆろさうハ
アルカロイドエルビ
ンチ含有スルト稱セ
ラルモ確ナラズ。
農用殺蟲劑トシテ用
キラル。

藥誌、明、二二、(九
〇)六一、九、六、三
(三八三)五九。

G. Sæbørg: *Acta*
Pharm. 1830
(328) 466.

(九) 蠱毒ハ毒蟲チ以
テ作りタル毒物、荷
ホ蟲ノ解ハ越南陽夏
桂偶記ニ詳ナリ。

大毒ありといひ、扁鵲は苦し、毒ありといふ。之才曰く、黃連が使となる。細辛、芍藥、人參、沙參、紫參、丹參、苦參と反し、大黃を惡む。時珍曰く、葱白を畏れる。服して吐いて止まぬときは葱湯を飲めば直に止まる。

主治

【蠱毒、欬逆、洩痢、腸澼、頭瘍、疥癬、惡瘡。諸蟲毒を殺し、死肌を去る】(本經) 【噦逆、喉痺不通、鼻中の息肉、馬刀爛瘡を療ず。湯に入れては用ゐなす】(別錄) 【上氣に主效があり、積年の膿血泄痢を去る】(三才權) 【上膈の風涎、暗風癰病、小兒の輟駒痰疾を吐かす】(頌) 【末にして用ゐれば馬疥癬を治す】(宗奭)

發明

頌曰く、藜蘆は、一錢匕、二匙一字位を服してさへ劇しく吐かせるものだ。又、之を用ゐれば頂に通じて噦をさせる。而るに別錄に『噦逆を治す』とあるが、この效は未だ詳でない。

時珍曰く、噦逆には吐藥を用ゐ、また反胃にも吐法を用ゐる。是は痰積を去るが目的である。吐藥は單に一定したものではなく、常山は瘧痰を吐かせ、瓜丁は熱痰を吐かせ、烏附尖は濕痰を吐かせ、萊菔子は氣痰を吐かせる。藜蘆そのものは風

(一) 鴨癖ハ痼病。
 (二) 喉痺ハ偏桃腺炎。
 (三) 馬刀癰瘡ハ脇肋腋下ニ生ズル癰癤ノ一種。
 (四) 藥ハ覽權。藥性本草四卷ヲ著ス。隋ニ仕フ。唐ノ貞觀中歸百歲餘ニテ歿ス。是李時珍ノ諸家本草ノ註ニ據ル。然レドモ藥性本草ハ其實ハ權ノ弟覽立言ノ著ナルコト醫說、醫學入門、玉海等ニ載スル所ナリ。然レバ綱目ニ據ト記スルモノハ皆立言ノ誤ナリ。唐ノ武德中大常承ニ進ム。
 (五) 暗風ハ眩運。癰病ハ大觀本草ニハ痼疾トアリ。
 (六) 鴨癖ハ鼻息ノ鳴ル病患。
 (七) 馬癖癰ハ馬皮膚トモ云々。サムシノ

痰を吐かせるものだ。按ずるに、張子和の儒門事親に「(一) 風痼を病む一婦人があつて、六、七歳ころから驚風に罹り、その後は一二年毎に一回位發作し、五六年後に一年に五七回發作し、三十歳から四十歳頃は毎日のやうに發作して、甚しいときは一日に十餘回も發作し、遂に精神朦朧として癡呆の如く、甚しく健忘になり、寧ろ死を求めるといふ状態に陥つた。ところが、たまたま大因作の慘澹たる饑饉に遭ひ、野山に出てあらゆる草を採つて飢を凌いでゐるうちに、ふと葱のやうな形の草を見付け、それを採つて來て、蒸熟して飽くまで食つた。すると五更頃に忽ち胸が苦しくなつて膠のやうな涎を吐き、連日止まらずして凡そ一二斗ほどを吐き、同時に洗ふやうに汗を出して極端に衰弱したが、三日後には遂に輕快になり、病は無くなつて食慾が進み、あらゆる脈理が完全に調和した。そこでその食つた葱のやうな草が果して何草であつたかを世人に訊いて見ると、それは葱葱の苗だつたといふ。即ち本草の藜蘆である。圖經に「能く風病を吐かす」とあるが、この婦人はやはり偶然その吐法に合致したものを食つたのだ」といつてある。我が明朝の荆和王妃劉氏が年七十にして中風を病んだ時は、人事不省となつて牙關が緊閉し、多くの醫師は

一種ニシテ微シ痒ク
白點ノ相連サルモノ
チ云フ。

〔一〕一字ハ一撮チ云
フ、十分ノ六錢ニア
タル。

〔二〕大觀本草ニハ嘔
ナ嘔ニ作ル。

〔三〕其ノ字ハ大觀本
草ニ從フ。

〔四〕反胃ハ朝ニ食シ
暮ニ吐キ、暮ニ食シ
朝ニ吐シ、或ハ食シ
ヤンテ直ニ吐スル病
チ云フ。

〔五〕瓜丁ハ瓜蒂ノコ
ト、瓜ノヘタナリ。

〔六〕風痼ハ神經衰弱
ノ甚シキモノニシテ
心氣正確ナラザルモ
ノ。

〔七〕月池翁、諱ハ言
簡、時珍ノ父ナリ。

ばいけいさうノ根莖
チ白藜蘆根トシ、し
わろさうノ根莖チ黑
藜蘆根トス。

遂に匙を投じた。その時余が先考、太醫吏目の(三三)月池翁が診察したが、正午から午後十二時までにかかってもやはり薬が通らなかつたので、已むを得ず一本の齒を打折つて、そこから濃く煎じた藜蘆湯を灌ぎ込んだ。すると少頃して一聲の噫氣を出し、同時に痰を吐して遂に甦つた。そこで始めて手當を加へて平安を得たのであつた。(三三)瞋眩せぬ薬ではその病が癒えないといふが、誠にその通りだ。

附方

舊六、新十二。

【諸風の吐飲】藜蘆十分、鬱金一分を末にし、一字づつを

溫漿水一盞で和して服し、探り吐かす。(經驗方)

【中風の人事不省】牙關緊急するに

は、藜蘆一兩を(三三)苗頭を去つて濃く煎じた防風湯を浴せ、焙じ乾して切り、微し褐色に炒つて末にし、半錢づつ——小兒には半減する——を溫水で調へて灌ぐ。風涎を吐

すれば效があつたのだ。吐かぬときは再服する。(簡要濟衆)

【中風の言語不能】喉中

が(三三)鋸を曳くやうで口から涎沫を出すには、藜蘆一分、天南星一箇を浮皮を去り、

(三三)臍上に一坑を剉りあけて陳醋(三三)二椀斗を入れ、四面から火力を當てて黃色にし、

末に研つて生麴で小豆大の丸にし、三丸づつを溫酒で服す。(三三)經驗方)

【諸風の頭

痛】和州の藜蘆一莖を日光で乾して研末し、麝香少量を入れて鼻へ吹く。○又ある

三〇雙眼腫トハ藥ノ反
應ノ爲ニ患者ガ一時
人事不省ニ陥ル状態
ヲ云フ。

三一五苗ハ大觀ニハ蘆
ニ作ル。從フベシ。

三二大觀ニハ鋸字下
ニ聲ノ字アリ、左レ

バ曳鋸聲ノ如シト讀
ムヲ正トス。

三三隣トハ天南星ノ
塊莖ノ上端ヲ云フ。

三四二様斗、様斗ト
ハクヌギノ實ノ木ニ

アル碗狀ノ總苞、俗
ニドンクリノサラノ

コト。

三五大觀ニハ驗ノ下
ニ校字アリ。

三六〇大觀ニハ此處ニ
百一方ノ三字アリ。

三七一重湯ハ湯藥劑ヲ
顯ズルコト。

三七八刺、大觀ニ撥ニ
作ル。息肉ハハナダ

メチイフ。

三九反花藥膏トハ藥

方では、通頂散^{つうちやうさん}——黎蘆半兩、黃連三分を鼻から嚥^すふ。(聖惠) 【痰多き久瘡】物も食

へず、吐かんとして吐かぬには、黎蘆末半錢を溫盪水^{なんせきすい}で調へて服し、探り吐かす。

(保命集) 【痰瘡、積瘡】黎蘆、皂莢^{さうけい}を炙^やいて各一兩、巴豆二十五箇を黃色に熬^いり、研

末して蜜で小豆大の丸にし、毎に空心に一丸を服し、發作せぬ前に一丸を、發作し

たときまた一丸を服す。飲食物を攝^さらぬがよし。(肘後方) 【黃疸腫疾】黎蘆を灰中で

炮^{つひやき}して末にし、水で半錢匕を服して少し吐かす。數服に過ぎずして效がある。(三〇)

【胸中の結聚】驚怖に襲はれたやうで、その状態の去らぬには、巴豆半兩を皮と心

を去り、炒つて泥のやうに擣き、黎蘆を炙き研つて一兩と蜜で和し、擣いて麻子大

の丸にし、一二丸づつを吞む。(肘後) 【身體、面部の黑痣】黎蘆灰五兩と水一大碗で

淋汁を取り、銅器で^{三二}重湯で煮て黑膏にし、痣^{あざ}を針で微し^{三三}刺し破つて點^つける。

三回に過ぎずして效がある。(聖惠) 【鼻中の息肉^{そにく}】黎蘆三分、雄黃一分を末にし、蜜

で和して點ける。日毎に三回試みれば自ら消える。兩畔に點けてはならぬ。(聖濟方)

【牙齒の蟲痛】黎蘆末を孔中に納れる。汁を吞んではならぬ。神效がある。(千金翼)

【白禿蟲瘡】黎蘆末を猪脂で調へて塗る。(肘後方) 【頭の蟻虱^{きしつ}】黎蘆末を摻^ふる。(直指)

面愈エズ痛腫狀ノ瘡
癰ナリニ毛ノ

（四）大觀ニハ此處ニ
斗門方ト註ス。

(三五) 羊痘ハ麻疹、痘瘡ニ似テ大ナルモ

（三六）山慈石、詳ナラズ。

(三七) 參果根、詳ナラ
ズ。

（三八）馬腹根、詳ナラ
ズ。

【頭風白屑】甚しく痒きには、頭を沐して黎蘆末を摻り、二晝夜風に當たらぬやうに頭髮を包んで置けば效がある。(本事方) 【^(三)反花惡瘡】米のやうな惡肉が反出するには、黎蘆末を猪脂に和して一日三五回傳ける。(聖濟錄) 【疥癬蟲瘡】黎蘆末を生油で和して塗る。(三才) 【^(三)羊疽瘡痒】黎蘆二分、附子八分を末にして傳ける。蟲は自然に出る。(陶隱居方) 【誤つて水蛭を吞みたる時】黎蘆を炒つて末にし、水で一錢を服す。必ず吐出する。(德生堂方)

(一)牧野云フ、先輩
之レヲシヤクナゲ科
(石南科)ノハナヒリ
セヤ(Lanceolae Gr-
eyana, Maxim.)ニ
充テ居レド、コレハ
正確デハナイト信ズ
ル、ソシテ其太物ハ
今詳カデナイ。

(二)木村(康)曰ク、
ハナヒリノキノ葉ハ
グラヤノトキシント
イフ小結晶性成分チ
含有。

グラヤノトキシシハ
其生理作用アンドロ
メドトキシシニ類似
ス、靜脈内注射ニヨ
ル家兎ノ最少致死量
ハ體重ニ一延ニ對シ
〇・四三延ナルモ内
服ニヨル場合ハ、ソノ四〇倍ニテモ中毒症狀ヲ認ムルノミテ死セザル場合アリ、本物質ハ呼吸毒ニシテ、家兎ニ於ケル死因ハ呼吸中禍ノ
興奮性減少ニヨル呼吸停止ナリ、局所作用中最モ著シキハ激烈ナル噴嚏ヲ惹起セシムルニアリ。

久保修——東醫、明、四〇(二)、五六九、四一、(二)六二三。土居利三郎——日進醫學、太、九(一一)
葉ノ煎汁ハ家畜ノ皮膚ヲ洗ヒ寄生蟲ヲ除去スルニ效アリ、又葉ヲ便所ニ入ルレバ蛆ヲ殺ス、佐々木氏ノ實驗ニヨレバ、内容三斗ノ糞便壺
中ニ葉ノ幹束二〇〇忽チ投入セルニ蛆ハ三日以内ニ完全ニ死滅シ、其後二三日間新タニ蛆ノ發生スルコトナカリシト云フ、佐々木秀夫——
日本公衆保健協會誌、六一五(二)二三。

木 黎 蘆 (拾 遺)

和名無し
學名未詳
科名未詳

釋 名

黃黎蘆(綱目) 鹿驪

集 解

藏器曰く、陶弘景が漏蘆に注して『一名鹿驪といひ、山南地方では苗を用ひ、北方では根を用ゐる』といつてあるが、按ずるに、鹿驪とは木黎蘆のこと
で、漏蘆ではない。これは樹生し、葉莢のやうで高さは二尺ばかりのものだ。毒が
ある。時珍曰く、鹿驪は、一般俚俗に黃黎蘆と呼ぶ。小さい樹で、葉は櫻桃の葉の
やうで狭く長く、皺文が多い。四月細かい黃花を開き、五月小豆大ほどの小さく長
い子を結ぶ。

ニ 氣 味

【苦く辛し、溫にして毒あり】

主 治

【疥癬に用ゐて蟲を殺す】(藏器)

附子 (本經下品)

和名 ぶし
學名 *Aconitum* sp.
科名 うまのあしがた科(毛茛科)

釋名

その母を名けて烏頭といふ。時珍曰く、最初に成育するものを烏頭といふ。烏の頭に似てゐるといふ形容だ。烏頭に附いて生ずるものを附子といふ。子が母に附いてゐるやうなもので、烏頭は親芋、附子は子芋のやうなものだ。蓋し一物である。別に草烏頭、白附子なるものがあるところから、俗にこれを黒附子、川烏頭と呼んで區別する。既往の諸家は烏頭に川と草との兩種あることを區別せずして、いづれも混淆・雜亂の註解を下してゐるが、今は悉く正して置く。

集解

別錄に曰く、附子は犍爲の山谷、及び廣漢に生ずる。冬に採るものが附子である。春に採るものが烏頭である。

弘景曰く、烏頭と附子とは同根のもので、附子は八月に採る八角のものが良し。

烏頭は四月に採る。春季に莖が初めて生え、烏頭の烏の頭のやうな腦頭がある。それでこれを烏頭といふのだ。兩岐があつて、その岐の分れる蒂の牛角のやうな形狀

(二)牧野云フ、附子ハ烏頭ノ新根デアルガ、其烏頭ノ原植物ハとりかぶト屬(屬)ニ當ルカ、其種名ハ今茲ニ輕卒ニ斷言ハ出来ヌガ、或ハ A. Fischeri, Reiche, チ指スカモ知レヌ、若シ果シテ然リトスレバ附子ノ母ハ此種デアルト言フ事が出来ル譯デアル。

支那ニハとりかぶト屬ノ種種ノ種類ヲ産スルノデ中ニハ甲ノ種カラノモノモ附子ト云ヒ、又乙ノ種カラノモノモ同ジク附子ト云フ類ノ事が往往アラウト思フ、是レ等ノ問題ヲ決スルニハ實際ニ支那ノ各地ヲ踏査シテ研究セネバ到底ラヌ事柄デアル。

木村(康)曰ク、附子ノ原植物ハひろハからふとよし一名おはよし(Aconitum Fieberi, Teichb.)其他數種アリ、野生ノ各種ノ Aconitum 屬ノモノヲ用キテ、原植物ノ名様ナル草烏頭ヲ除キテハ附子烏頭ノ如キイヅレモ略ホ原植物ハひろハのからふとよしニヨレルモノト看做ス可キ歟、現在ノ上海市揚品ニ就キ見カニ、川烏ト稱スルモノハ發芽期ニ採集セリト認メラレホニ根根ニシテ、内容充實ジテ堅硬軟少ナリ、我和漢藥商ニ於テ支那產大附子ト稱スルモノ之ニ似テ少シク大形ナリト認メ、同ジク上海市揚品ハ成長後ノ母根ニシテ殘

のものを烏喙うかいといふ。その汁を取つて煎じたものが射罔しゃまうである。天雄は附子に似て細く長く、三四寸ほどになるものだ。側子は即ち附子の邊角の大なるものだ。これ等はいづれも同根のものだが、本經に、附子は犍爲に産し、天雄は少室せうしつに産し、烏頭はウ朗陵らうりやうに産すと生地を三箇處に分けたのは、それぞれその特長の代表的ものの産地を挙げたものと見える。今ではそれ等の別がない。



〔子 附 頭 烏〕

恭曰く、天雄、附子、烏頭は、いづれも蜀道しやくどうの金綿州めんしやう、龍州りやうしやうのものを佳しとする。俱に八月を期して採收し修治する。

その他の地方で修治したものもあるが、薬としての力が微弱で、全然比較にならぬ。江南から来るものに至つては全く用ゐるに堪へない。

大明曰く、天雄は太くして長く、角刺が少くして質は虚してゐる。附子は太くして短く、角があり、形が平かに穩おだやかで實してゐる。烏喙は天雄に似たものだ。烏頭は附子に次ぎ、側子は烏頭よりも小さい。速つたなり聚あつまつて生ずるものをば虎掌と名け

る。いづれも天雄の一家族母子關係の類だが、氣力にはそれぞれ等差がある。それは宿根と嫩いものとの相違だ。

數曰く、烏頭は、少し莖、苗があり、身が長くして烏のやうに黒く、少し旁尖がある。烏喙は、皮の表面が蒼色で尖頭があり、大なるものは八九箇を孕み、尖頭の周圍が底陷して烏鐵のやうに黒い。天雄は、身は全體が矮えて尖がなく、周圍四面を匝つて十一箇の附子を孕む。附子は皮が蒼色だ。側子といふは、ただ附子の傍にある小顆のことで、棗核のやうなものだ。木鼈子といふは喙、附、烏、雄、側中の毗患なるもので、藥には入れない。

保昇曰く、形の整正なるものが烏頭である。兩岐になつたものが烏喙である。細長くして三四寸ほどのものが天雄である。根の旁に芋のやうに散つて生ずるものが附子である。旁に連つて生ずるものが側子である。この五物は同根に出て名稱を異にするものだ。苗は高さ二尺ばかり、葉は石龍芮、及び艾に似てゐる。

宗奭曰く、五者は皆一物だ。ただ大小、長短に依つて形容した名稱といふに過ぎない。

莖ヲ著ケ、又次年ノ
 小根ヲ伴フ事アリ
 川島ノ原産物ハひろ
 ハのからニとぶシテ
 充ツルチ正條トスレ
 ドモ、未ダ組織構造
 ノ顯微鏡的研究ヲ經
 ザルチ以テ遽ニ斷定
 スルチ得ズ、尙和産
 ノ烏頭草烏頭ト稱ス
 ルモノハトリカブト
 (Aconitum japoni-
 cum)(A. chinensis)
 等ニヨルモノニシテ
 別物ナリ、又アコニ
 ヲト根トシテ英、米、
 獨、佛藥局法ト共ニ
 我藥局法ニ採川スル
 ハニクA. Napellus,
 L. ナ
 (1) 健爲ハ全部鉛ノ
 註ヲ見ヨ。
 (三) 廣漢ハ漢ノ郡名。
 今ノ四川省梓潼縣ニ
 治シ、涪江ノ沿流、
 今ノ四川省遂寧縣以
 北、龍安、及び甘肅省

ノ文州、階州、陝西
省ノ寧羌等ノ地ヲ包
ス。後漢ニハ今ノ四
川省新津縣ニ治ヲ徙
シ、晉ニ今ノ遂寧ノ
北ニ徙シ、寧デマタ
後漢ノ舊治ニ復ス。
〔貞〕則漢ハ漢ノ縣名。
今ノ河南省確山縣ノ
南、吳碧河ノ北ニ放
城在リ。漢ニハ汝南
郡ニ屬ス。
〔王〕綿州ハ隋、唐ニ
置ケ。今ノ四川省綿
陽縣ソノ地ナリ。龍
州ハ西魏、唐ニ置ケ。
今ノ四川省平武縣ノ
東南ニ置城ナリ。俱
ニ漢ノ廣濟郡ノ地ナ
リ。
〔云〕大觀ニ穂ニ作ル、
疵穂ハ惡實。
〔七〕彰明縣ハ今ノ四
川省彰明縣ソノ地ナ
リ。今ノ綿州ノ北、
邛崃縣六里ノ地點ナ
リ。書云、彰明縣管

頗曰く、五者は、今はいづれも蜀の地に出る。すべて一種の草から産するものだ。その栽培状態は、龍州で作るものは、冬至前に先づ畑を五七回耕して猪糞を肥料として加へ、然る後に種を蒔いて逐月に耕耘し、翌年の八月後になつて始めて完全に成熟する。その苗は高さ三四尺、莖は四稜になり、葉は艾のやうだ。花は紫碧色で穂になり、その實は細く小さく、桑椹のやうな形状で黒色だ。本來はただ附子一種のみを種ふるのだが、成熟後になると他の四種の物が生ずるので、長さ二三寸になつたものを天雄といひ、附子の旁にある尖角を分け取つて側子といひ、附子の極めて小なるものをやはり側子といふ。当初に種ゑた附子はその場合には烏頭であつて、それ等以外の大、小のものとすべてを附子といふのである。八角のものが上級品となつてゐる。綿州の〔毛〕彰明縣で多くこれを栽培するが、就中赤水一郷のもののみが最も佳し。しかし、その採收の時、月は本草と合致しない。謹んで按ずるに、本草では、冬季に採るものを附子、春季に採るものを烏頭とし、博物志には『附子、烏頭、天雄は一物であつて、春、秋、冬、夏にこれを探る』とあつて、各々異つてゐるが、廣雅には『奚毒は附子であつて、一歳のものを側子といひ、二年生のもの

下ノ一小村ナリ。

を烏喙といひ、三年生のものを附子といひ、四年生のものを烏頭といひ、五年生のものを天雄といふ』とある。現在では、この草を一年栽培して右の五物が生ずるのだが、これは現代の栽培法が進歩して能率的になつてゐるところから、かやうに増殖と同時に收穫とに成功してゐるわけであらうか。

時珍曰く、烏頭には二種類ある。

彰明に産するものは即ち附子の母である。今一般に川烏頭と稱するものがそれであつて、春の末期に子を生ずるものだから『春に採るものが烏頭』といひ、冬になればその生じた子が已に一箇の物に成熟するから『冬に採るものが附子』といつたのである。天雄、烏喙、側子などいふは、いづれもその生ずる子の多くのものに對し、それぞれその形狀に因つて形容した名稱だ。生ずる子の少ないものもあれば、また單に種ゑたもののみが成熟するに過ぎぬものもある。それ等は無論右のやうな數種のものがない。

江左、山南等の諸地に産するものは本經に列記された烏頭である。今一般に草烏頭と稱するものがそれであつて『汁を煎じて射罔を作る』とあるがそれを證明して

(一) 赤水以下ハ彰明縣ノ管下、赤水沿岸ノ小村落ナリ。
 (二) 龍安ハ今ノ四川省龍安縣ノ地ナリ。
 (三) 龍州ハ清ニ出ヅ。齊歸、木閣、青地等ノ小村落所在未詳。小坪、一本小平ニ作ル。坪正トス。四川北部ノ俗、小村落ヲ坪ト稱ス。
 (四) 一本ニ地ニ猪ニ作ル。猪廬ハ猪ノ別名ナリ。
 (五) 本草彙言ニハ、

ゐる。陶弘景は烏頭に二種あることを知らずして、附子の烏頭の説明を直ちに移して射罔の烏頭に註釋したのであつた。そのために後來の諸家は甚だ辨別に疑惑を生じたのであつて、雷斅の説に至つては就中事實と隔つてゐる。宋時代の人、楊天惠が著した附子記の記述が甚だ正確詳細を極めてゐるから、茲にその概要を撮録する。一讀の下、論辯を俟たずして明瞭であらう。

綿州は故の廣漢の地で、その管下には八縣あるが、彰明縣だけに附子を産し、彰明縣の管下二十郷の内でも、附子を産するは赤水、廉水、昌明、會昌の四郷であつて、赤水に最も多い。毎年良き畑を熟耕して、うねを作り、龍安、龍州、齊歸、木閣、青地など諸處の小坪から種を取つて蒔くのであるが、春季に苗が生え、莖は野艾に類して澤があり、葉は地麻に類して厚く、その花は紫瓣黃蕊で、苞は長くして圓い。七月に採つたものをば早水拳と稱する。縮んで小さい。蓋しまだ完全に成育せぬものだ。九月に採れば立派なものである。かくて收穫するものは凡そ七種であつて、本を同くして末を異にするものだ。當初に種ゑて多くのものを生じたその元種を烏頭といひ、その烏頭に附いて

圓下ニ實類桑柘子細
而且黒ノ九字アリ。

（三）本草葉言ニ、頭
下ニ少有旁尖身長而

黒ノ八字アリ。

（四）本草葉言ニ、生
字下ニ葉相實不相

連ノ七字アリ。

（五）葉言ニ、子下ニ
獨生無ノ三字アリ。

（六）葉言、長下ニ三
四寸ノ三字アリ。

（七）皮字、正字通ニ
ヨル。

（八）七ノ字ハ與フルト讀
ム。

旁に（三）生ずるものを附子といひ、またその左右に對偶して生ずるものを鬲（四）
子といひ、附して（五）長いものを天雄いひ、附して尖つたものを鉗子（六）といひ、附
して上方に出るものを側子（七）といひ、附して不規則に散生するものを漏藍子（八）とい
ふ。いづれも脈絡、連貫して子が母に附いたやうなものが、附子が最も貴重
な性質を有するところから、『附』なる名稱を獨占したといふわけだ。概して元
種一箇に對して六七箇以上の子を生じたものは皆形が小さいが、元種一箇に子
二三箇のものは稍大きく、元種一箇に對し只一箇だけ生ずるものは特に大きい。
附子の良否を形狀の上からいへば、正しく蹲坐（九）して節が正しく、角の少ないもの
が上級品で、鼠乳の多い節のあるものはこれに次ぎ、形が歪（十）んで傷缺（十一）があり
（十二）皮皺のあるものは下等品だ。本草に『附子は八角なるものが良し』とあるそ
の角を側子だといふ説は甚だ謬（十三）つてゐる。色澤の上からいへば、花の白いもの
の根が上級品で、鐵色のものがこれに次ぎ、青緑のものは下等品だ。天雄、烏
頭、天錐は、いづれも豐實にして一握（十四）りに盈（十五）つるほどのものが勝れたものだ。
漏藍、側子などいふは、園主が勞役人夫に（十六）乞（十七）へるほどのものだから、數ふるに

足らない。

謹んで按ずるに、この記載にある漏藍は、雷敷の所謂木鼈子、大明の所謂虎掌のことであつて、禹子は鳥喙のこと、天錐は天雄の類のものである。醫方には一向それ等の名稱がないが、功用もやはり似寄つたものらしい。

〔修治〕

保昇曰く、附子、烏頭、天雄、側子、鳥喙は、採取したならば生熟湯で氣を滅せぬやうにして半日浸して取り出し、白灰に數々裹み易へて乾かしめる。又、ある法では、米粥べいしゆく、及び糟、麴などに漬けるが、いづれも前記の方法に及ばない。

頤曰く、この五物は採收と同時に釀かし作るものだ。その方法は、六个月前から大、小麴、麴を準備し、採取する半月前に大麥で煮た粥にその麴を入れて醋を作り、熟した時糟を去つて用ゐる。その醋は甚だ酸味が過ぎてはならぬもので、酸が過ぎるときは水を入れて稀釋する。その醋を新しい甕に入れた中へ附子を根鬚を去つて納れ、七日間漬けて一日一回、つつ攪かきき廻し、かくて撈すくひ出して粗い篩に攤し、白い衣の生ぜぬやうに、慢ゆるい風に吹かせて日中に百十日間晒し、内部まで乾き透る

を適度とする。強烈な日光に晒しては皴になつて皮が肉に附かないものだ。

時珍曰く、按ずるに、附子記には『この物は常に満足な結果を得ることはなかなか六ヶ敷いもので、完全な立派なものを種ゑても苗が思ふやうに茂らなかつたり、苗はよく秀でても根が十分に發育しなかつたり、完全なものを得てもそれを醸して見ると腐つて了つたり、醸することが思ふやうに行つても曝す場合には攀んで了つたり、あだかも神異の物があつて陰に支配するのではないかとさへ思はれる。そのために、耕作に従事するものは常に成功を神に禱り、その神を『藥妖』と呼んでゐる。これを醸す方法は、漉さぬ醋を用ゐ、密室中で一箇月ほど漬け覆ふてから取り出して曝乾するのだが、醸すために醋に入るときは拳ほどの大いさのものも、完全に曝乾し仕上げて見ると一握に足らぬほどになる。それ故に一箇で一兩に達するものは極めて得難いのであつて、その土地の者の話では「半兩以上のものではさへあれば皆良い。蜀地方には服餌するものが稀だが、ただ秦、陝、閩、浙の地方でこれを需要する。しかし秦地方で纔かに商つてゐるものは下級品だ。閩、浙で纔かにその中位のものが手に入る。上級品となればいづれも宮廷、貴人に獨占される」とい

ふ』とある。

○弘景曰く、凡そ附子、烏頭、天雄を用ゐるには、いづれも微し炮いて折いて用ゐる。焦し過ぎてはならない。ただ薑附湯だけには生で用ゐる。一般醫方で附子を用ゐる場合には、必ず甘草、人參、生薑と相配合することになつてゐる。それ等のものは毒を制するものだからだ。

二ハ本草原始ニハ、
午チ平ニ作ル、即チ
地上チ平ニシト讀マ
スルナリ。

敦曰く、凡そ烏頭を使用するには、文武火中で炮いて皴ませ、それを壁つゐいて用ゐるがよし。附子を用ゐる場合には、底が平で九の角があり、鐵のやうな色で一箇の重量一兩のものをを用ゐるがよし。それならば藥氣が完全だ。熱を加へるには、雜木の火を用ゐてはならぬ、ただ柳木灰火の中で炮き皴ませ、刀で表面の孕ようし子を刮り去り、竝に底尖を去つて壁き破り、屋根下の二ハ午の方位に土坑を掘つて一夜それに納れ、取出して焙じ乾して用ゐる。陰制にする場合には、生で皮の尖底を去つて薄く切り、東流水に黑豆と共に五晝夜浸して漉出し、日中に曝して用ゐる。

震亨曰く、凡そ烏、附、天雄は、童尿を浸透して煮て用うべきもので、それで毒を殺し、同時に下行の力を助ける。鹽少量を入れるが就中好し。或は尿に十四日間

浸して壞れたものを揀り去り、竹刀で一箇を四片づつに切つてまた水で洵り淨め、逐日水を換へて再び七日間浸し、それを晒し乾して用ゐる。

時珍曰く、附子は、生で用ゐれば發散し、熟したものをを用ゐれば峻烈な補的作用がある。生で用ゐるには、陰制の方法の如くして皮、臍を去つて藥に入れる。熟したものをを用ゐるには、水に浸してから炮いて發折させ、皮、臍を去つて熱い内に切片し、再び炒つて内外俱に黄色にし、火毒を去つて藥に入れる。又、ある法では、一箇毎に甘草二錢、鹽水、薑汁、童尿各半盞と共に煮熟し、一夜の間火毒を出して用ゐる。それで毒はなくなるものだ。

〔九〕氣味

【辛し、溫にして大毒あり】別錄に曰く、甘し、大熱なり。普曰く、神農は辛しといひ、岐伯、雷公は甘し、毒ありといひ、李當之は苦し、大溫にして大毒ありといふ。

前（九）後含有スル、又ヤ
バコニチン邦産生藥
中ニ檢出セラレタ
リ。
F. F. C. 62; U. S.

元素曰く、大辛、大熱にして、氣厚く味薄く、升るべく降るべく、陽中の陰であり、浮中の沈であつて、如何なる部分にも到達する。諸經に對して功用を導き入れる藥である。

P. 85; U. W. (2) 18; W. P. 200; J. Ch. Soc. 190(77) 45; P. H. 224; F. H. (12); N. S. D. 101; Watson. 297; St. G. B.N. 535, 814; A. J. P. 1913 (35) 394; T. M. 180(4) 719; Kyoto. 1921 (18) 142; Arch. Th. 1924 (262) 55; Wtl. (2) 40; C. A. 1932(16) 2887, 2962; 1935(19) 290; 藥説明(二五)一〇六八〇九、一三(一)六(七)二二〇、三五(二四五)六五五、六二(三七二)一三三、漢藥寫真集成(一)六七〇。

大觀ニハ疹ニ作ル。
二二大觀ニハ冷字ナリ。

好古曰く、手の少陰、三焦、命門に入るの劑であつて、その性は走つて止まらぬものだ。止つて行らぬ乾薑のやうなものとは違ふ。

趙嗣真曰く、熟附は、麻黃と配合すれば發散の中に補する作用がある。仲景の麻黃附子細辛湯、麻黃附子甘草湯がその例だ。生附は、乾薑と配合すれば補の作用の中に發散の作用がある。仲景の乾薑附子湯、通脈四逆湯がその例だ。

戴原禮曰く、附子は乾薑が無ければ熱せぬ。甘草と配合すれば性が緩となる。桂と配合すれば命門を補す。

李燾曰く、附子は、生薑と配合すれば能く發散し、熱を以て熱を攻める。また虛熱を導いて下行し、その作用に依つて冷病を除くものだ。

之才曰く、地膽が使となる。蜈蚣を惡み、防風、黑豆、甘草、人參、黃耆を畏る。時珍曰く、綠豆、烏韭、童尿、犀角を畏れ、豉汁を忌む。蜀椒、食鹽と配合すれば、下つて命門に達する。

主治

【風寒欬逆、邪氣寒濕で、蹠蹠し、拘攣し、膝痛し、歩行不能のもの。癥堅積聚を破る。血癥、金瘡】(本經)【腰脊の風寒、脚氣で冷冷として弱さる。

の、心腹の冷痛、霍亂轉筋、下痢赤白。中を溫め、陰を強くし、肌、骨を堅くする。又、墮胎には百藥の長である【別錄】【脾、胃を溫暖にし、脾濕、腎寒を除き、下焦の陽虛を補す】(元素)【臟、腑の沈寒、三陽厥逆、濕淫腹痛、胃寒蜷動を除き、月經閉止を治し、虛を補し、壅を散ず】(李杲)【督脈の病となり、脊が強して厥するもの】(好古)【三陰傷寒、陰毒寒疝、中寒、中風の痰厥、氣厥、柔痙、癰癩、小兒の慢驚、風濕麻痺、腫滿脚氣、頭風、腎厥頭痛、暴瀉脫陽、久痢脾泄、寒瘧瘴氣、久病の嘔噦、反胃噎膈、癰疽の斂らぬもの、久漏冷瘡を治す。葱涕に合せて耳を塞げば聾を治す】(時珍)

(註) 牧野バフ、烏頭

ノ原植物ハ、或ハ

Aconitum Fischeri,

Reich), 乎。

烏頭 即ち附子の母である。

主治

【諸風の風痺、血痺の半身不遂。寒冷を除き、臟、腑を溫養し、心下の堅痞、感寒腹痛を去る】(元素)【寒濕を除き、經を行らし、風邪を散じ、諸種の積冷の毒を破る】(李杲)【命門の不足、肝の風虛を補す】(好古)【陽を助け陰を退ける功力は附子と同一だが、やや緩である】(時珍)

發明

宗奭曰く、虛寒を補するには附子を用うべきもので、風患者には多く天雄を用ゐる。大體かやうなもので、烏頭、烏喙、附子を用ゐるにはその物と病と

の對照を量つて用ゐるものだ。

時珍曰く、按ずるに、王氏の究原方に「附子は性が重滯で脾を溫め寒を逐ひ、川烏頭は性が輕疎で脾を溫め風を去るもので、寒疾の場合には附子を用ゐ、風疾の場合には川烏頭を用ゐる。あるひは、凡そ風に中つた患者には、第一著に風藥、及び烏、附を用ゐてはならぬ。先づ氣藥を用ゐて後に烏、附を用うるならば適當な方法だといふ。又、凡そ烏、附の藥を用ゐるには、いづれも冷服すべきものである。それは熱因寒用の法則であつて、蓋し陰寒が下の部分に在る虛陽上浮は、治するに寒を以てすれば、陰氣がますます甚しくして病勢が増進し、これを治するに熱を以てすれば、拒格して藥が納まらぬ。そこで熱藥を冷飲すれば、藥が食道を通過して後に冷の體が既に消し、熱性が發して來るので病の氣が隨つて癒える。その情に逆らはずして大なる効果を擧げる所以であつて、これは反治の妙である。昔、張仲景は、寒疝の内結を治するに蜜で煎じた烏頭を用ゐた。近效方では、喉痺を治するに蜜で炙つた附子を用ゐ、含んで汁を嚥ませる。朱丹溪は、疝氣を治するに烏頭、梔子を用ゐた。いづれも熱因寒用である。李東垣は、馮翰林の姪が陰盛にして陽に格する

傷寒で、顔面赤く、目も赤く、煩渴し、引飲し、脈が七八至ばかりとなり、ただ按診すると散ずる容體であつたのを治療して、薑附湯に人參を加へ、半斤を投じて服せせると、發汗して癒えたのであつた。此の如きはまことに神聖の妙である』とある。

吳○綬曰く、附子は陰證に對する要藥である。凡そ傷寒が三陰に傳變したもの、及び中寒に陰の證を挟み、身に大熱があつても脈の沈なるものには、必ずこれを用ゐる。或は、厥冷し、腹痛し、脈が沈細となり、甚しきは唇青く、陰囊の縮むものには、必ずこれを用ゐねばならぬ。これは陰を退け陽を回らすの力があり、起死回生の功がある。近世では、陰證傷寒に對し、往往遲疑して敢て附子を用ゐようとせず、そのまま陰極まり陽竭さてから、やうやくこれを用ゐるが、それでは已に遅い。苟も陰の傾向を有つ傷寒は、内外共に陰陽の氣が頓に衰へるものだ。必ず急に人參を用ゐて脈を健全にし、その源に力を付け、附子を佐として用ゐて經を溫め、寒を散ずべきものである。この方法を捨てて、何を以てこの病を救ひ得やうか。

劉○完素曰く、俗方に、麻痺を治するに多く烏、附を用ゐるが、この物は氣が暴し

くして能く道路を衝開するので愈々麻する。沒藥は氣が甚だしくして正しく、正氣が行るので麻痛が癒える。

張元素曰く、附子に白朮びやくじくを佐とすれば寒濕を除くの聖藥となる。濕藥には少しこれを加へて經に引くがよし。又、火の源を益して陰翳いんえいを消し、そこで大、小便の適度を保たすものは烏、附である。

虞搏曰く、附子は雄壯の質を稟うけ、斬關奪ざんかんだつしゆう將の氣を有するもので、能く補氣の藥を導き、十二經に行らして散失した元陽を回復し、補血の藥を導き、血分に入つて不足した眞陰を滋養し、發散の藥を導き、腠理さいりを開いて表に在る風寒を驅逐し、溫煖の藥を導き、下焦に到達せしめて裏に在る冷濕を除去する。

震亨曰く、氣虛で熱の甚しい患者には、少し附子を用ゐて人參、黃耆の藥力を行らしめるがよく、肥滿して濕の多い患者にも、少し烏、附を加へて經に行らしめるがよし。仲景の八味丸は、これを用ゐて少陰の嚮導きやうどうとしてあるので、後世それに因つて附子を補藥と心得てゐるが、誤だ。附子は走つて守らざるものだ。その健悍にして走下する性を利用し、地黃の滯を遠き部分にまで行らす點を取るまでのことで

ある。烏頭、天雄は、いづれも氣壯に、形の偉なるものだ。下部の藥の佐となすべきものである。それが人體を害ふ禍に關して唱道する人がないところから、相率ゐて因襲的に治風の藥、及び補藥と心得て、ために人を殺してゐる場合が多い。

王履曰く、仲景の八味丸は、陰火を兼ねる不足のもののためにする方劑であり、錢仲陽の六味地黃丸は、陰虛のもののためにする方劑であつて見れば、附子は補陽の藥であつて滯を行ふためのものではない。

好古曰く、烏、附は、身涼し、四肢厥するもの以外には僭に用ゐてはならない。附子を服して火を補すれば、必ず水を妨げ涸らすものだ。

○時珍曰く、烏、附は毒藥であつて、危篤の病以外には用ゐられないが、補藥の中に少量を加へて引導すれば、その功力を甚だ捷にする。ある者は纔に一錢匕を服すると、直ちに發燥して堪へ難き狀態に陥つたといふが、しかし、昔は一般に補劑に用ゐて常服したものだ。古代と現代とでは、運氣に不同があるのかも知れない。荆府の都昌王は、身體が瘦せて冷え、他に病氣とはなかつたが、日日附子の煎湯を飲み、兼ねて硫黃を嚼み、數年の間繼續された。蕪州の衛張百戸は、平生鹿茸、

三三今ノ河南省滑縣
治チ古ニ滑臺ト稱
ス。マタ白馬城トイ
フ、元和郡縣志ニ滑
州治白馬城。即古滑
臺トアリ。然レド
モ此ニイフ滑臺トス
ルハ頗ル疑フベシ。
恐ク通典ニイフ滑國
ノ地ノ邑城ヲ指スニ
ハアラザルカト思ハ
ル。滑國ハ西域中ノ
一古國、後魏以後ニ
及ビ、波斯、滑葉、罽
賓、鐵鼓、疎勒、姑
墨、于闐等ソノ傍國
ヲ征シ大イニ威ヲ振
フトイフ。ソノ專ラ
據リタル地ハ于闐、
康居等ノ間ナリシガ
如シ。滑國ノ記載ハ
太平御覽ニ詳ナリ。
續群錄、未ダ見ズ。

附子の薬を服し、八十餘歳に及んで通常人に倍する健康であつた。宋の張杲の醫説には『趙知府は常に酒色に耽つた人で、毎日乾薑熟附湯を煎じて硫黃金液丹百粒を呑んだ。それで能く健啖だが、用ゐなければ氣力が弱り、倦怠を覺え、身體が支へ得なかつた。壽命は九十までながらへた。他の人間では一粒を服しても害をなすのだが——』と記載してある。これ等の數人は、いづれもその臟腑の天稟が他と異る偏質だつたので、これを服しても益あつて害なしといふわけだつたのだ。常理を以て一概に論ずるわけに行かない。又、瑣碎錄には『三三滑臺は風土が極めて寒い。住民は附子を芋か栗のやうに啖ふ』とある。これはその地の環境から受くる影響の然らしむるところと見える。

附方

舊二十六、新八十七。

【少陰傷寒】發病二三日で脈が微細となり、ただ寢て

ゐたがり、小便の色白きには、麻黃附子甘草湯で微し發汗せしめる。麻黃を節を去つて二兩、甘草を炙いて二兩、附子を炮いて皮を去つて一箇を用ゐ、水七升で先づ麻黃を煮て沫を去り、他の二味を納れて三升到煮取り、三回に分服して微し汗を取る。(張仲景傷寒論) 【少陰發熱】少陰の病は、發病の當初には反つて發熱し、脈の沈す

るものだ。麻黃附子細辛湯で發汗する。麻黃を節を去つて二兩、附子を炮いて皮を去つて一箇、細辛二兩を用ゐ、水一斗で先づ麻黃を煮て沫を去り、他の二味を納れて三升に煮取り、三回に分服する。(同上) 【少陰下痢】少陰の病は、清水、穀物を下利し、裏寒し外熱し、手、足が厥逆し、脈微にして絶せんとし、身が反つて惡寒せぬものだ。その患者が、顔色が赤く、或は腹痛し、或は乾嘔し、或は咽痛し、或は利が止み、脈の出ぬには、通脈四逆湯——大附子一箇を皮を去つて生で八片に破り、甘草を炙いて二兩、乾薑三兩、水三升を一升到煮取り、溫めて二回に分服する。それで脈が出て癒えるものだ。顔色の赤きには、葱薹九本を加へ、腹痛するには、芍藥二兩を加へ、嘔するには、生薑二兩を加へ、咽痛するには、桔梗一兩を加へ、利が止み、脈の出ぬには、人參二兩を加へる。(同上) 【陰病惡寒】傷寒で、已に發汗しても解せず、反つて惡寒するは虚したものである。芍藥甘草附子湯で補す。芍藥三兩、甘草を炙いて三兩、附子を炮いて皮を去つて一箇、水五升を一升五合に煮取つて分服する。(同上) 【傷寒發躁】傷寒で、下して後に又その汗を發し、晝間は煩燥し、眠れず、夜間安靜ならず、嘔せず、渴せず、表證なくして脈が沈、微となり、身に

大熱なきものは、乾薑かんきやうぶし附子湯たうで温める。乾薑一兩、生附子一箇を皮を去つて八片に

破り、水三升で一升到煮取つて頓服する。（傷寒論）『陰盛にして陽に格するもの』傷

寒の陰盛格陽。その患者が必ず躁熱して水を飲まず、脈が沈し、手、足が厥逆する

はこの證である。霹靂散へきれきさん——大附子一箇を焼いて性を存して末にし、蜜水で調へて

服す。寒氣を通散し、然る後に熱氣が上行し、汗が出て癒える。（孫兆口訣）『熱病の

吐、下』及び下利し、身冷し、脈微にして發躁して止まぬものには、附子を炮いて

一箇を皮、臍を去つて八片に破り、鹽一錢を入れた水一升で半升到煎じて温服する。

立ろに效がある。（經驗良方）『陰毒傷寒』孫兆の口訣に『房事後に寒を受けたために

少腹が疼痛し、頭が疼き、腰重く、手、足が厥逆し、脈息が沈、細となり、或は呃

逆を作すには、いづれも退陰散がよし。川烏頭、乾薑等分を切つて炒り、そのまま

冷まして散にし、一錢づつを水一盞、鹽一撮で半盞に煎じて温服し、發汗して解す。

○本事方では、玉女散——陰毒の心腹痛、厥逆の惡症候を治す。川烏頭を皮、臍を

去り、冷水に七日浸して切り晒し、紙に裹つんで取り收め、患者があつた場合にそれ

を末にし、一錢を、鹽八分を入れた水一盞で八分に煎じて服す。さながら猪血のや

うな陰毒を壓下する。一回再服する。○濟生では、回陽散——陰毒傷寒で、顔色青く、四肢が厥逆し、腹痛し、身冷する等、一切の冷氣を治す。大附子三箇を炮き、皮、臍を裂き去つて末にし、三錢づつを薑汁半盞、冷酒半盞で調へて服す。良久して臍下が火のやうに煖かになるを度とする。○續傳信方では、陰毒傷寒で、煩躁し、迷悶し、急するものを治す。重さ半兩の附子一箇を生で四片に破り、生薑一大塊を三片にし、糯米一撮と水一升で六合に煎じて溫服し、暖にして臥す。汗の出ることもあり、出ぬこともあるが、心の定まるを俟ち、水解散の類で解す。冷水を與へてはならぬ。もし渴するならば、更に萍を煎じて服す。屢々實驗上効果が多かつた。

【中風痰厥】精神朦朧ちゆうろうとして意識判然せず、口眼喎斜くわんしやするもの、并に體虛せる者が

瘧疾に罹つて寒多きには、五生飲——生川烏頭、生附子を、いづれも皮、臍を去つて各半兩、生南星一兩、生木香二錢五分を用ゐ、五錢づつを生薑十片、水二盞で一盞に煎じた湯で溫服する。(和劑局方)

【中風氣厥】痰壅たんようで、精神朦朧として意識明瞭ならず、六脈が沈、伏するには、生附子を皮を去り、生南星を皮を去り、生木香半兩、以上を四錢づつ、薑九片、水二盞を七分に煎じた湯で溫服する。(濟生方)

【中風

（三）大觀ニハ外臺秘要トアリ。

（四）五痺ハ痺ノ誤ナラン、痺ハ風疾ノ義。

偏發】羌活湯

生附子一箇を皮、臍を去り、羌活、烏藥と各一兩を用ゐ、四錢

づつを生薑三片、水一盞を七分に煎じた湯で服す。（王氏簡易方）

【半身不遂】遂に癱

瘓を作すには、附子一兩を無灰酒一升到七日間浸し、隔日に一合を飲む。（二）（三）（延年秘

錄）【風病癱緩】手、足（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十七）（十八）（十九）（二十）（二十一）（二十二）（二十三）（二十四）（二十五）（二十六）（二十七）（二十八）（二十九）（三十）（三十一）（三十二）（三十三）（三十四）（三十五）（三十六）（三十七）（三十八）（三十九）（四十）（四十一）（四十二）（四十三）（四十四）（四十五）（四十六）（四十七）（四十八）（四十九）（五十）（五十一）（五十二）（五十三）（五十四）（五十五）（五十六）（五十七）（五十八）（五十九）（六十）（六十一）（六十二）（六十三）（六十四）（六十五）（六十六）（六十七）（六十八）（六十九）（七十）（七十一）（七十二）（七十三）（七十四）（七十五）（七十六）（七十七）（七十八）（七十九）（八十）（八十一）（八十二）（八十三）（八十四）（八十五）（八十六）（八十七）（八十八）（八十九）（九十）（九十一）（九十二）（九十三）（九十四）（九十五）（九十六）（九十七）（九十八）（九十九）（一百）

は、主として神驗烏龍丹を用ゐるがよし。川烏頭を皮、臍を去り、五靈脂と各五兩

を末にし、龍腦、麝香五分を入れ、水を滴らして彈子大の丸にし、一九づつを、先

づ生薑汁で研り溶かして暖酒で調へて服す。一日二服し、漸次増加して五七丸に達

すれば、手が擡がり、歩が運べ、十丸に達すれば、頭髮を白から梳れるやうになる。

（梅師方）【風寒濕痺】麻木して不仁なるもの、或は手、足の不遂なるには、生川烏

頭末四錢づつを、好き白米で煮た粥一盃に入れ、慢かに熬つて適當になつた時、薑

汁一匙、蜜三大匙を投じ、空腹にして啖る。或は薤苳末二錢を入れる。左傳に『風

淫で末病む』とは四末のこと、脾は四肢を主るものだ。風淫が肝に客すれば脾を

侵して四肢が病むことである。この湯は極めて效力のあるもので、予は毎にこれを

患者に與へて好結果を擧げてゐる。（許學士本事方）【體虛して風あるもの】外部に寒濕

を受けたために、身體が空中に在るやうに覺ゆるには、生附子、生天南星各二錢、生薑十片、水一盞半を慢火で煎じて服す。予が曾てこの病に罹つたとき、醫博士の張子發からこの方を授かり、二服で癒えた。(本事方) 【口、眼喎斜】生烏頭、青礬各等分を末にし、一字づつを鼻中に嚙すひ入れる。涕を出し、涎を吐き、立ろに效あること無比の藥である。これを通關散と名ける。(鏡中秘寶方) 【俄かに口の噤瘖するもの】卒忤、停尸。いづれも附子末を喉中に吹入れば瘖える。(千金翼) 【産後の中風】

〔三六〕腸風臟毒ハ共ニ
便血ノコト。

身體を角弓のやうに反張し、口噤して發語し得ぬには、川烏頭五兩を塊に剉み、黒大豆半升と共に炒つて半ば黒くし、酒三升をその鍋の中に傾け入れて急に攪かきまぜ、絹で濾してその酒を取り、一小盞を微溫にして服し、汗を取る。もし口を開かぬ場合にはこじ開けて灌そそぎ込む。なほ效の現はれぬときは烏雞糞一合を加へ、炒つてその酒中に入れて服す。瘖えるを度とする。(小品) 【諸風、血風】烏荆丸——諸風で縦緩し、言語蹇澀けんじやくし、全身麻痺するもの、及び婦人の血風で頭痛、目眩するもの、〔二六〕腸風、臟毒で下血して止まぬものを治す。これを服するが尤も有效だ。痛風で攣れん搗ちくし、頤頤いぎの收まらぬは六七服で瘖える。川烏頭を炮いて皮、臍を去つて一兩、荆

芥穗二兩を末にし、醋麪糊で梧子大の丸にし、温酒、或は熱水で二十丸づつを服す。

〔和劑方〕『婦人の血風』虚冷し、月經が均調ならず、或は手、脚の心が煩熱し、或は

頭部、面部が浮腫し、頑麻するには、川烏頭二斤、清油四兩、鹽四兩を共に鍋で熬

り、裂けて桑椹さうじんの色のやうになるを度として皮、臍を去り、五靈脂四兩を末にして

搗きませ、蒸餅で梧子大の丸にし、空心に温酒、鹽湯で二十丸を服す。男子の風疾

をも治す。〔梅師方〕『諸風痼疾』生川烏頭を皮を去つて二錢半、五靈脂半兩を末にし、

猪心血で梧子大の丸にし、一丸づつを薑湯に溶して服す。『小兒の慢驚』搐搦し、

涎壅ぜんようし、風逆するには、川烏頭を生で皮、臍を去つて一兩、全蠍ぜんかく十箇を尾を去り、

これを三服に分け、水一盞、薑七片の煎湯で服す。〔湯氏嬰孩寶鑑〕『小兒の項軟』これ

は肝、腎の虚に風の邪が襲ひ入つたものである。附子を皮、臍を去り、天南星と各

二錢を末にして薑汁で調へ、攤して天柱骨に貼り、鴻青丸を内服する。〔全効心鑑〕

『小兒の顛陷てんかん』綿烏頭、附子を、いづれも生で皮、臍を去つて二錢、雄黃八分を

末にし、葱根と搗きませて餅にし、陥つた部分に貼る。〔全効心鑑〕『麻痺疼痛』仙桃

丸——手、足麻痺し、或は癱瘓なんはんし、疼痛し、腰、膝の痺痛するもの、或は打撲傷、

〔二七〕天柱ハ膈後髮際
脊脈ヲ布左ニ去ルコ
ト一寸三分。
〔二八〕顛ハヒヨムケ。

(二九) 閃肭ハ 脂紡過多。

(三〇) 大觀ニ千金翼ニ作ル。

(二九) 閃肭せんごつで忍び難く痛むを治す。生川烏を皮を去らず、五靈脂と各四兩、威靈仙五兩を洗ひ焙じて末にし、酒糊で梧子大の丸にし、七丸乃至十丸づつを鹽湯で服す。茶を忌む。この藥は、常服すればその效神の如きものだ。(並濟方) 【風痺の肢痛】營衛が行らぬものである。川烏頭を炮いて皮を去り、大豆と共に汗の出るまで炒つて豆を去つて焙じ乾し、全蠍半錢を焙じて末にし、醃醋げんさくで熬稠して綠豆大の丸にし、一日一回、七丸を溫酒で服す。(聖惠方) 【腰、脚の冷痺】疼痛するは風があるためだ。川烏頭三箇を生で皮、臍を去つて散にし、醋で調へて帛に塗つて貼る。須臾にして痛が止まる。(聖惠方) 【大風諸痺】痰澀たんそくし、脹滿するには、重さ半兩の大附子一箇を炮いて割き、春、冬は五日間、夏、秋は三日間酒に漬け、一合づつを服し、瘥えるを度とする。(聖惠方) 【脚氣の腿腫たいしゅ】久しく瘥えぬには、黑附子一箇を生で皮、臍を去つて散にし、生薑汁で膏のやうに調へて塗り、藥が乾けば再び塗る。腫の引くを度とする。(簡要濟衆) 【十指の疼痛】麻木して不仁なるには、生附子を皮、臍を去り、木香と各等分、生薑五片を水で煎じて溫服する。(王氏簡易方) 【風を搜り、氣を順にする】烏附丸——川烏頭二十箇、香附子半斤を薑汁に一夜漬け、炒り焙じて末

〔二〕臘月烏頭、外臺
秘要ヲ按ズルニ、臘
月烏頭屎ナリ、恐ク
ハ時珍誤認シテ引用
セルナリ。

にし、酒糊で梧子大の丸にし、十丸づつを温酒で服す。肌體が肥壯にして風痰あるものは、これを常服するがよし。〔治案方〕

【頭風の頭痛】外臺秘要では、臘月の烏頭一升を黄になるまで炒つて末にし、絹袋に納れて酒三斗の中に浸し、逐日温服する。○孫兆口訣では、附子を炮き、石膏を煨いて等分を末にし、腦、麝少量を入れ、半錢づつを茶、酒の任意のもので服す。○修真秘旨では、附子一箇を生で皮、臍を去り、綠豆一合と共に銚子に入れ、豆の熟するまで煮てから、附子を去つて綠豆を食ふ。立ろに瘥える。附子一箇毎に五回まで煮てよし。その後は末にして服す。【風毒の頭痛】望惠方では、風毒の攻注で、頭、目が忍び難く痛むを治す。大附子一箇を湯に泡けて皮を去つて末にし、生薑一兩、大黑豆一合を炒熟し、酒一盞で七分に煎じ、その附子末一錢を調へて温服する。○又、ある方では、二三十年瘥ざる頭風を治す。大川烏頭を生で皮を去つて四兩、天南星を炮いて一兩を末にし、毎服二錢を、細茶三錢、薄荷七葉、鹽梅一箇、水一盞を七分に煎じた湯で就寢時に温服する。○朱氏集驗方では、頭痛して腫まで痛むを治す。生烏頭一錢、白芷四錢を末にし、茶で一字を服してから、末を鼻から嚙ふ。ある患者にこれを用ゐて奏效した。

【風寒の頭痛】十便良方では、風寒が頭の内部に客して清涕を出し、項筋が急硬するもの、胸中の寒痰で清水を嘔吐するものを治す。大附子、或は大川烏頭二箇を皮を去つて蒸し、川芎かんきう、生薑各一兩を焙じ研り、茶湯で一錢を調へて服す。或は片に剉んで五錢づつを水で煎じ、三四日を隔てて一回服す。或は防風一兩を加へる。

○三因方では、必效散——風寒流注の偏正頭痛で、年久しく癒えぬを治す。最も神效がある。大附子一箇を生で四片に切り、薑汁一盞に浸して炙り、再び浸して再び炙り、汁が盡さるまで繰返して止め、高良薑と等分を末にし、一錢づつを臘茶清で

調へて服す。少時熱物を忌む。【頭風を摩散する法】頭を沐して風に中り、汗多く、

風に當るを不快に感ずるものは、風を先に治すべきものだ。一日經過すれば痛み甚しくなる。大附子一箇を炮いて食鹽と等分を末にし、方寸匕を顙上こんじやうに摩擦して藥力を行らしめる。或は油で調稀して用ゐるもよし。一日三回試みる。(張仲景方) 【年久

しき頭痛】川烏頭、天南星等分を末にし、葱汁で調へて太陽穴に塗る。(經驗) 【頭痛

斧劈ふへき】斧で割られるやうに痛んで忍び難きには、川烏頭末を烟に焼いて碗の内側に熏じ、それに溫茶を注ぎ泡けて服す。(集簡方) 【痰厥頭痛】破れるやうに痛み、厥氣

上衝し、痰が胸膈を塞ぐには、炮いた附子三分、釜墨四錢を冷水で調へて方寸匕づつを服す。吐いて癒るものだ。猪肉、冷水を忌む。【腎厥頭痛】指南方では、大附子一箇を炮熟して皮を去り、生薑半兩、水一升半で煎じて三回に分服する。○經驗良方では、韭根丸——元陽が虚して破るやうに頭痛し、眼睛が錐で刺すやうに痛むを治す。大川烏頭を皮を去つて微し炮き、全蠍を糯米で炒つて米を去り、等分を末にして菰根汁で綠豆大の丸にし、一日一回、十五丸づつを薄荷茶で服す。【氣虛頭痛】氣虛上壅の偏正頭痛で忍び難きには、大附子一箇を皮、臍を去つて研末し、葱汁、麪糊で綠豆大の丸にし、十丸づつを茶清で服す。○僧繼洪の澹寮方では、蠍附丸——氣虛頭痛には、ただこの方が最も造化の妙に合致する。附子は、陽を助け、虚を扶け、鍾乳は、陽を補し、鎮墜し、全蠍は、その鑽透する働きを取り、葱涎は、その氣を通ずる働きを取り、湯に使として用ゐるものの椒は下に達し、鹽は功用を引き、虚氣をして下部に歸せしめる。對證を正確にして用ゐれば奏效せぬものなしといふ。大附子一箇を心を剝り、毒を去つた全蠍二箇を入れ、剝り出した附末と鍾乳粉二錢半、白麪少量を水で和して劑としたもので包んで煨熟し、皮を去つて研末

〔三〕涌泉ノ穴ハ足心ニアリ。

〔三〕大觀ニ驗ノ下ニ後方ノ二字アリ。

し、葱涎で和して梧子大の丸にし、五十丸づつを椒鹽湯で服す。【腎氣の上攻】頭、項の轉移不能なるには、椒附丸——大熟附子一箇を末にし、椒二十粒の椒口に白麝を填滿し、水一盞半、薑七片と七分に煎じ、椒を去つて鹽を入れ、その湯に附末を點てて空心に服す。椒の氣は下部に逃し、逆氣を引いて經に歸す。〔本草方〕【鼻淵腦泄】生附子末を葱涎で和し、泥のやうにして〔三〕涌泉穴を含ふ。〔普濟〕【耳鳴の止まぬもの】晝夜間斷なきものには、烏頭を焼いて灰にし、菖蒲と等分を末にし、綿で裹んで塞ぐ。一日二回試みて效を取る。〔楊氏產乳〕【突然の耳の響閉】附子を醋に浸し、尖を削つて挿む。或は更にその上に二七壯灸する。〔本草拾遺〕【聾耳の膿血】生附子を末にし、葱涕で和して耳中に灌ぐ。〔肘後〕【喉痺腫塞】附子を皮を去つて炮いて拆かせ、蜜を塗つて炙つて蜜を浸み入らせ、それを含む。汁を嚥んではならぬ。已に十分腫れたものならば膿を出し、まだ十分ならぬものならば消く。〔本草拾遺〕【口瘡の久患】生附子を末にして醋、麝で調へ、一日二回、男は左、女は右の足心に貼る。〔三〕〔經驗〕【風蟲牙痛】普濟方では、附子一兩を灰に焼き、枯礬一分と末にして揩る。○又、ある方では、川烏頭、川附子を生で研り、麝糊で小豆大の丸にし、

一丸づつを綿に包んで咬む。○刪繁方では、炮いた附子末を孔中に納るれば止む。
【眼の劇しき赤腫】烈しく痛んで開き得ず、涙が出て止まぬには、附子の赤皮を削
つて末にし、蠶の糞ほどを皆中に著ける。痛の鎮まるを度とする。(張文仲備急方) 【一
切の冷氣】風痰を去り、全身の疼痛を鎮め、元氣を益し、力を強くし、精を固め、
髓を益し、人をして疾病を少からしめる。川烏頭一斤を五升人の甕鉢で七日間童尿
に浸し、逐日童尿を添加して溢れ出させ、壞れたものは揀出して用ゐず、その他の
ものを竹刀で四片に切り、新汲水で七回淘つてから水に浸して日毎にその水を換へ、
一定の日數に達したとき、取り出して焙じて末にし、酒で煮た麪糊で綠豆大の丸に
し、十丸づつを空心に鹽湯で服し、少し粥飯を食つて壓する。(經驗方) 【諸氣を升、
降する】暖かなれば宜流するものだ。熟附子の大きなもの一箇を二服に分け、水二
盞で一盞に煎じ、沈香汁を入れて溫服する。(和劑局方) 【中寒昏倒】薑附湯——體虛
して寒に中り、精神朦朧として意識不明瞭のもの、及び臍腹冷痛、霍亂轉筋、一
切の虛寒の病を治す。生附子一兩を皮、臍を去り、乾薑を炮いて一兩を用ゐ、三錢
づつを水二鍾で一鍾に煎じて溫服する。(和劑局方) 【心腹の冷痛】冷、熱して氣の不

調和なるには、山^{さん}梔^し子、川烏頭等分を生で研末し、酒糊で梧子大の丸にし、十五丸づつを生薑湯で服す。小腸の氣痛には、炒つた茴香^{うみきやう}、葱、酒を加へて二十丸を服す。

(王氏博濟方)

【心痛痞氣】濕熱であつて、寒鬱が因となつて發るものだ。濕熱を降す

梔子と寒鬱を破る烏頭を用ゐる。烏頭は梔子に導かれ、その性急速にして胃中に留らぬのである。川烏頭、山梔子各一錢を末にし、順流水に薑汁一匙を入れて調へて服す。(丹溪纂要)

【寒厥心痛】及び小腸、膀胱痛の止めやうなきには、神砂一粒丹

一熟附子を皮を去り、鬱^{うづ}金、橘^{きよく}紅と各一兩を末にし、醋麴糊で酸棗大の丸にして朱砂を衣にかけ、一丸づつを、男子は酒、婦人は醋湯で服す。(宣明方)

【寒痞腹痛】臍

を遶^{めぐ}つて痛み、手、足が厥冷し、自汗を出し、脈が弦して緊なるに主として用ゐる

大烏頭煎——大烏頭五箇を臍を去り、水三升で一升到煮取つて滓を去り、蜜二升を約れて煎じて水氣を盡さしめ、體質の強きものは七合を服し、弱きものは五合を服す。なほ瘥えぬときは翌日更に服す。(張仲景金匱玉函方)

【寒痞身痛】腹痛し、手足逆

冷し、不仁となり、或は身痛して睡眠不能となるに主として用ゐる。烏頭^{うづけいし}桂枝湯^{けいしとう}一

——烏頭一味を蜜二斤で半減するまで煎じ、桂枝湯五合を入れて一升到溶解し、二合

を初服して反應なきときは再服し、なほ反應なきときは五合まで増加する。反應が

あれば、酔へる如き状態となつて吐く。それが病に的中したのである。(金匱玉函)

【脇に引く寒疝】肋、心、腹が皆痛み、諸藥の奏效せぬには、大烏頭五箇を角を去つて四片に破り、白蜜一斤で煎じ透らせて取り、焙じて末にし、別の熟蜜で和して梧子大の丸にし、二十丸づつを冷鹽湯で服す。永く病を除く。(崔氏方) 【寒疝の滑泄】腹痛、腸鳴、自汗、厥逆するには、熟附子を皮、臍を去り、玄胡索(げんご)を炒つて各一兩、生木香半兩を用ゐ、四錢づつを、水二盞、薑七片で七分に煎じて温服する。(濟生方)

【小腸諸疝】倉卒散——寒疝腹痛、小腸氣、膀胱氣、脾、腎諸痛で、掣急忍び難く、汗を出し、厥逆するを治す。大附子を炒つて皮、臍を去つて一箇、山梔子を炒焦して四兩を用ゐ、三錢づつを、水一盞、酒半盞で七分に煎じ、鹽一捻を入れて温服する。○宣明方では、陰疝の小腹腫痛を治するに、蒺藜子(じりりし)等分を加へる。○虚する者には、桂枝等分を加へて薑糊で丸にし、酒で五十丸を服す。【虚寒の腰痛】鹿茸を毛を去つて酥(そ)で炙つて微し黄にし、附子を炮いて皮、臍を去つて各二兩、鹽花三分を末にし、棗肉で和して梧子大の丸にし、三十丸づつを空心に温酒で服す。○夷堅

（元）大觀ニ斗門方ニ
作ル。

志には『時に康祖大夫が心胸を病み、數竅すうけうから一樣に漏して汁を流し、二十年の長きに及んだ。又、腰痛に苦んで歩行に僂僂くゐゐのやうになり、身體、精神共に憔悴し、醫師も治療の方法がなかつたが、通判の韓子溫が治法を試みんとして聖惠方を調べ、この方を見出して服せたところ、十日餘で腰痛が滅じ、久服して遂に瘥え、心漏もやはり瘥えて、精力が平常に倍し、歩行も輕捷になつた。この方は元來腰を治するにかやうな效のあるものだ』とある。【元臟の傷冷】（元）經驗方では、附子を炮いて皮、臍を去つて末にし、水二盞にその末藥二錢を入れ、鹽、葱、薑、棗そうと共に一盞に煮取り、空心に服す。積冷を去り、下元を暖め、腸を肥し、氣を益す。酒、食共に碍さまたげなし。○梅師方では、二虎丸——元臟を補し、食欲を進め、筋骨を壯にする。烏頭、附子と合せて四兩を醋びんさくに三晝夜間浸して片に切り、地上に一小坑を掘つてその坑内を炭火で赤く燒き、醋三升と右の藥とを傾け入れて盆で密閉し、一夜置いて取り出して砂土を去り、青鹽四兩を入れて共に赤黃色に炒つて末にし、醋で作つた麪糊で梧子大の丸にし、空心に冷酒で十五丸を服す。婦人にも宜し。【瘥のある胃冷】脾が弱つて嘔吐するものである。生附子、半夏各二錢、薑十片、水二盞を七

分に煎じ、空心に溫服する。ある方では、いづれも炮熟して木香五分を加へる。(奇效其方)『久冷反胃』經驗方では、大附子一箇、生薑一斤を細剉し、共に煮て麴糊のやうに研り、一錢づつを米飲に溶して服す。○衛生家寶方では、薑汁で作つた糊で附子末を和して丸にし、大黃を衣にかけ、十丸づつを溫水で服す。○斗門方では、長大な附子一箇を磚せきの上へ据ゑ、四面から火力をじりじりと通り加へて生薑の自然汁に滓かたし、再三繰返して薑汁半碗ほどを滓かたし滲しみまして止め、研末して一錢づつを粟米飲で服す。三服に過ぎずして瘥える。或は猪腰子を切片して炙熟し、その末を蘸つけて食ふ。○方便集では、大附子一箇を頭を切り離し、一箇の穴を明けて丁香四十九箇を入れ、切離した頭を合せて絲で括くくり、砂銚すいしやうに入れて薑汁に浸し、文火で熬り乾して末にし、一日十數回、少量づつを掌の心に取つて舐なめる。毒物、生、冷物を忌む。『脾寒瘧疾』濟生方に『五臟氣虛し、陰陽相勝つて發した瘧瘧は、寒多く、熱少く、或はただ寒して熱せぬものだ。七棗湯を主として用ゐるがよし。附子一箇を七回炮いて七回鹽湯に浸し、皮、臍を去つて二服に分け、水一碗、生薑七片、棗七箇を七分に煎じて一夜露あらした湯で、發作の日に空心に溫服し、久しからずして再

び一服する』とある。王璆の百一選方には『寒痰には附子がよく、風痰には烏頭がよし。烏頭を用ゐるには、寒多き患者には火で七回炮き、熱多き患者には湯に七回泡け、皮を去り焙じ乾して上記の法の如くにして用ゐる。烏頭は性が熱だが多く炮けば熱が散ずるものだ』とある。○又、果附湯——熱附子を皮を去り、草果仁と各二錢半を、水一盞、薑七片、棗一箇を七分に煎じた湯で發作の日の早朝に溫服する。

○肘後方では、發作の時に醋で附子を和して背上に塗る。【寒熱瘧疾】重さ五錢の附子一箇を麪で煨き、人參、丹砂と各一錢を末にし、煉蜜で梧子大の丸にし、二十丸づつを發作せぬ前に三服續けざまに服す。藥力が病に的中すれば吐く。或は身體麻木するならば、ただ的中せぬのである。翌日再服する。（體安常傷寒論）【瘧瘧寒熱】冷瘧で、寒熱往來し、頭痛し、身疼し、嘔痰し、或は汗多く、引飲し、或は自利し、煩躁するには、薑附湯を主として用ゐるがよし。大附子一箇を四片に破り、一片づつを、水一盞、生薑十片を七分に煎じて溫服する。李待制は『これは極妙の方だ』といひ、章傑は『嶺南地方では、嘔瘧を最危急なものとしてあつて、一二日以内で死亡するものだが、醫師は、極熱に寒を感じたものと解釋し、生附子一味でこれを

治療するが、多くは癒える。これは熱を以て熱を攻め、寒邪を發散するのではあるまいか。眞に起死回生の藥だ』といつてある。（嶺南衛生方）【小便虛閉】兩手の尺脈が沈、微となり、利尿藥を用ゐても奏效せぬは虛寒である。附子一箇を炮き、皮、臍を去つて少時鹽水に浸し、澤瀉（たぐしや）一兩とを用ゐ、四錢づつを、水一盞半、燈心七莖を煎じた湯で服す。直に癒える。（普濟方）【腫疾喘滿】大人、小兒、男子、婦人の積（しやく）から發した腫で、積を取つても再び腫が作り、小便が利せぬものは、再び利尿藥を用ゐれば、性が寒なるために愈よ小便が通じなくなる。此に到つては醫師も多くは手を束ぬるの外はない。蓋しそれは中焦、下焦の氣が升降して寒のために膈に痞するので。故に水が凝（こ）つて通ぜぬのである。これにはただ沈附湯を服ませれば、小便は自から通じ、喘滿は自から癒える。生附子一箇の皮、臍を去つた切片と生薑十片を、沈香一錢を磨つた水に入れて共に煎じ、食前に冷飲する。附子を三五十箇まで用ゐても一向害はない。小兒は三錢づつ水で煎じて服す。（朱氏集驗方）【脾虛の濕腫】大附子五箇を皮を去つて四片に破り、赤小豆半升の中へ入れて慢火で煮熟し、豆を去つて附子を焙じて研末し、薏苡仁粉（やくいじんふん）で作つた糊で梧子大の丸にし、十九づつを蘿蔔湯（ろふたう）で服

す。（朱氏集驗方）【陰水腫滿】烏頭一升、桑白皮五升、水五升を一升到煮取り、滓を去つて銅器に盛り、重湯で丸にし得るまでに煎じて小豆大の丸にし、三五丸づつを服す。小便が利すれば佳し。油膩（ぶと）、酒、麪、魚肉を忌む。○又ある方では、大附子を童尿に三晝夜浸して逐日尿を換へ、布で皮を擦り去つて泥のやうに搗き、酒糊で和して小豆大の丸にし、三十丸づつを煎流氣飲で送下する。（普濟方）【大腸の冷秘】附子一箇を炮いて皮を去り、中心を蜜（みつ）の大いさほど取つて末にし、二錢を蜜水で空心に服す。（聖濟總錄）【老人の虛泄】禁ぜぬには、熟附子一兩、赤石脂一兩を末にして

醋糊で梧子大の丸にし、米飲で五十丸を服す

（楊氏家藏方）

【冷氣洞泄（どうせ）】生川烏頭一

兩、木香半兩を末にして醋糊で梧子大の丸にし、二十九づつを陳皮湯で服す。（朱華方）

【臍寒脾泄】及び老人の中氣、不足で久泄して止まぬには、肉豆蔻（にくこう）二兩を煨熟し、

大附子を皮、臍を去つて一兩五錢と末にして粥で梧子大の丸にし、八十丸づつを蓮肉の煎湯で服す。○十便良方では、脾、胃が虛冷し、大腸が滑泄し、米穀の食物が消化せず、力乏しきものを治す。皮のままの大附子十兩、大棗二升を共に石器に入れ、水を絶えず兩指の高さにして一日間煮て取り出し、每箇を三片づつに切り、

再び共に半日煮て皮を削り去り、切つて焙じて末にし、別の棗肉で和して梧子大の丸にし、三四十丸づつを空心に米飲で服す。【小兒の吐泄】注下し、小便少きには、白龍丸——熟附子五錢、白石脂を煨き、龍骨を煨いて各二錢半を末にし、醋麪糊で黍米大の丸にし、小兒の大小を量つて米飲で服す。（全幼心鑑）【霍亂吐泄】止まぬには、重さ七錢の附子を炮いて皮、臍を去つて末にし、四錢づつを、水二盞、鹽半錢で一盞に煎じた湯で溫服する。立ろに止まる。（孫兆認寶方）【水泄久痢】川烏頭二箇を、一箇は生で用ゐ、一箇は黑豆半合と共に煮熟し、研つて綠豆大の丸にし、五丸づつを黃連湯で服す。（普濟方）【久痢赤白】獨聖丸——川烏頭一箇を灰火で燒き、烟が盡きたとき地上に取り出して盞を蓋せ、良久してそれを研末し、酒で溶しか臘で大麻子大の丸にし、三丸づつを、赤痢には黃連、甘草、黑豆の煎湯を放冷して吞下し、白痢には甘草、黑豆の煎湯を冷して吞む。もし瀉し、または肚痛するならば水で吞下す。いづれも空心に服す。熱物を忌む。（經驗良方）【久しき休息痢】熟附子半兩を研末し、雞子白二箇と搗き和して梧子大の丸にし、沸湯に入れて數沸煮て漉出し、二服に分けて米飲で服す。（聖濟總錄）【下痢欬逆】脈沈して陰寒するものには、

退陰散を主として用ゐる。陳自明は『ある者はこの病が止まなかつたが、この方を二服して癒えた』といつてある。方は前記の陰毒傷寒の項に記載してある。【下血虛寒】日久しき腸冷には、熟附子を皮を去つてこはくはん枯白礬一兩と末にし、三錢づつを米飲で服す。○又、ある方では、熟附子一箇を皮を去り、生薑三錢半と水で煎じて服す。或は黑豆一百粒を加へるべいづれも聖薬方。【陽虛吐血】生地黃一斤を搗いた汁に

酒少量を入れ、熟附子一兩半を皮、臍を去り切片し、その中へ入れて石器で煮て膏にし、その附片を取り出して焙乾し、山藥三兩を入れて研末し、前の膏と和し搗いて梧子大の丸にし、三十丸づつを空心に米飲で服す。昔、葛察判かつさつはんの妻がこの病であらゆる藥を悉く試み、この方を得て始めて癒えた。屢々發するがその都度效果がある。（余居士選奇方）【尿の頻數、白濁】熟附子を末にし、二錢づつを、薑三片、水一盞を六分に煎じた湯で溫服する。（普濟方）【虛火背熱】虛火が背に上行し、火で炙くや

うに内熱するには、附子末を津液で調へてうせんけつ涌泉穴に塗る。（摘玄方）【月經不順】血臟

の冷痛であつて、この方が平易捷徑だ。熟附子を皮を去り、當歸と等分を三錢づつ水で煎じて服す。（普濟方）【斷產下胎】生附子を末にし、醇酒じゅんしゅで和して右足の心に塗

る。胎が下れば、れを取り去る。(小品方) 【折腕損傷】卓氏膏——大附子四箇を生で

切り、猪脂一斤、三年の苦醋と共に三晝夜漬け、その脂を三回煎し三回冷して日毎

に摩し傳ける。(深師方) 【癰疽腫毒】川烏頭を炒り、黄蘗を炒つて各一兩を末にし、

唾液で調へて腫の頭部だけを殘して塗る。乾けば米汁で潤ほす。(同上) 【癰疽の久漏】

瘡口が冷えて濃水が絶えず、内に惡肉なきには、大附子に水を浸透して厚さ三分の

大片に切り、それを瘡口に載せて艾で灸する。數日を隔てて一回灸し、五七回試みて

から内托藥を服す。自然に肌肉が長滿する。研末を餅にして用ゐるもよし。(薛己外科

心法) 【癰疽の弩肉】眼のやうなものが出て斂らず、諸藥を用ゐても治癒せぬには、

この法が極めて妙である。附子を碁石ほどに剉んで唾で粘し、弩肉上に貼つてその

上から艾火で灸する。附子が焦げたときはまた唾で濕して再び灸し、熱を内部に徹

らせれば瘡える。(千金方) 【癰疽の肉突】烏頭五箇を濃醋三升到三日漬け、それで一

晝夜三四回洗入。(古今錄驗) 【丁瘡腫痛】醋で附子末を和して塗り、乾けば再び塗る。

(千金翼) 【疥癬の久しきもの】川烏頭を生で切り、水で煎じて洗ふ。甚だ效驗があ

る。(聖惠) 【手、足の凍裂】附子を皮を去つて末にし、水と麴で調へて塗るが良し。

〔談野翁試驗方〕「足釘怪疾」兩足の心が凸腫してその上に釘のやうな硬い黒豆瘡を生じ、脛骨に碎孔が生じて髓が流出し、身體が發寒して顫ひ、ただ酒を飲みたがる病である。これは肝、腎の冷熱相吞むが原因だ。炮いた川烏頭末を傅け、韭子湯を内服すれば效がある。(夏氏奇疾方)

烏頭附子尖 主治 〔末にして茶で半錢を服し、風痰、癰癤を吐かす〕〔時珍〕

發明 時珍曰く、烏、附は、その尖を用ゐるはやはりその銳氣が直ちに病所に達する點を取るものであつて、外に意味はない。保幼大全に『小兒の慢脾驚風で四肢の厥逆するには、附子尖一箇、硫黃を黃棗大のもの一箇、蠟梢七箇を末にし、薑汁麪糊で黃米大の丸にし、十九づつを米飲で服す。また久瀉の疳癉をも治す。凡そ烏、附を用ゐるには性の熱なるに固執してはならない。その手、足の冷の状態を正確に見極めて、軽いときは湯を用ゐ、甚しいときは丸を用ゐ、重きものには膏を用ゐて、手、足が暖かになり、陽氣の回復が現れれば佳いのだ』とある。按ずるに、

この方は和劑局方の碧霞丹の變法である。眞の慢脾風以外には輕輕しく用ゐてはならないものだ。故に初虞世は金虎、碧霞の戒を示してある。

附方

舊二、新七。

【風厥癰癰】凡そ中風痰厥、癰癰、驚風、痰涎の上壅で、牙

關緊急し、上目をつかひ、搯搦するには、いづれも碧霞丹を主として用ゐるがよし。

烏頭尖、附子尖、蠟梢各七十箇、石緑を研つて九回飛過して十兩を末にし、麪糊で

茨子大の丸にし、一丸づつを薄荷汁半盞に溶して服し、更に溫酒半合を服す。須臾

にして痰涎を吐出すること妙である。小兒の驚癰には白殭蠶等分を加へる。(和劑局方)

【臍風撮口】生川烏尖三箇、全足の蜈蚣半條を酒に浸して炙いて麝香少量と末にし、

少量を鼻に吹き入れ、嚏をしてから、薄荷湯で一字を灌ぎ込む。(永類方) 【木舌腫脹】

川烏尖、巴豆を研細して醋で調へて塗り刷く。(集簡方) 【忍び難き牙痛】附子尖、天

雄尖、全蠍各七箇を生で研末して點ける。(永類方) 【奔豚疝氣】痛み、或は陰囊の腫

痛するには、去鈴丸——生川烏尖七箇、巴豆七粒を皮、油を去つて末にし、糰糊で

梧子大の丸にし、朱砂、麝香を衣にかけ、二丸づつを空心に冷酒、或は冷鹽湯で服

す。兩三日に一服する。多く用ゐてはならぬ。(濟衆方) 【甲を割いて瘡となつたもの】

連年癒えぬには、川烏頭尖、黃蘗等分を末にし、洗つてから貼る。癒えるを度とす

る。(古今錄驗) 【老幼の口瘡】烏頭尖一箇、天南星一箇を研末し、薑汁で和して男は

左、女は右の足の心に塗る。二三回に過ぎずして癒える。

本草綱目草部第十七卷上 終

昭和五年六月廿五日印刷
昭和五年六月廿八日發行

頭國譯本草綱目(第五冊)
非賣品

監修者

白井光太郎

鈴木眞海

發行者

東京市日本橋區通三丁目八番地

和田利彦

印刷者

東京市日本橋區通三丁目八番地


木村諭吉


刊行所

東京市日本橋區通三丁目八番地

春陽堂

電話日本橋五一・六四一・三七八八
振替口座東京一六一七





EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 3464



京 東
出 春
版 陽
堂